

軟体動物
海産貝類

凡例

- 1 目、科および種(亜種、変種も含む)の配列と学名は、肥後俊一・後藤芳央(1993)「日本及び周辺地域産軟体動物総目録」に主として従ったが、一部は最近の研究成果によったところもある。なお、研究中のものは sp. として参考にした。
- 2 分布については、日本貝類学会の機関紙「VENUS」と「ちりぼたん」の東北地方に関する文献(1915~1998)、東京大学海洋研究所の大槌臨海センター報告(1979~1995)、千葉蘭児・小菅貞男著 North Pacific Shells, (1979~1995) . of the Institute of Malacology, Tokyo. や、各種貝類図鑑、並びに鳥羽源蔵、千葉蘭児の貝類標本を参考にした。

多板殻綱
新ヒザラガイ目

サメハダヒザラガイ科

1. *Lepidopleurus (Lepidopleurus) assimilis* Thiele エゾサメハダヒザラガイ
 - ・ 大槌湾(小白浜、赤浜)、山田湾, 6~8m, 潮間帯、礫間
 - ・ 東北地方太平洋岸以北~北海道; 日本海北部、ウラジオストック、サハリン
2. *Lepidopleurus (Lepidopleurus) hakodatensis* Thiele キタサメハダヒザラガイ
 - ・ 大槌湾(小白浜), 6~8m, 潮下帯、転石下、貝殻に付着
 - ・ 東北地方及び北海道太平洋岸; 日本海北部、オホーツク海南部
3. *Lepidopleurus (Deshaysiella) curvatus* Pilsbry カギツメヒザラガイ
 - ・ 大槌湾口、御箱崎沖, 65~85m,
 - ・ 東北地方及び北海道太平洋岸; オホーツク海、潮下帯の転石下、貝殻に付着
4. *Hanleylla japonica* Saito ツユオキヒザラガイ
 - ・ 大槌御箱崎沖, 80~85m.
 - ・ 駿河湾が模式産地それ以外初記録
5. *Leptochiton belknapi* Dall シンカイサメハダヒザラガイ
 - ・ 三陸沖(1730~3020m)
 - ・ 相模湾、九州西岸、御蔵島~鳥島(1230~2245m)、深海の岩礁、沈木に付着

ウスヒザラガイ科

1. *Ischnochiton (Ischnochiton) computus computus* (Gould) ウスヒザラガイ
 - ・ 三陸沿岸一帯、宮古、山田、舟越、広田湾、潮間帯~5m 岩礁や礫間
 - ・ 北海道南部以南の日本全国; 南朝鮮、中国、台湾
2. *Ischnochiton (Ischnochiton) computus isaoi* Iw. Taki ホソウスヒザラガイ
 - ・ 北海道南部以南の日本全国; 南朝鮮、中国、台湾潮間帯~5m, 岩礁や礫間
3. *Ischnochiton (Ischnoradsia) hakodatensis* (Pilsbry) ハコダテヒザラガイ
 - ・ 宮古、大槌、舟越、小白浜, 6~8m、広田湾
 - ・ 東北地方及び北海道太平洋岸; 日本海北部、オホーツク海の潮下帯、転石下、貝殻に付着
4. *Lepidozona (Lepidozona) coreanica* (Reeve) ヤスリヒザラガイ
 - ・ 三陸南部北半、宮古湾、広田湾、潮間帯~10m、岩礁や転石上
 - ・ 北海道以南の日本全国; 朝鮮南部、中国、台湾
5. *Lepidozona (Lepidozona) amabilis* (Berry) アカヤスリヒザラガイ
 - ・ 大槌御箱崎沖, 80~85m, 貝殻や転石
 - ・ 津軽海峡以南~九州西南岸 9~600m, 貝殻や転石に付着
6. *Lepidozona (Gurjanovillia) albrechti* (Schrenck) エゾヤスリヒザラガイ
 - ・ 三陸沿岸一帯 潮間帯~60m、
 - ・ 東北地方及び北海道の太平洋岸; 日本海北部、オホーツク海、潮下帯の転石下
7. *Tonicella insignis* Reeve エゾマダラヒザラガイ
 - ・ 大槌湾 潮間帯 分布:
 - ・ 東北以北~北海道の太平洋岸; 日本海北部、オホーツク海南部、潮下帯の転石、貝殻に付着
8. *Tonicella lineata* (Wood) アオスジヒザラガイ
 - ・ 大槌湾 小白浜・長根島, 6~8m、岩礁
 - ・ 東北太平洋岸~北海道; 日本海北部、オホーツク海南部、潮下帯の岩礁
9. *Tonicella zitini* Jakovleva ヒメマダラヒザラガイ
 - ・ 大槌赤浜漁港刺し網揚場
 - ・ 東北地方~北海道太平洋岸; 日本海北部、オホーツク海南部、潮下帯の転石、貝殻に付着
10. *Tonicella squamigera* Thiele コケラマダラヒザラガイ
 - ・ 大槌小白浜, 6~8m
 - ・ 東北地方~北海道太平洋岸; 日本海北部、オホーツク海南部、潮下帯の転石、貝殻に付着

セワケヒザラガイ科

1. *Spongioradsia foveolata* Is. Taki ハチノスヒザラガイ
 - ・ 大槌湾赤浜港揚げ刺し網
 - ・ むつ湾以南、岩手県、宮城県女川湾、潮下帯の転石下

ヒゲヒザラガイ科

1. *Mopalia (Mopalia) hirsuta* Is. Taki ナガヒゲヒザラガイ
 - ・ 大槌湾, 15m
 - ・ オホーツク海南部、北海道、東北太平洋岸、日本海北部、潮下帯の転石
2. *Mopalia (Mopalia) retifera* Thiele ヒゲヒザラガイ
 - ・ 大槌小白浜, 6~8m
 - ・ 北海道~南西諸島までの太平洋岸、日本海北部、東シナ海、潮下帯転石、岩礁
3. *Placiphorella simpsoni* (Gould) エゾノシバガセ
 - ・ 大槌赤浜港揚げ刺し網
 - ・ オホーツク海南部、北海道、東北太平洋岸、潮下帯岩礁や転石
4. *Placiphorella japonika* (Dall) ババガセ
 - ・ 大槌石浜、舟越半島、潮間帯
 - ・ 津軽海峡以南九州、日本海南部、潮間帯~10m, 岩礁、転石
5. *Placiphorella albitesta* Is. Taki シラガノシバガセ
 - ・ 大槌湾、御箱崎沖, 80~85m
 - ・ 津軽海峡、大槌湾、相模湾、駿河湾、天草, 80~200m, 岩礁や転石
6. *Placiphorella borealis* Pilsbry キタノシバガセ
 - ・ 宮古崎山、広田湾 潮間帯~10m, 岩礁
 - ・ 三陸沿岸以北~北海道、千島、オホーツク海、ベーリング海

ヒザラガイ科

1. *Rhysoplax kurodai* (Is. & Iw. Taki) クサズリガイ
 - ・ 船越半島、広田湾、潮間帯~20m, 転石下
 - ・ 北海道南部から九州、屋久島;韓国沿岸
2. *Liolophura japonica* (Lischke) ヒザラガイ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯の岩礁上
 - ・ 北海道南部から九州、屋久島;韓国沿岸、東シナ海沿岸

ケハダヒザラガイ科

1. *Acanthochitona defilippi* (Tapparone-Canefri) ケハダヒザラガイ
 - ・ 三陸沿岸一帯 潮間帯~20m, 岩礁や礫間
 - ・ 北海道西南部以南九州;インド洋
2. *Acanthochitona rubrolineatus* (Lischke) ヒメケハダヒザラガイ
 - ・ 大槌湾、船越半島、潮間帯、岩礁上
 - ・ 北海道南部以南九州;韓国沿岸、東シナ海沿岸
3. *Cryptochiton stelleri* (Middendorff) オオバンヒザラガイ
 - ・ 大槌赤浜港, 40~50m,
 - ・ 大槌湾、北海道;オホーツク海、ベーリング海、北米西岸、潮下帯岩礁

腹足綱
原始腹足目

ミミガイ科

1. *Sulculus divrsicolor* (Lischke) トコブシ
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南日本全国、九州まで、潮間帯~10m, 岩礁
2. *Nordotis discus discus* (Reeve) クロアワビ
 - ・ 山田湾
 - ・ 北海道奥尻以南~九州;南朝鮮、潮間帯~20m, 岩礁
3. *Nordotis discus hannai* (Ino) エゾアワビ
 - ・ 三陸沿岸一帯潮間帯~20m, 岩礁
 - ・ 北海道南部~東北地方

クチキレエビス科

1. *Sukashitrochus carinatus* (A. Adams) スカシエビス
 - ・ 大槌湾
 - ・ 北海道南部・飛島以南~駿河湾、四国、九州、潮間帯~150m、砂礫

スカシガイ科

1. *Emarginula concinna* A. Adams キヌジスソキレ
 - ・ 大槌湾

- ・ 房総半島・伊豆七島以南～沖組, 潮間帯～20m, 砂礫
- 2. *Tugali decussata* A. Adams シロスソカケ
 - ・ 広田町大野湾、テトラポット潮間帯～水深5m
 - ・ 北海道南部・飛島以南～日本各地;熱帯西太平洋、潮間帯～50m, 岩礁
- 3. *Tugalina (Scelidotoma) gigas* (v. Martens) サルアワビ
 - ・ 三陸沿岸一帯, 潮間帯～20m, 岩礁
 - ・ 東北以北、北海道、日本海北部;サハリン、沿海州、朝鮮北部
- 4. *Tugalina (Scelidotoma) vadososinuata* (Yokoyama) コシタカサルアワビ
 - ・ 綾里沖130～150尋、広田沖100m, 久慈沖
 - ・ 銚子沖、三陸沿岸・能登以北～北海道、日本海北部、100～300m, 岩礁
- 5. *Scutus (Aviscutum) sinensis* (Blainville) オトメカサ
 - ・ 北海道南部・青森西以南～日本各地;朝鮮、中国沿岸、潮間帯～60m, 岩礫、転石
- 6. *Punctrella (Punctrella) nobilis* A. Adams コウダカスカシガイ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～85m, 岩礫、礫底
 - ・ 駿河湾、山口県北沖以北～北海道;サハリン、北千島
- 7. *Macroschisma sinense* (A. Adams) スカシガイ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～50m, 岩礁や岩礫上
 - ・ 北海道南西部・男鹿半島以南～日本全国;西太平洋
- 8. *Macroschisma dilatatum* (A. Adams) ヒラスカシガイ
 - ・ 気仙郡(鳥羽1930)、大槌湾
 - ・ 三陸南部北半・男鹿半島以南～九州、潮間帯～150m, 岩礁、礫上
- 9. *Macroschisma dilatatum lischkei* Pilsbry スカシガサ
 - ・ 大槌湾
 - ・ 三陸大槌湾・能登半島以南～九州、潮間帯～50m, 岩礁、礫上

ツタノハガイ科

1. *Cellana grata* (Gould) ベッコウザラ
 - ・ 三陸沿岸一帯 潮間帯、岩礁
 - ・ 北海道南部以南～日本各地;朝鮮半島、台湾
2. *Cellana nigrolineata* (Reeve) マツバガイ(ウシノツメ)
 - ・ 広田湾、島の巣浜、潮間帯、岩礁、転石
 - ・ 本州～九州;朝鮮半島
3. *Cellana toreuma* (Reeve) ヨメガカサ(ヨメノサラ)
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯、岩礁
 - ・ 北海道南部以南～日本全国;西太平洋

シロガサ科

1. *Lepeta kuragiensis* (Yokoyama) クラギシロガサ(クラギアミガサ)
 - ・ 大槌湾、山田湾
 - ・ 対馬海峡、東北、北海道、千島、潮間帯～20m、礫底
2. *Limalepota lima* Dall スゲガサ
 - ・ 東北以北～北海道沿岸、10～50m、砂礫底

ユキノカサ科

1. *Patelloida (Asteracmea) pygmaea* (Dunker) ヒメコザラ
 - ・ 大槌、山田、広田湾、三陸沿岸一帯、潮間帯、岩礁
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南～日本全国;朝鮮半島、台湾、中国
2. *Patelloida (Asteracmea) pygmaea signata* (Pilsbry) シボリガイ
 - ・ 大槌、三陸沿岸一帯、潮間帯、岩礁
 - ・ 北海道南部以南～日本全国
3. *Patelloida (Asteracmea) pygmaea lampanicola* (Habe) ツボミ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯、岩礁、ウミユナ等の殻上に付着
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南～日本全国;朝鮮、中国、台湾
4. *Collisella (Collisella) cassis* (Eschscholtz) シロガイ
 - ・ 三陸沿岸 潮間帯、岩礁
 - ・ 東北以北～北海道;オホーツク沿岸
5. *Collisella (Collisella) dorsuosa* (Gould) カモガイ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯、岩礁上部
 - ・ 北海道南西部・男鹿半島以南～日本全国;朝鮮、台湾
6. *Collisella (Conoidacmea) heroldi* (Dunker) コカモガイ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯、岩礁やムラサキインコの殻上
 - ・ 北海道礼文島以南～日本全国;朝鮮、台湾
7. *Problacmaea sybaritica* (Dall) エゾノハナガサ
 - ・ 三陸(大槌)以北～千島、ベーリング海、アラスカ

8. *Testudinalia scutus* (Eschscholtz) ベッコウシロガイ
 - ・ 大槌湾
 - ・ 東北以北～北海道、千島、オホーツク海、潮間帯、岩礁
9. *Notoacmea schrenckii* (Lischke) アオガイ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯、岩礁
 - ・ 本州～九州、朝鮮
10. *Notoacmea schrenckii gloriosa* Habe サクラアオガイ
 - ・ 三陸沿岸、潮間帯、岩礁
 - ・ 本州～九州
11. *Notoacmea concinna* (Lischke) コウダカアオガイ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯、岩礁
 - ・ 北海道南部・青森県以南～九州、朝鮮、中国
12. *Notoacmea concinna radula* Kira カスリアオガイ
 - ・ 山田湾、潮間帯、岩礁
 - ・ 北海道南部・青森県以南～九州、朝鮮、中国
13. *Notoacmea concinna nigrans* Kira クモリアオガイ
 - ・ 山田、釜石、三陸沿岸南部、潮間帯、岩礁
 - ・ 北海道南部・青森県以南～九州、朝鮮、中国
14. *Acmaea (Niveotectura) pallida* (Gould) ユキノカサ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～20m,
 - ・ 駿河湾・山口県北部以北～北海道、朝鮮、シベリヤ、サハリン、千島

ウミコハクガイ科

1. *Skenea nipponica* Yokoyama ミヂンシタタミ
 - ・ 陸前
 - ・ 駿河湾以北～陸前、潮下部、砂底
2. *Teinostoma (Callomphala) lucidum* A. Adams ウミコハクガイ(オトギノキサゴ)
 - ・ 大槌湾
 - ・ 三陸沿岸、伊豆半島、四国、九州、潮間帯、砂泥底
3. *Lissotesta sobrinum* (A. Adams) イトコシタタミ
 - ・ 大槌湾、三陸南部北半
 - ・ 三陸沿岸～本州各地、内湾の潮下部、砂泥底
4. *Lissotesta* sp. (黄白色)
 - ・ 三陸沿岸(大槌湾) by 堀越 1980
5. *Lissotesta* sp. (紫褐色)
 - ・ 三陸沿岸(大槌湾) by 堀越 1980

イトカケシダタミ科(ミジンシダタミ科)

1. *Brookula (Aequispirella)* sp.
 - ・ 三陸、大槌湾、砂泥, by 堀越 1983

ニシキウズ科

1. *Margarites helycinus pilsbryi* (Kuroda & Habe) エゾシタダミ
 - ・ 岩手県
 - ・ 岩手以北～北海道、千島、潮下部、砂底、スガモ等
2. *Margarites* cf. *vahlII* (Moller)
 - ・ 三陸大槌湾
3. *Pupillaria pupilla* (Gould) スジマキエビス
 - ・ 気仙沖、深海
 - ・ 岩手県沿岸・佐渡島以北～北海道;オホーツク、ベーリング(40～250m) 砂底
4. *Lirularia (Lirularia) iridescens* (Schrenck) アコヤシタダミ
 - ・ 大槌湾、山田湾、大船渡湾、広田湾、潮間帯～20m, スガモやアジモ上
 - ・ 東北以北～北海道;オホーツク, 沿海州
5. *Lirularia (Lirularia) yamadana* (Smith) ヤマダシタダミ
 - ・ 山田湾、三陸沿岸一帯、潮間帯～200m, 海藻上
 - ・ 東北以北～北海道、日本海若狭湾
6. *Lirularia (Lirularia) pygmaea* (Yokoyama) ヒノデシタダミ
 - ・ 三陸沿岸、三陸南部北半、潮間帯から 20m, 岩礁
 - ・ 伊豆半島以北～東北
7. *Lirularia (Lirularia) redimita* (Gould) カスリマキシタダミ
 - ・ 銚子沖以北～東北、北海道南部、日本海佐渡島、20～60m, 砂礫
8. *Granata lyrata* (Pilsbry) アシヤガイ
 - ・ 三陸南部北半
 - ・ 本州沿岸以南～奄美、沖縄、潮間帯、転石帯

9. *Calliostoma haliarchus* (Melvill) ヒラコマ
 - ・ 三陸北部南半、気仙沖、50～200m, 細砂底
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南～九州
10. *Calliostoma consors* (Lischke) コシタカエビス
 - ・ 青森・男鹿半島以南～九州、10～100m, 砂礫底
11. *Calliostoma multiliratum* (Sowerby) ニシキエビス
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～50m, 岩礫底
 - ・ 北海道南西部・能登半島以南～九州
12. *Calliostoma unicum* (Dunker) エビスガイ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～150m, 岩礫底
 - ・ 北海道西南以南～日本各地;朝鮮半島、中国
13. *Fautor kurodai* Azuma クロダアラエビス近似種
 - ・ 大槌湾、100～200m, 砂底
 - ・ 紀伊半島沖、富山湾?
14. *Minolita punctata* A. Adams コシダカシタダミ(ケボリシタダミ)
 - ・ 陸中海岸
 - ・ 房総半島・男鹿半島以南～九州、50～150m, 砂泥底
15. *Minolita (Lirularia) sp. Tiba*
 - ・ 三陸町綾里沖、鮫ヶ崎 8 マイル
16. *Minolita subangulata* Kuroda & Habe カドコシタカシタダミ
 - ・ 陸中海岸、大槌湾
 - ・ 青森県(太平洋側・日本海側)～九州、東支那海、50～150m, 砂泥底
17. *Hazuregyra watanabei* Shikama ハズレシタダミ
 - ・ 銚子沖以北～東北、北海道
18. *Enida japonika* A. Adams ハグルマシタダミ
 - ・ 大槌湾
 - ・ 本州沿岸以南～九州;インドネシア、50～200m, 砂底
19. *Fossarina picta* A. Adams チビアシヤ
 - ・ 東北以南～九州、潮間帯、岩礁・カキ・フジツボ等の隙間
20. *Turcica coreensis* Pease マキアゲエビス
 - ・ 宮古、大槌、気仙沖、三陸南部北半、50～200m, 砂泥底
 - ・ 北海道西南部・男鹿半島以南～九州;東シナ海
21. *Bathybembix aeola* (Watson) コガネエビス(クサイロギンエビス)
 - ・ 三陸沖
 - ・ 東北三陸沖、鹿島灘、熊の灘、100～1500m, 砂泥底
22. *Ginebis argenteonitens* (Lischke) ギンエビス
 - ・ 東北以南～九州;東シナ海、50～400m, 砂底
23. *Ginebis argenteonitens hirasei* Is. Taki & Otuka ヒラセギンエビス
 - ・ 大槌湾、広田沖、気仙沖、50～400m, 砂底
 - ・ 鹿島灘以北～東北沖
24. *Ginebis crumpii* (Pilsbry) イガギンエビス
 - ・ 東北地方・男鹿半島以南～九州;東シナ海、50～300m, 砂礫底
25. *Monodonta (Monodonta) labio confusa* Tappone-Canefri イシダタミ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯、岩礁や転石上
 - ・ 北海道南部以南・男鹿半島以南～日本全国;中国沿岸
26. *Monodonta (Neomonodonta) neritoides* (Pilsbry) クロヅケガイ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯、岩礁や転石
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南～九州;朝鮮、中国南部
27. *Monodonta (Neomonodonta) perplexa* Pilsbry クビレクロヅケガイ
 - ・ 東北地方・男鹿半島以南～九州;朝鮮、中国南部、潮間帯、岩礁や転石
28. *Chlorostoma argyrostoma rugatum* (Gould) シワクボガイ
 - ・ 宮古、大槌、山田湾、潮間帯～20m, 岩礫地
 - ・ 三陸沿岸(気仙沼)以北～北海道、千島
29. *Chlorostoma lischkei* (Tapparone-Canefri) クボガイ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～下部、岩礫地
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南～日本各地;朝鮮、中国南部
30. *Chlorostoma turbinata* (A. Adams) ヘソアキクボガイ
 - ・ 三陸南部北半、潮間帯～下部、岩礁、礫地
 - ・ 北海道西南部・男鹿半島～九州
31. *Omphalius pfeifferi pfeifferi* Philippi バテイラ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～20m, 岩礫底
 - ・ 東北北部～九州南部太平洋岸
32. *Omphalius rusticus rusticus* (Gmelin) コシタカガンガラ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～下部、岩礫地

- ・ 北海道北部・男鹿半島以南～日本全国;朝鮮、中国南部
- 33. *Cantharidus japonicus* (A. Adams) チグサガイ
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南～九州、潮間帯～下部、海藻上
- 34. *Cantharidus japonicus hiliaris* (Lischke) ミドリチグサガイ
 - ・ 北海道南部・山口北部以南～九州、潮間帯～下部、海藻上
- 35. *Cantharidus jessoensis* (Schrenck) エゾチグサ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯、海藻上
 - ・ 東北(宮城)・山形以北～北海道;沿海州、オホーツク
- 36. *Cantharidus callichroa* (Philippi) ハナチグサ
 - ・ 広田湾、三陸南部北海半、潮間帯～下部、海藻上
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南～九州;朝鮮
- 37. *Cantharidus callichroa bisbalyeatus* (Pilsbry) シリプトチグサ
 - ・ 北海道西南部以南～九州、潮間帯～下部、岩礁
- 38. *Cantharidus* (*Cantharidas*) sp. *Oyama* フブキチグサの一種
 - ・ 釜石市、陸前高田小友、(神奈川県博 1972,)
- 39. *Komaitrochus pulcher* Kuroda & Iw. Taki コマイチグサ
 - ・ 東北地方・山口北部以南～沖縄、潮間帯下部、海藻上
- 40. *Umbonium* (*Suchium*) *moniliferum* (Lamarck) イボキサゴ
 - ・ 山田湾、三陸南部北半、内湾の潮間帯砂泥底
 - ・ 青森・秋田県以南～九州;朝鮮
- 41. *Umbonium* (*Suchium*) *costatum* (Kiener) キサゴ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～下部、砂底
 - ・ 北海道南部・青森西部以南～日本各地;朝鮮
- 42. *Conotalopia ornata* (Sowerby) ヒナシタダミ
 - ・ 大槌湾
 - ・ 北海道南部・佐渡以南～九州、潮間帯～20m、砂底
- 43. *Conotalopia mustelina* (Gould) アワジチグサ
 - ・ 大槌湾
 - ・ 東北北部以南～九州、潮間帯、岩礁及び潮溜まりの岩礁上
- 44. *Conotalopia nimima* Golikov ケシツブシタダミ
 - ・ 大槌湾 (堀越氏新称, 1980)

リュウテン科

1. *Lumella coronata coreensis* (Recluz) スガイ
 - ・ 広田湾、潮間帯、岩礫地
 - ・ 北海道南部以南・男鹿半島以南～屋久島まで;朝鮮
2. *Pomaulax japonicus* (Dunker) ヒラサザイ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮下部～100m、岩礁
 - ・ 東北沿岸～紀伊半島、男鹿半島～九州北部
3. *Homalopoma nocturnum* (Gould) サンショウガイ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～60m、砂礫底
 - ・ 北海道西南以南～九州
4. *Homalopoma amussiatum* (Gould) エゾザンショウ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～30m、砂礫底
 - ・ 銚子沖・東北以北～北海道、千島
5. *Homalopoma sangarensense* (Schrenck) ヤマザンショウ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯・転石・海藻上
 - ・ 東北地方・男鹿半島以北北海道
6. *Homalopoma granuliferum* Nomura & Hatai ワニカワザンショウ
 - ・ 大槌湾
 - ・ 三陸沿岸・佐渡島以南～九州;東シナ海、50～300m、砂礫底
7. *Homalopoma decolorum* Tiba イロアセザンショウ
 - ・ 広田湾、5～20m 細砂泥底
 - ・ 三陸南部北半

ベニバイ科

1. *Eotricolia tristis* (Pilsbry) コムラサキバイ
 - ・ 大槌湾、広田湾、潮間帯～50m、岩礁
 - ・ 銚子沖・山形県以北～北海道

深海白笠目

ワタゾコシロガサ科

1. *Cocculina japonica japonica* Dall ワタゾコシロガサ
 - ・ 釜石～大槌沖

- ・ 本州東北・日本海中部以北～北海道、50～300m, 沈木に付着
中腹足目

チャイロタマキビ科

1. *Tamanella turrita* (A. Adams) チャイロタマキビ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～50m, 海藻上
 - ・ 東北地方以北～北海道、千島
2. *Epheria decorata* (A. Adams) コウダカチャイロタマキビ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～50m, 海藻上
 - ・ 日本海(見島)・東北以北～北海道、千島
3. *Stenotis cariniferus* (A. Adams) モロハタマキビ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯、海藻上
 - ・ 東京湾・能登半島以北～東北、北海道
4. *Stenotis smithi* (Pilsbry) ヘソカドタマキビ
 - ・ 山田湾、潮間帯、海藻上
 - ・ 三陸沿岸・佐渡島以南～関東、東海地方、瀬戸内海

タマキビガイ科

1. *Littorina (Ezollittorina) squalida* (Broderip & Sowerby) エゾタマキビ
 - ・ 宮古市白浜、潮間帯、岩礁
 - ・ 銚子沿岸、東北北部以北～北海道;千島、サハリン、オホーツク海
2. *Littorina (Littorina) brevicula* (Philippi) タマキビ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮上部、岩礁や転石帯
 - ・ 北海道以南～日本各地、朝鮮、中国南部
3. *Neritrema sitkana* (Philippi) クロタマキビ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯、岩礁
 - ・ 東北地方・飛島以北～北海道;千島、サハリン、カムチャツカ、ベーリング海
4. *Granulilittorina exigua* (Dunker) アラレタマキビ
 - ・ 三陸沿岸一帯、高潮帯、岩礁
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南～九州;朝鮮半島、中国沿岸

リソツボ科

1. *Cingula matusimana* Nomura マツシマツボ
 - ・ 三陸南部北半、潮間帯、砂底
 - ・ 東北以北～北海道
2. *Cingula dharna* (Yokoyama)
 - ・ 三陸南部北半
 - ・ 三陸沿岸 (NOMURA&HATAI, 1935) 太平洋側 (38N, by checklist, p. 46)
3. *Cingula mundula* (A. Adams)
 - ・ 三陸南部北半
 - ・ 黄海
4. *Alvania (Alvania) concinna* (A. Adams) タマツボ
 - ・ 広田湾、大船渡湾、三陸南部北半、潮間帯、海藻上
 - ・ 千島・北海道以南～九州
5. *Alvania (Alvania) asura* (Yokoyama) アシユラツボ
 - ・ 東北・能登半島以北～北海道、潮間帯、海藻上
6. *Alvania (Alvania) maya* (Yokoyama) マヤツボ
 - ・ 大槌湾、三陸南部北半
 - ・ 東北・若狭湾以北～北海道
7. *Alvania (Thapsiella) sadoensis* (Smith) サドツボ
 - ・ 大槌湾、三陸南部北半、潮間帯、砂礫
 - ・ 三陸沿岸・山形県以南～九州
8. *Lucidestea ornata* (Gorikov & Kussakin) キタノコトツボ
 - ・ 大槌湾、19～37m
 - ・ 岩手県;沿海州

チャツボ科

1. *Barleeia angustata* Pilsbry チャツボ
 - ・ 三陸沿岸一帯
 - ・ 九州北部以北～東北、北海道、日本海、潮間帯、岩礁や海藻上

カワザンシヨウガイ科

1. *Assiminea japonica* v. Martens カワザンシヨウガイ
 - ・ 三陸南部北半、河口付近の汽水域
 - ・ 北海道南部・島根半島以南～沖縄諸島、朝鮮半島

2. *Angustassiminea castanea* (Westerlund) クライロカワザンショウ
 - ・ 三陸南部北半、河口付近の汽水域、砂礫やアシ原に付着
 - ・ 東北・能登半島以南～奄美大島
3. *Angustassiminea angustata* Pilsbry トウガタカワザンショウ
 - ・ 大槌湾、三陸南部北半
 - ・ 東北以北～北海道

ミジンギリギリツツ科

1. *Brochina glabella* (A. Adams) ミジンツツガイ
 - ・ 大槌湾、三陸南部北半、潮間帯、岩礁間の砂地
 - ・ 北海道南部・佐渡島以南～九州

イツコハクガイ科

1. *Pseudoliotina pulchella* (Dunker) シラギク
 - ・ 大槌湾、潮間帯～200m, 砂地
 - ・ 本州以南～九州

モツボ科

1. *Clathrofenella reticulata* (A. Adams) オガサワラモツボ
 - ・ 大船渡湾、三陸南部北半、潮間帯～30m, 砂瀬底
 - ・ 本州～九州
2. *Eufenella pupoides* (A. Adams) モツボ
 - ・ 大船渡湾、三陸南部北半、内湾の潮間帯、砂泥底
 - ・ 本州沿岸～九州

スナモチツツ科

1. *Scaliola bella* A. Adams スナモチツツボ
 - ・ 大槌湾、5～30m, 砂泥底
 - ・ 本州沿岸以南～九州

ウミニナ科

1. *Batillaria multiformis* (Lischke) ウミニナ
 - ・ 宮古湾、山田湾、三陸南部北半、内湾、潮間帯～下部、泥地の干潟
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南～日本全国
2. *Batillaria cumingii* (Crosse) ホソウミニナ
 - ・ 宮古湾、山田湾、広田湾、三陸南部北半、潮間帯、泥地の干潟
 - ・ サハリン・沿海州以南～日本全国;朝鮮、中国沿岸

トリデニナ科

1. *Fossarus (Iselica) iwateanus* Omura et Hatai
 - ・ 大槌湾、三陸南部北半

キリガイダマシ科

1. *Neohaustator fortilirata* (Sowerby) エゾキリガイダマシ
 - ・ 宮古湾、山田湾、気仙沖、30～300m, 砂泥底
 - ・ 犬吠崎・若狭湾以北～北海道;朝鮮北部
2. *Tachyrhynchus reticulatum* (Mighels) ユキヒメニナ
 - ・ 大槌湾
 - ・ 三陸沿岸・能登半島以北～北海道;アラスカ、北米、50～1500m

ムカデガイ科

1. *Serpulorbis (Cladopoda) imbricatus* (Dunker) オオヘビガイ
 - ・ 山田湾、広田湾、三陸南部北半、潮間帯～10m, 岩礫
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南～沖縄;台湾、朝鮮、中国

スズメガイ科

1. *Sabia conica* (Schumacher) キクスズメ
 - ・ 三陸沿岸一帯、貝類の殻表肛門近くに付着
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南～日本全国;インド、西太平洋域

ヒゲマキナワボラ科

1. *Trichotropis bicarinata* (Sowerby) ヒゲマキナワボラ
 - ・ 東北地方以北～北海道;千島、北極海、20～100m, 泥底
2. *Trichotropis cancellata* Hinds コロモナワボラ

- ・ 東北地方以北～北海道;ベーリング海、外洋の潮間帯～20m, 泥底
- 3. *Neophiphinoe uncarinata* (Broderip & Sowerby) ネジヌスキ
 - ・ 大槌湾、三陸南部北半、潮下部～250m, 砂底
 - ・ 三陸沿岸・能登半島以南～九州;黄海
- 4. *Neophiphinoe chibai* (Habe) チバネジヌスキ
 - ・ 岩手県沖、100m 位、細砂泥底
 - ・ 東北地方～北海道
- 5. *Iiphinoe ovata* (Smith) コエゾネジヌスキ
 - ・ 銚子沖以北～東北地方、300～1000m, 細砂泥底
- 6. *Trichamathina nobilis* (A. Adams) エゾイソチドリ
 - ・ 銚子沖・東北地方以北～北海道;千島、50～100m

カリバガサ科

1. *Crepidula grandis* Middendorff エゾフネガイ
 - ・ 三陸沿岸沖、100m～450m、エゾボラ類の貝殻等に付着
 - ・ 銚子沖、東北地方～北海道;千島、サハリン、アリュウシヤン
2. *Ergaea walshi* (Reeve) シラタマツバキ(ヒラフネガイ)
 - ・ 大槌湾、10m～50m, ヤドカリの入った巻き貝の中
 - ・ 三陸沿岸・男鹿半島以南～沖縄;インド・西太平洋

タカラガイ科

1. *Purpuradusta (Cupinota) gracilis japonica* (Schilder) メダカラガイ
 - ・ 三陸南部北半、潮間帯～10m, 岩礁
 - ・ 陸奥湾・男鹿半島～奄美;朝鮮

ウミウサギ科

1. *Sandalia rhodia* (A. Adams) ツグチガイ
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南～九州;朝鮮、中国沿岸、潮下部～30m
 - ・ イソバナ類に着生

ザクロガイ科

1. *Sulcerato callosa* (A. Adams & Reeve) ザクロガイ
 - ・ 三陸沿岸一帯、底潮帯～100m, 岩礁
 - ・ 本州沿岸以南～沖縄

ベッコウタマガイ科

1. *Velutina (Velutella) plicatilis* (Muller) モモイロハナツド
 - ・ 東北地方以北～北海道;千島、ベーリング、オホーツク、潮間帯
2. *Velutina (Limmeria) bulla* Habe マルハナツド
 - ・ 陸前
 - ・ 越前沖・銚子沖以北～北海道西南部、潮下部～80m, 砂地

異足目

タマガイ科

1. *Bulbus flavus* (Gould) クリガイ
 - ・ 宮古沖、気仙沖、20～400m, 砂泥底
 - ・ 銚子沖・能登半島以北～東北、北海道;オホーツク
2. *Bulbus flagilis apertus* (Middendorff) ウスカワクリガイ
 - ・ 銚子沖以北～北海道;サハリン、アリュウシヤン、アラスカ、50～200m, 砂泥底
3. *Euspira pilaovata* (Sowerby) コシダカタマツメタ
 - ・ 東北地方以北～北海道;千島、10～50, 細砂泥底
4. *Euspira pallida* (Broderip & Sowerby) ウスイロタマツメタ
 - ・ 久慈沖、大槌湾、50～2433m, 砂泥底
 - ・ 駿河湾・若狭湾～北海道;北極圏
5. *Euspira choshiensis* Kuroda チョウシタマツメタ
 - ・ 銚子沖以北～東北、20～100m, 砂泥底
6. *Euspira nux* (Okutani) タネタマツメタ
 - ・ 銚子沖、東北沿岸沖、800～900m
7. *Glossaulax didyma didyma* (Roding) ツメタガイ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～100m, 細砂底
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南～九州;朝鮮、中国、東南アジア、西太平洋
8. *Lumatia choshiensis* Tiba コベソハイイロツメタ
 - ・ 久慈沖以北～北海道、200m～250m, 砂泥底
 - ・ 北日本太平洋岸、オホーツク

9. *Cryptonatica janthostomoides* (Kuroda & Habe) エゾタマガイ
 - ・ 三陸沿岸一帯、20~90m, 砂泥底
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南~九州;朝鮮南部
10. *Cryptonatica janthostoma* (Deshayes) チシマタマガイ
 - ・ 東北地方・能登半島以北~北海道;千島、サハリン、オホーツク、20~300m, 細砂底
11. *Cryptonatica rikuzenensis* (Tiba) リクゼンタマガイ
 - ・ 岩手県陸前沖、5~20m
 - ・ 銚子沖~陸前沖
12. *Cryptonatica russa* (Gould) コシダカタマガイ
 - ・ 気仙郡沖、50~300m, 砂泥底
 - ・ 若狭湾・東北地方以北~北海道;千島、サハリン、オホーツク、カムチャツカ
13. *Cryptonatica hirasei* (Pilsbry) ヒラセタマガイ(エゾホロガイ)
 - ・ 久慈沖、潮間帯~20m, 細砂底
 - ・ 銚子沖以北~北海道;千島、サハリン、オホーツク、カムチャツカ
14. *Cryptonatica ranzii* (Kuroda) ランジタマガイ
 - ・ 東北地方・能登半島以北~北海道、50~250m, 砂底
15. *Cryptonatica figurata* (Sowerby) アミモンタマガイ
 - ・ 大槌湾、大船渡市門の浜湾、岩手県沖、潮間帯~50m, 細砂底
 - ・ 相模湾・能登半島以北、北海道;朝鮮南部
16. *Cryptonatica clusa* (Broderip & Sowerby) ハイイロタマガイ
 - ・ 久慈沖、綾里沖、50~100m, 砂泥底
 - ・ 駿河湾・日本海見島以北~北海道;サハリン、千島、カムチャツカ、アラスカ

ヤツシロガイ科

1. *Tonna luteostoma* (Kuster) ヤツシロガイ
 - ・ 大槌湾、気仙沖、三陸南部北半、50~200m, 細砂底
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南~沖縄;インド・西太平洋、ニュージーランド

トウカムリ科

1. *Phalium (Bezoardicella) flammiferum* (Roding) カズラガイ
 - ・ 気仙沖、10~100m, 砂底
 - ・ 本州沿岸以南~沖縄;朝鮮、黄海、中国沿岸

フジツガイ科

1. *Fusitriton oregonensis* (Redfield) アヤボラ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮下部~400m, 砂泥底
 - ・ 相模湾・能登半島以北~東北、北海道;カムチャツカ、北米西岸
2. *Reticutriton tenuiliratus* (Lischke) ナガスズカケボラ
 - ・ 三陸北部南半、潮下部~100m, 岩礁
 - ・ 三陸沿岸・能登半島以南~九州
3. *Charonia sauliae sauliae* (Reeve) ボウシュウボラ
 - ・ 三陸南部北半、10~100m, 岩礁
 - ・ 本州沿岸以南~日本各地;フィリッピン

アミメケシカニモリ科

1. *Notoseila lequeata* (Gould) ケシカニモリ
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南~九州;東シナ海、10~50m, 細砂底
2. *Notoseila yokoyamai* (Cossmann) ヨコヤマケシカニモリ
 - ・ 三陸南部北半、潮間帯~115m, 砂底
 - ・ 三陸沿岸・能登半島以南~九州

ハナゴウナ科

1. *Balcis shibana* (Yokoyama) シバセトモノガイ
 - ・ 大槌湾、三陸南部北半、100~600m, 泥底のオキナマコに寄生
 - ・ 三陸沿岸、相模湾
2. *Balcis sagamiana* (Yokoyama) サガミセトモノガイ
 - ・ 大槌湾
 - ・ 相模湾
3. *Balcis glabroides* (Yokoyama)
 - ・ 三陸南部北半(NOMURA&HATAI, 1935)
4. *Balcis mabutii* (Nomura & Hatai)
 - ・ 三陸南部北半(NOMURA&HATAI, 1935)
 - ・ 東北地方(三陸沿岸)

ダニガイ科

1. *Pelseneeria castanea* (Dall) ダニガイ
 - ・ 岩手県以南～九州、潮間帯、アカウニの肛門付近に寄生

新腹足目

アクキガイ科

1. *Trophonopsis delicatus* Kuroda ヒナノツノオリイレ
 - ・ 大槌湾、三陸沿岸、100～500m、細砂底
 - ・ 三陸沿岸～九州
2. *Trophonopsis concinnus* (A. Adams) ムシロツノオリイレ
 - ・ 三陸沿岸～九州、100～500m、細砂底
3. *Trophonopsis scintula* (Dall) スイショウツノオリイレ
 - ・ 三陸沖、100～200m、砂底
 - ・ 千島列島以南～北海道、東北沖
4. *Trophonopsis crystallinus* Kuroda チヂワツノオリイレ
 - ・ 宮古沖、177m、砂泥底
 - ・ 千島列島以南～北海道、三陸沖、100～200m、砂泥底
5. *Trophonopsis soyoae minimus* Okutani マメツノオリイレ
 - ・ 北海道(恵山沖)以南～東北、鹿島灘(800～1250m)
6. *Trophonopsis stephanus* Is. Taki ヨウラクツノオリイレ
 - ・ 陸前高田沖、宮城県、200m
 - ・ 三陸沿岸～北海道
7. *Boreotrophon xestra nipponicus* Yokoyama ヤマトツノオリイレ
 - ・ 相模湾、三宅島以北～三陸沿岸、北海道南部、500～1200m、泥底
8. *Boreotrophon candelabrum* (Reeve) ツノオリイレ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～200m、砂礫底
 - ・ サハリン・千島以南～北海道、三陸沖～紀伊半島、瀬戸内海、日本海(若狭湾)
9. *Boreotrophon alasukanus* Dall シロハシツノオリイレ
 - ・ 久慈沖、陸前沖
 - ・ 鹿島灘以北～東北、北海道;千島、ベーリング海、50～450m、砂底
10. *Boreotrophon flos* Okutani ヤグルマツノオリイレ
 - ・ 鹿島灘以北、三陸沿岸沖、600～1000m、砂底
11. *Siphonochelus japonicus* (A. Adams) エントツヨウラク
 - ・ 大槌湾、20～200m、砂底
 - ・ 三陸沿岸以南～九州、若狭湾
12. *Ceratostoma burnetti* (A. Adams & Reeve) ヒレガイ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～100m、岩礁
 - ・ 房総半島・対馬海峡以北～日本海、北海道;沿海州、千島
13. *Ceratostoma inornatus* (Recluz) オオウヨウラク
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～20m、岩礁
 - ・ 北海道・男鹿半島以南～九州;朝鮮、中国
14. *Ceratostoma inornatus endermonis* (Smith) エゾヨウラク
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～20m、岩礁
 - ・ 北海道以南～三陸沿岸、山形沖～九州西岸
15. *Pteropurpura (Ocinebrellus) falcata* (Sowerby) ヨウラクガイ
 - ・ 北海道南部・能登半島以南～九州;台湾、朝鮮、20～200m、岩礫底
16. *Pteropurpura (Ocinebrellus) adunca* (Sowerby) イセヨウラク
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～50m、岩礫底
 - ・ サハリン・北海道以南～九州
17. *Thais (Reishia) bronni* (Dunker) レイシガイ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～下部、岩礁
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南～九州;朝鮮、中国
18. *Thais (Reishia) clavigera* (Kiister) イボニシ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～下部、岩礁
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南～日本各地;朝鮮、台湾、中国
19. *Thais (Reishia) luteostoma* (Holten) クリフレイシ
 - ・ 三陸南部北半、潮下部～10m、岩礁
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南～日本各地;中国、東南アジア
20. *Nucella heyseana* (Dunker) チヂミボラ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～20m、岩礁
 - ・ 房総半島・山形(妻鹿)以北～三陸沿岸、北海道;千島、オホーツク
21. *Nucella freycineti* (Deshayes) エゾチヂミボラ
 - ・ 東北地方以北～北海道;千島、オホーツク、潮下部、岩礁
22. *Nucella freycineti alabaster* Pilsbry ナガチヂミボラ

- ・ 東北以北～北海道;千島、潮間帯～20m, 岩礁
- 23. *Rapana bezoar* (Linnaeus) チリメンボラ
 - ・ 北海道南部・能登半島以南～九州;台湾、中国、フィリッピン、10～50m, 砂泥底
- 24. *Rapana venosa* (Valenciennes) アカニシ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～30m, 砂泥底
 - ・ 北海道西南以南～日本各地;台湾、中国沿岸

フトコロガイ科

1. *Mitolella bicincta* (Gould) ムギガイ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～20m, 岩礁の海藻上
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南～日本全国;インド・太平洋域
2. *Mitolella tenuis* (Gaskoin) コウダカマツムシ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～20m, 砂礫間
 - ・ 九州西岸・駿河湾以北～北海道;サハリン、沿海州、カムチャツカ
3. *Indomitrell yabei* (Nomura) スミスシラゲ
 - ・ 三陸沿岸、内湾の砂地
 - ・ 三陸沿岸・佐渡島以南～沖縄
4. *Indomitrell martensi* (Lischke) マルテンマツムシ
 - ・ 北海道南部・佐渡島以南～九州、潮間帯、内湾の海藻の間
5. *Zafra pumila* (Dunker) ノミニナ
 - ・ 三陸沿岸、潮間帯、岩礁の海藻中
 - ・ 東北地方以南～沖縄

オリエレヨフバイ科

1. *Niotha livescens* (Philippi) ムシロガイ
 - ・ 陸前、陸中(大槌湾)、潮間帯～50m, 細砂底
 - ・ 本州以南～日本各地;インド・太平洋
2. *Reticunassa festiva* (Powys) アラムシロ
 - ・ 三陸沿岸内湾、潮間帯、砂海底
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南～日本各地;朝鮮、台湾、フィリッピン
3. *Reticunassa japonica* (Lischke) キヌボラ
 - ・ 大槌湾、大船渡湾、広田湾、潮間帯の細砂底
 - ・ 本州以南～日本各地;朝鮮、台湾、中国北部
4. *Reticunassa fratercula* (Dunker) クロスジムシロ
 - ・ 宮古湾、山田湾、広田湾、潮間帯の砂泥底や岩礫底
 - ・ 北海道以南～九州;朝鮮、中国
5. *Reticunassa fratercula hiradoensis* (Pilsbry) ウネムシロ
 - ・ 北海道以南～九州、潮間帯、岩礫地
6. *Reticunassa fratercula hizenensis* (Pilsbry) ヒメウネムシロ
 - ・ 北海道以南～九州、潮間帯、岩礫地
7. *Reticunassa fratercula hypolia* (Pilsbry) アオモリムシロ
 - ・ 三陸南部北半、潮間帯、岩礫地
 - ・ 北海道以南～九州
8. *Reticunassa multigranosa* (Dunker) ヒメムシロ
 - ・ 大槌湾、三陸南部北半、潮間帯～20m, 岩礫底
 - ・ 北海道以南～日本各地、朝鮮、中国北部

エゾバイ科

1. *Beringius polynematicus* (Pilsbry) ナガバイ
 - ・ 三陸沿岸沖、300～400m, 泥底
 - ・ 銚子沖以北～北海道;ベーリング、アラスカ
2. *Beringius frielei* (Dall) ヒメナガバイ
 - ・ 東北以北～北海道;千島、ベーリング、50～200m, 泥底
3. *Beringius miyauchii* Habe & Ito ミヤウチヒメナガバイ
 - ・ 東北以北～北海道;ベーリング、50～200m, 泥底
4. *Japelon (Japelon) hirasei* (Pilsbry) ネジヌキバイ
 - ・ 三陸沿岸沖、200～400m, 泥底
 - ・ 銚子沖以北～北海道の太平洋側;オホーツク、ベーリング
5. *Japelon (Metajapelon) piricochlion* (Schrenck) ネジボラ
 - ・ 三陸沿岸沖、100～400m, 泥底
 - ・ 銚子沖以北～北海道(東岸、石狩沖)
6. *Volutopsius middendorffi* (Dall) カミオボラ
 - ・ 三陸沿岸沖、22～450m, 泥底
 - ・ 鹿島灘・富山湾以北～北海道;オホーツク、ベーリング

7. *Volutopsius pallidus* Tiba ミユキカミオボラ
 - ・ 久慈沖、400m, 海底
 - ・ 三陸沿岸沖～北海道南岸沖;190m～400m 前後の泥底
8. *Volutopsius simplex* (Dall) クリイロカミオボラ
 - ・ 久慈沖、100～150m, 泥底
 - ・ 東北以北～北海道;千島、オホーツク先端西沖、ベーリング島沖
9. *Habevolutopsius hirasei* (Pilsbry) リクゼンボラ
 - ・ 気仙沖、80～300m, 泥底
 - ・ 対馬沖・銚子沖以北～北海道(エリモ沖)
10. *Pyrolofusus dexius dexius* (Dall) キタノミギマキタテコトナシボラ
 - ・ 岩手久慈沖以北～北海道;千島、カムチャツカ、ベーリング、100～200m, 泥底
11. *Pyrolofusus dexius japonicus* Habe, Ito & Tanji ミギマキタテコト
 - ・ 三陸沖以北～北海道南東沖;千島、カムチャツカ、50～150m, 砂泥底
12. *Mohnia murticostata* Habe & Ito シワミドリホソバイ
 - ・ 久慈沖、100～300m, 泥底
 - ・ 鹿島灘以北～東北、北海道;千島。但馬沖～能登半島沖
13. *Mohnia iwateana* Tiba イワテホソバイ
 - ・ 久慈沖、200～250m
 - ・ 本州～北海道太平洋岸
14. *Mohnia daphnelloides* Okutani
 - ・ 銚子沖以北～東北沿岸沖
15. *Mohnia hondoensis* (Dall) ホソバイ
 - ・ 久慈沖、気仙沖、150～500m, 泥底
 - ・ 三陸沖以北～北海道;千島、ベーリング
16. *Colus (Colus) kujiana* Tiba ツムバイ
 - ・ 久慈沖、気仙沖、50～400m, 泥底
 - ・ 三陸沖・但馬沖以北～北海道東岸
17. *Plicifusus polypleuratus* (Dall) シワバイ
 - ・ 東北地方以北～北海道。日本海;エトロフ、樺太
18. *Plicifusus levis* Tiba ウスデシワバイ
 - ・ 三陸沖(久慈、八木、綾里)250～300m
 - ・ 陸前沖、三陸沖
19. *Plicifusus rhyssoides* Dall リクゼンシワバイ
 - ・ 三陸沖(綾里沖、気仙沖)、100～300m, 泥底
 - ・ 鹿島灘以北～東北、北海道;サハリン、オホーツク
20. *Parancistrolepis fujitai* (Kuroda) フジタバイ
 - ・ 気仙沖、三陸沖、100～300m, 砂泥底
 - ・ 遠州灘以北～相模湾、鹿島灘、東北、北海道南部
21. *Clinopeguma unicum unicum* (Pilsbry) モロハソバイ
 - ・ 気仙郡沖、50～200m, 砂泥底
 - ・ 銚子沖以北～三陸沖、北海道南岸
22. *Clinopeguma sasakii* Habe & Ito ササキモロハソバイ
 - ・ 久慈沖、200～300m, 砂泥底
 - ・ 久慈沖～北海道南部沖
23. *Bathyancistrolepis trochouideus* (Dall) ワタゾコチヂワバイ
 - ・ 三陸沿岸、100～1500m, 泥底
 - ・ 相模湾以北～三陸沿岸
24. *Bathyancistrolepis trochouideus ovoideus* (Habe & Ito) チヂワバイ
 - ・ 三陸沖、100～1500m, 砂泥底
 - ・ 土佐沖以北～遠州灘、三陸沖
25. *Pseudoliomesus ooides* (Middendorff) タマゴバイ
 - ・ 三陸沿岸、20～400m, 砂泥底
 - ・ 三陸沿岸以北～北海道;サハリン、千島、ベーリング、オホーツク
26. *Pseudoliomesus ooides canaliculatus* (Dall) イワデイトマキバイ
 - ・ 綾里沖、気仙沖
 - ・ 三陸沿岸(高田沖)以北～北海道;ベーリング、アラスカ
27. *Neptunea (Neptunea) polycostata* Scalato エゾボラ
 - ・ 宮古沖、?
 - ・ 房総半島・但馬沖以北～北海道;サハリン、千島、沿海州
28. *Neptunea (Neptunea) intersculpta* (Sowerby) エゾボラモドキ
 - ・ 太平洋側、鹿島灘以北～三陸沖、北海道;千島、ベーリング、50～1200m, 砂泥底
 - ・ 日本海側、見島沖以北～富山湾、山形県沖、150～750m, 砂底
29. *Neptunea (Neptunea) frator* (Pilsbry) コエゾボラモドキ
 - ・ 大槌沖、綾里沖、50～1000m, 砂泥底

- ・ 銚子沖以北～北海道東北部
- 30. *Neptunea (Neptunea) constricta* (Dall) チヂミエゾボラ
 - ・ 鹿島灘・但馬沖以北～東北(東西両岸)、北海道東南部、200～600m、砂泥底
- 31. *Neptunea (Neptunea) vinosa* (Dall) フジイロエゾボラ
 - ・ 陸前沖・但馬沖以北～北海道、30～100m、砂泥底
 - ・ 北海道以北～千島、サハリン、カムチャツカ、ベーリング海
- 32. *Neptunea (Neptunea) heros* (Gray) アツエゾボラ
 - ・ 銚子沖以北～北海道;カムチャツカ沖、ベーリング海、100～200m、砂礫底
- 33. *Neptunea (Neptunea) bulbacea* (Berbardi) ダルマエゾボラ
 - ・ 陸前
 - ・ 本州東北岸以北～北海道、日本海;千島、サハリン
- 34. *Neptunea (Barbitonia) arthritica* (Bernardi) ヒメエゾボラ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮下部～20m、岩礫底
 - ・ 銚子以北～北海道;千島、サハリン、オホーツク、沿海州
- 35. *Golikovia ennae* (Sakurai & Tiba) マドカエゾボラ
 - ・ 綾里沖、100～200m、砂泥底
 - ・ 銚子沖以北～岩手県沖
- 36. *Siphonalia spdicea* (Reeve) マユツクリ
 - ・ 三陸沿岸一帯、20～250m、砂泥底
 - ・ 北海道名南西部・男鹿半島以南～九州
- 37. *Kelletia lischkei* Kuroda ミガキボラ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～60m、岩礁
 - ・ 陸奥湾以南～九州(中西部)
- 38. *Searlesia fuscolabiata* (Smith) エゾイソニナ
 - ・ 三陸南部北半、潮下部～270m、岩礁・礫地
 - ・ 三陸南部・能登半島以北～北海道;朝鮮半島
- 39. *Babylonia japonica* (Reeve) バイ
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南～九州;朝鮮半島、中国、潮間帯～30m、砂底
- 40. *Buccinum inclutum* Pilsbry ヒモマキバイ
 - ・ 三陸沿岸北部・越前沖以北～北海道;千島、潮間帯～50m、砂泥底
- 41. *Buccinum niponense* Dall ヒメシライトマキ
 - ・ 気仙沖、100～300m、砂泥底
 - ・ 房総半島沖～三陸沿岸、北海道南岸
- 42. *Buccinum isaotakii* Kira シライトマキ
 - ・ 三陸沿岸一帯、東北北部、50～100m、砂泥底
- 43. *Buccinum middendorffi* Verkrui エゾバイ
 - ・ 本州東北以北～北海道;千島、サハリン、潮間帯～20m、岩礁
- 44. *Buccinum polare* Gray コエゾバイ
 - ・ 東北地方以北～北海道;千島、サハリン、潮下部、岩礁
- 45. *Buccinum kashimanum* Okutani カシマナダバイ
 - ・ 鹿島灘以北～東北(三陸沖)、北海道、500～2000m、砂泥底
- 46. *Volutharpa ampullaca perryi* (Jay) モスソガイ
 - ・ 三陸沿岸一帯、10～70m、砂泥底
 - ・ 瀬戸内海・朝鮮南部以北～日本海、太平洋岸、北海道;ベーリング

イトマキボラ科

1. *Fusinus perplexus* (A. Adams) ナガニシ
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南～九州南部;朝鮮半島、10～100m、砂底
2. *Fusinus ferrugineus* Kuroda & Habe コナガニシ
 - ・ 三陸北部南半、潮下部～50m、砂泥底
 - ・ 陸奥湾・能登半島以南～九州

マクラガイ科

1. *Olivella japonica* Pilsbry ホタルガイ
 - ・ 三陸南部北半、潮下部～30m 砂底
 - ・ 本州以南～九州
2. *Olivella signata* Lischke ハナアヤメ
 - ・ 大槌湾、10～30m、細砂底
 - ・ 三陸(大槌湾)以南～九州;中国
3. *Olivella fulgurata* (A. Adams & Reeve) ムシボタル
 - ・ 三陸南部北半、潮間帯～20m、砂底
 - ・ 本州以南～沖縄;台湾、南シナ
4. *Olivella spretoides* Yokoyama ワタゾコボタル
 - ・ 大槌湾、30～450m、砂底
 - ・ 本州以南～土佐沖、九州西岸;東シナ海

ミノムシガイ科

1. *Pusia aemula* (Smith) シイノミツクシ
 - ・ 三陸沿岸南部・男鹿半島以南～九州、潮間帯～20m, 岩礫

フデヒタチオビ科

1. *Volutomitara alasukana* Dall フデヒタチオビ
 - ・ 久慈沖、宮古沖、三陸沖 100～200m, 泥底
 - ・ 鹿島灘以北～北海道南部;ベーリング、アメリカ西岸。佐渡島 400～1000m, 砂泥底

ガクフボラ科

1. *Nipponomelon prevostiana* (Crosse) ホンヒタチオビ
 - ・ 気仙沖、50～450m, 泥底
 - ・ 駿河湾・但馬沖以北～三陸沿岸
2. *Nipponomelon maguna* (Kuroda & Habe) オオヒタチオビ
 - ・ 三陸沖
 - ・ 相模湾～三陸沖、北海道、男鹿半島以北、50～600m, 泥底

コゴメガイ科

1. *Cystiscus (Kogomea) japonicus* (Nomura & Hatai) コゴメガイ
 - ・ 三陸南部北半、広田湾、5～50m, 砂底
 - ・ 本州沿岸～九州
2. *Cystiscus (Kogomea) novemprovincialis* (Yokoyama) リュウグウコゴメ
 - ・ 三陸北部南半
 - ・ 三陸沿岸南部以南～九州;東シナ海、20～300m, 細砂底
3. *Sydaphera spengleriana* (Deshayes) コロモガイ
 - ・ 三陸沿岸一帯、10～50m, 砂泥地
 - ・ 北海道・男鹿半島以南～日本各地;中国、インド・太平洋
4. *Habesolatia nodulifera* (Sowerby) トカシオリイレ
 - ・ 三陸沿岸、20～50m, 砂泥底
 - ・ 本州沿岸以南～九州;朝鮮、東シナ海
5. *Admete couthouyi* (Jay) エゾゴロモ
 - ・ 駿河湾・鹿島灘(1000m)・但馬沖以北～東北、北海道、50～300m, 砂泥底
 - ・ 千島、ベーリング、オホーツク
6. *Neadmete japonia lischkei* (Yokoyama)
 - ・ 三陸沿岸(大槌湾口の深所)

クダマキガイ科

1. *Clathrodorillia takeokensis* (Otuka) ミドリモミジボラ
 - ・ 三陸沖、100～600m, 砂泥底
 - ・ 駿河湾以北～鹿島灘、三陸沖、北海道
2. *Elaeocyma (Splendrillia) aomoriensis* (Nomura & Hatai) ゴシキモミジボラ
 - ・ 三陸沿岸沖、60～200m, 砂礫底
 - ・ 銚子沖、三陸沖、志摩半島沖、青森県沖
3. *Inquister jeffreysii* (E. A. Smith) モミジボラ
 - ・ 三陸沿岸、10～100m, 砂底
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南～九州;朝鮮半島
4. *Spirotropis declivis* (v. Martens) トガリクダマキ
 - ・ 三陸沿岸一帯、20～300m, 砂底
 - ・ 北海道南部・越前沖以南～三陸沿岸、四国、九州
5. *Viridoturris feris* Kuroda & Oyama メデタコシヤジクの近似種
 - ・ 大槌湾、湾口深所
6. *Aforia circinata* (Dall) ヤゲンイグチ
 - ・ 三陸沿岸一帯、60～600m, 泥底
 - ・ 銚子沖・能登半島沖以北～東北、北海道;ベーリング海、アラスカ
7. *Antiplanes contaria* (Yokoyama) ヒダリマキイグチ
 - ・ 三陸沿岸一帯、50～500m, 細砂底
 - ・ 鹿島灘・但馬沖以北～東北、北海道;オホーツク、ベーリング海
8. *Antiplanes osimai* Ooyama, MS. カシマヒダリマキイグチ
 - ・ 鹿島灘以北～三陸沿岸
9. *Rectiplanes (Rectiplanes) sanctioannis* (Smith) エゾイグチ
 - ・ 三陸沿岸一帯、50～1000m, 砂泥底
 - ・ 銚子沖・但馬湾以北～東北、北海道;オホーツク海
10. *Rectiplanes (Rectiplanes) kawamurai* Habe カワムラエゾイグチ
 - ・ 三陸沿岸沖、200～300m, 砂泥底

- ・ 銚子沖以北～千島列島
- 11. *Rectiplanes (Rectiplanes) yukiiae* Shikama チチカケイグチ
 - ・ 三陸沿岸沖、200～600m, 砂泥底
 - ・ 銚子沖以北～三陸沿岸、北海道
- 12. *Rectiplanes (Rectiplanes) isaotakii* Habe タキエゾイグチ
 - ・ 三陸沿岸沖、200～600m, 砂泥底
 - ・ 銚子沖以北～三陸沿岸沖
- 13. *Rectiplanes (Rectiplanes) motojimai* Habe モトジマイグチ
 - ・ 三陸沖、200～400m, 砂泥底
 - ・ 銚子沖以北～三陸沖。但馬沖
- 14. *Decolliodrillia nigra* Habe & Ito クビキレシヤジク
 - ・ 岩手県沖、約200m, 砂泥底
 - ・ 本州東北・越後沖以北～北海道、50～200m
- 15. *Rhodopetoma erosa* (Shrenck) エゾシヤジク
 - ・ 三陸沿岸、50～200m, 砂泥底
 - ・ 三陸沿岸・但馬沖以北～東北、北海道;サハリン
- 16. *Rhodopetoma akkeshiensis* Habe アッケシシヤジク
 - ・ 大槌湾、三陸沿岸、50～100m, 砂泥底
 - ・ 三陸沿岸以北～北海道
- 17. *Paradorillia consimilis* (Smith) ヒメシヤジク
 - ・ 三陸沿岸、20～150m, 砂泥
 - ・ 三陸沿岸・男鹿半島以南～九州
- 18. *Paradorillia patruelis* (E. A. Smith) オビヒメシヤジク
 - ・ 大槌湾、三陸沿岸、20～150m, 砂泥底
 - ・ 三陸沿岸・男鹿半島以南～九州
- 19. *Paradorillia inconstans* (E. A. Smith) イボヒメシヤジク
 - ・ 大槌湾、10～100m, 砂泥底
 - ・ 三陸沿岸・男鹿半島以南～九州
- 20. *Riuguhdrillia engonia* (Watson) ヤゲンクダマキ
 - ・ 三陸沿岸、200～1000m, 泥底
 - ・ 相模湾以北～鹿島灘、三陸沿岸
- 21. *Ophiidermella miyatensis* (Yokoyama) クリイロフタマンジ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～250m, 岩礁
 - ・ 北海道以南～本州東北、能登半島、対馬
- 22. *Etrema (Etrempa) texta* (Dunker) アミコシボソクチキレ
 - ・ 三陸沿岸、潮間帯～20m, 砂礫
 - ・ 三陸沿岸・能登半島以南～九州
- 23. *Etrema (Etrempa) subauriformis* (E. A. Smith) ヌノメシヤジク
 - ・ 三陸沿岸、10～60m, 砂底
 - ・ 三陸沿岸・男鹿半島以南～九州;中国沿岸
- 24. *Pseudoetrema fortilirata* (E. A. Smith) ホソシヤジク
 - ・ 三陸沿岸、10～50m, 砂底
 - ・ 三陸沿岸・山形県以南～九州
- 25. *Lienardia (Lienardia) gainesi* (Pilsbry) チャイロフタナシシヤジク
 - ・ 三陸南部北半
- 26. *Leiocithara longispira* (Smith) ヤセシヤジク
 - ・ 三陸沿岸、5～30m, 細砂底
 - ・ 三陸沿岸以南～四国、佐渡島以南～但馬沖、九州西岸
- 27. *Nematoma hokkaidoensis* Bartsch ミドリフタマンジ
 - ・ 三陸沿岸、200～400m, 砂泥底
 - ・ 三陸沿岸以北～北海道。但馬沖以北～佐渡島
- 28. *Obesotoma schantarica* (Middendorff) ニクイロフタマンジ
 - ・ 但馬沖・東北以北～北海道;オホーツク、5～255m, 砂底
- 29. *Obesotoma japonica* Bartsch チャイロフタマンジ
 - ・ 東北沿岸以北～北海道;千島、オホーツク、ベーリング、40～160m 砂泥底
- 30. *Obesotoma oyashio* Sikama ウスベニハラブトクダマキ
 - ・ 鹿島灘以北～東北、400～700m, 砂底
- 31. *Oenopota hanazakiensis* Habe ハナサキフタマンジ
 - ・ 大槌湾、200～500m, 泥底
 - ・ 三陸沿岸(大槌)・但馬以北～北海道東南部
- 32. *Propebella yokoyamai* (Onoyama) ヨコヤマニヨリマンジ
 - ・ 大槌湾、潮間帯～20m, 砂泥底
 - ・ 館山湾・但馬沖以北～三陸沿岸、北海道
- 33. *Propebella ? siogamaensis* Nomura & Zinbo
 - ・ 三陸沿岸大槌湾

- ・ 宮城県松島湾
- 34. *Mangelia (Gurleus) deshayssii* Dunker スソチャマンジ
 - ・ 大槌湾、5～50m, 砂底
 - ・ 三陸沿岸・佐渡以南～九州
- 35. *Mangelia (Gurleus) tokunagai* (Finlay) ヤセマンジ
 - ・ 三陸沿岸大槌湾、泥底
- 36. *Philbertia (Pseudodaphnella) leukarti* (Dunker) クリイロマンジ
 - ・ 三陸南部北半、潮間帯～20m, 岩礁・砂礫
 - ・ 三陸沿岸以南～九州。男鹿半島以南～但馬沖

タケノコガイ科

1. *laeviacus pustulosa* (E. A. Smith) ホソコゲチャタケ
 - ・ 三陸南部北半
 - ・ 三陸南部以南～宮崎県沖、潮間帯～50m, 砂底

アサガオガイ科

1. *Janyhina janthina* (Linnaeus) アサガオガイ
 - ・ 世界の温熱帯海域、海表面に浮遊生活
2. *Violetta globosa* (Swainson) ルリガイ
 - ・ 世界の温熱帯海域、海表面に浮遊生活

イトカケガイ科

1. *Acirsa (Acirsa) ochotensis* (Middendorff) オホーツクイトカケ
 - ・ 本州東北沿岸以北～北海道;オホーツク、アラスカ、ベーリング、30～100m?
2. *Cirsotrema (Cirsotrema) kagayai* Habe & Ito ホッカイトカケ
 - ・ 銚子沖以北～東北、北海道;千島、200～300m, 砂泥底
3. *Gyroskala (Pomiscula) pelplexa* (Pease) ネジガイ
 - ・ 北海道南部以南(太平洋側)、男鹿半島(日本海側)～沖縄、インド・太平洋
 - ・ 潮間帯～10m, イソギンチャク類に付着
4. *Boreoskala greenlandica* (Peery) エゾイトカケ
 - ・ 大槌、150～300m
 - ・ 銚子沖・但馬沖以北～東北、北海道;アラスカ、30～260m, 砂泥底
5. *Cycloscala laxatoides* (Kuroda, MS.) ハズレイトカケ
 - ・ 東北太平洋岸以南～土佐沖、100～200m, 砂泥底
6. *Nystiella hiranoi* Sikama ヒラノイトカケ
 - ・ 銚子沖以北～東北地方、500m
7. *Spiniscala japonica* (Dunker) ヒメネジガイ
 - ・ 山田湾、三陸南部北半、潮間帯の岩礁、イソギンチャクに付着
 - ・ 本州沿岸以南～九州
8. *Spiniscala casta* (Sowerby) ナガヒメネジガイ
 - ・ 北海道西南部以南～九州、潮間帯、岩礁
9. *Cinctiscala sagamiense* (Pilsbry) サガミイトカケ
 - ・ 大槌湾、5～115m, 砂底
 - ・ 本州沿岸以南～九州
10. *Cinctiscala sagamiense azumanaum* (Yokoyama) アヅマイトカケ
 - ・ 大槌湾
 - ・ 三陸沿岸、房総半島沖、50～120m
11. *Cinctiscala exmiella* Masahito, Kuroda & Habe ホソサガミイトカケ
 - ・ 大槌湾
 - ・ 三陸沿岸・能登半島以南～九州、20～115m, 砂底
12. *Cinctiscala kazusense* (Yokoyama) カズサイトカケ
 - ・ 大槌湾
 - ・ 銚子沖、三陸沿岸

ホソアラレキリオレ科

1. *Inella japonica* Kuroda & Kosuge アラレキリオレ
 - ・ 三陸南部北半、潮間帯～100m, 砂底
 - ・ 三陸沿岸・男鹿半島以南～九州
2. *Triphora otsuensis* (Yokoyama) ホソアラレキリオレ
 - ・ 北海道・佐渡島以南～九州、潮間帯～80m, 礫間

トウガタガイ科

1. *Leucotina nomurai* Habe コガタマキモノガイ
 - ・ 大槌湾、40～70m, 砂底、浪の助島沖 63m
 - ・ 銚子沖～三陸沿岸(大槌湾)
2. *Leucotina dianai* (A. Adams) マキモノガイ
 - ・ 大槌湾 40～70m, 浪の助島沖 60m, 長崎沖 52m
 - ・ 三陸沿岸沖～九州、佐渡以南～九州北部、10～300m, 砂泥底
3. *Tiberia (Orinella) ebarana* (Yokoyama) エバラクチキレ
 - ・ 大槌湾、10～50m, 砂泥底
 - ・ 三陸沿岸、房総半島、志摩半島、瀬戸内海、四国、九州
4. *Tiberia (Orinella) pulchella* (A. Adams) クチキレガイ
 - ・ 陸奥湾、男鹿半島以南～九州南部迄の日本全国、潮下部～30m
5. *Tiberia (Orinella) dunkeri* (Dall & Bartsch) ドウンケルクチキレ
 - ・ 大槌、潮間帯～50m, 砂泥底
 - ・ 三陸沿岸・能登半島以南～九州
6. *Derjuginella hanagaiensis* (Nomura) ハデクチキレ
 - ・ 模式産地・岩手県、10～50m, 砂底
 - ・ 銚子沖以北～東北北海道、若狭湾以北～佐渡・粟島沖、200～300m、砂底
7. *Derjuginella rufofasciata* (Smith) キンスジクチキレガイ
 - ・ 大槌沖、145m, 御箱崎沖、110～114m, 砂底
 - ・ 沿海州・三陸沿岸(大槌)～北海道;千島 10～50m
8. *Eulimella (Eulimella) opaca* A. Adams
 - ・ 大槌湾、52～55m
 - ・ 見島、63fms
9. *Eulimella (Eubala) pagodula* (Yokoyama) ナガセトモノクチキレ
 - ・ 大槌湾、5m
 - ・ 三陸沿岸、若狭湾、70～120m, 砂底
10. *Odostomia (Odostomia) desimana* Dall & Bartsch クチキレモドキ
 - ・ 本州沿岸以南～九州、30～110m, 砂泥地
11. *Odostomia (Odostomia) limpida* Dall & Bartsch スキクチキレモドキ
 - ・ 三陸沿岸(南部北半、大槌湾 20m)、瀬戸内海
12. *Odostomia (Odostomia) mabutii* Nomura
 - ・ 大船渡市赤崎町 蛸の浦
13. *Odostomia (Odostomia) optapa* Yokoyama ネガイクチキレモドキ
 - ・ 三陸南部北半
14. *Odostomia (Odostomia) subdiaphana* A. Adams
 - ・ 宮古湾
 - ・ 岩手県宮古、宮城県気仙沼、北海道南部、35fms.
15. *Odostomia (Odostomia) sublimpida* Yokoyama
 - ・ 房総半島以北～三陸青森県、潮間帯～20m, 砂底
16. *Odostomia (Sinuatodostomia) inbana* Nomura
 - ・ 大槌湾雀島沖、20m
17. *Odostomia (Evalea) culta* (Dall & Bartsch) ハブタエクチキレモドキ
 - ・ 三陸沿岸南部
 - ・ 函館湾・但馬沖以南～九州、潮間帯～砂泥地
18. *Odostomia (Evalea) sinuosa* Nomura イオウクチキレモドキ
 - ・ 大槌湾浪の助沖、三陸南部北半、潮下部～60m, 砂泥底
 - ・ 三陸沿岸・若狭湾以南～九州
19. *Odostomia (Evalea) omaensis* Nomura サザエクチキレモドキ
 - ・ 宮古沖、潮下部～100m, サザエの殻口付近に寄生
 - ・ 青森下北・但馬沖以南～見島、紀伊半島
20. *Odostomia (Marginodostomia) hilgendorfi* (Clessin) オリイレクチキレモドキ
 - ・ 大槌湾、20m
 - ・ 北海道南部・佐渡島以南～但馬沖、九州、潮間帯～90m, 砂底
21. *Odostomia (Marginodostomia) suturamarginata* Nomura アワジクチキレモドキ
 - ・ 三陸沿岸、潮間帯～100m, 砂底
 - ・ 青森県・但馬沖以南～九州
22. *Odostomia (Besla) bicinctella* (Yokoyama) フタスジクチキレ
 - ・ 三陸沿岸南部北半
 - ・ 東京都道灌山(f.)
23. *Siogamaia aksakiensis* Nomura
 - ・ 模式産地、大船渡市赤崎町蛸の浦
 - ・ 三陸沿岸(大槌湾)

24. *Siogamaia takonourana* Nomura
 ・ 大船渡市赤崎町蛸の浦
25. *Chrysallida (Chrysallida) shibana* (Yokoyama) シバヨロイクチキレ
 ・ 大槌湾、20m、三陸南部北半
 ・ 三陸沿岸
26. *Chrysallida (Partuliola) marielloides* (Yokoyama) サキヒダクチキレ
 ・ 大槌湾、20m、宮古湾、宮城県江ノ島沖、40m、岩礁・礫地
 ・ 三陸沿岸
27. *Chrysallida (Trabecula) tantilla* A. Adams
 ・ 三陸沿岸(宮古湾江ノ島沖)、40m、砂泥底
 ・ 三陸沿岸、相模湾
28. *Menestho exarata* A. Adams ヒサゴクチキレ
 ・ 大槌湾、大船渡湾、潮間帯～30m、砂泥地
 ・ 三陸沿岸以北～北海道;千島
29. *Menestho exaratisima* (Dall & Bartsch)
 ・ 三陸沿岸(大槌湾)
30. *Amaura japonica* (A. Adams) コシタカドウマルクチキレ
 ・ 大槌湾
 ・ 三陸沿岸・見島沖以南～銚子沖、相模湾
31. *Amaura kesenumensis* Nomura
 ・ 宮古湾、大槌湾
 ・ 三陸沿岸～気仙沼
32. *Symola (Symola) cinctella* A. Adams ホソクチキレ
 ・ 三陸南部北半、10～90m、砂泥底
 ・ 三陸沿岸・男鹿半島以南～九州
33. *Symola (Symola) subcinctella* Nomura コホソクチキレ
 ・ 大槌湾、大船渡市赤崎町蛸の浦、10～140m、砂泥底
 ・ 三陸沿岸・若狭湾以南～九州
34. *Symola (Symola) cinnamomea* (A. Adams) コゲチャチビクチキレ
 ・ 三陸南部北半、10～140m、砂泥底
 ・ 三陸沿岸男鹿半島以南～九州
35. *Symola (Symola) kesenensis* Nomura
 ・ 模式産地、陸前高田市広田町花貝
 ・ 分布同上
36. *Symola (Symola) hanagaiensis* Nomura
 ・ 模式産地、陸前高田市広田町花貝
 ・ 三陸沿岸(宮古湾、気仙郡)
37. *Styloptygma serotina* (A. Adams) ヤセクチキレ
 ・ 大槌沖、10～55m
 ・ 三陸沿岸(大槌)・但馬以南～九州、潮間帯～30m、砂底
38. *Agatha placida* (Nomura) マルミガキクチキレ
 ・ 大槌雀島沖、20m
39. *Agatha infrequens* Nomura
 ・ 大槌雀島沖
 ・ 三陸沿岸(大槌)、宮城県塩釜
40. *Turbonilla (Turbonilla) hanagaiana* Nomura
 ・ 模式産地、陸前高田市広田町花貝
 ・ 分布、同じ
41. *Turbonilla (Turbonilla) mara* Nomura
 ・ 大槌、浪の助島沖、52～55m
 ・ 岩手大槌湾～宮城塩釜湾
42. *Turbonilla (Turbonilla) pseudapproximata* Nomura
 ・ 大槌湾雀島、浪の助島沖、52～55m
 ・ 三陸沿岸、福井県玄達瀬
43. *Turbonilla (Turbonilla) rikuzenosimensis* Nomura
 ・ 宮古湾、宮城江ノ島沖、20fms.
 ・ 分布、同じ
44. *Turbonilla (Chemnitzia) tonbensis* Nomura
 ・ 大槌雀島沖、20m
 ・ 分布、同じ
45. *Turbonilla (Chemnitzia) multigrata* (Dunker) シロイトカケギリ
 ・ 宮古湾、大槌湾、大船渡門の浜
 ・ 三陸沿岸・能登半島以南～九州 10～150m、砂泥底

46. *Turbonilla (Chemnitzia) supramirabilis* Nomura キドイトカケギリ
 ・ 大槌湾、10m, 砂泥底
 ・ 三陸沿岸(大槌)以南～相模湾
47. *Turbonilla (Chemnitzia) fulvizonata* (Nomura) フタオビイトカケギリ
 ・ 大槌湾赤浜沖、10～100m, 砂泥底
 ・ 三陸沿岸～九州、山口県北部
48. *Turbonilla (Chemnitzia) approximata* Dall & Bartsch ニヨリイトカケギリ
 ・ 宮古湾、10～60m, 砂泥底
 ・ 三陸沿岸(宮古湾)以南～九州、山口県北部
49. *Turbonilla (Chemnitzia) keisukeana* Yokoyama ケイスケイトカケギリ
 ・ 大槌湾浪の助島
50. *Turbonilla (Pyrgiscus) kurodai* Nomura クロダイトカケギリ
 ・ 三陸沿岸沖
51. *Turbonilla (Pyrgiscus) amicitia* Nomura
 ・ 大槌湾浪の助島沖、52～55m
 ・ 三陸沿岸沖
52. *Turbonilla (Pyrgiscus) mabutii* Nomura
 ・ 模式産地、陸前高田市広田町天王前
 ・ 分布、同じ
53. *Turbonilla (Pyrgiscus) miyakoensis* Nomura
 ・ 宮古湾、大槌湾、50～150m, 砂泥底
 ・ 三陸沿岸沖
54. *Turbonilla (Asmunda) affectuosa* (Yokoyama) ヨコスジギリ
 ・ 岩手県・宮城県沖、潮下部～30m
 ・ 三陸南部北半
55. *Turbonilla (Ptycheulimella) yabei* Nomura アケボノクチキレガイ
 ・ 模式産地、宮古湾沖、100m, 大槌赤浜沖
 ・ 分布、同じ
56. *Turbonilla (Ptycheulimella) rikuzenica* Nomura
 ・ 宮古湾
 ・ 岩手宮古湾～宮城塩釜湾
57. *Turbonilla (Strioturbonilla) pacifica* Yokoyama タイヘイヨウイトカケギリ
 ・ 宮古湾、大船渡市末崎町泊里、潮下部～30m, 砂泥底
 ・ 三陸沿岸(岩手宮古湾～宮城鮎川沖)、佐渡島
58. *Turbonilla (Pyrgolampros) planicostata* Yokoyama ヒライイトカケギリ
 ・ 大槌湾、10～60m, 砂泥底
 ・ 三陸沿岸、佐渡島、瀬戸内海
59. *Turbonilla (Paramormula) aulca* Dall & Bartsch チャイロイトカケギリ
 ・ 大船渡市末崎町泊里、10～60m, 砂泥底
 ・ 三陸沿岸(末崎町泊里)・但馬沖以南～九州
60. *Turbonilla (Paramormula) tonbensis* Nomura
 ・ 大槌湾 雀島沖、20m
 ・ 三陸沿岸、九州(博多湾)
61. *Turbonilla (Pselliogyra) monocycla* (A. Adams) マキミゾイトカケ
 ・ 大槌湾、10～60m, 砂泥底
 ・ 三陸沖(大槌湾)・佐渡島以南～九州
62. *Turbonilla (Pselliogyra) sagamiana* Yokoyama サガミマキミゾイトカケギリ
 ・ 大槌湾、潮下部～60m, 砂泥底
 ・ 三陸沿岸(大槌湾)・佐渡島以南～九州
63. *Turbonilla (Sulcoturbonilla) ultraeta* Nomura カワリイトカケギリ
 ・ 陸前高田市広田町天王前、10～60m, 砂泥底
 ・ 岩手陸前高田、宮城金華山、山口県柳井市
64. *Turbonilla (Sulcoturbonilla) quantoana* Nomura カワリイトカケギリモドキ
 ・ 宮古湾、大槌湾、10～60m, 砂泥底
 ・ 三陸沿岸(岩手宮古湾～宮城江ノ島沖)、山口県青海島
65. *Cingulina (Cingulina) cingulata* (Dunker) ヨコイトカケギリ
 ・ 宮古湾、大船渡市赤崎町蛸の浦、潮下部～60m, 砂泥底
 ・ 三陸沿岸(岩手宮古湾～宮城鮎川)、佐渡
66. *Paracingulina tiarata* (Pilsbry) ミスジヨコイトカケギリ
 ・ 宮古湾、大槌湾、根浜3, 3m
 ・ 三陸沿岸以南～九州。男鹿半島以南～九州西岸、潮間帯～150m, 砂泥底
67. *Paracingulina inequicingulata* (Nomura) アダムズヨコイトカケギリ
 ・ 三陸沿岸、潮間帯～50m, 砂泥底
 ・ 陸奥湾・男鹿半島以南～三陸沿岸、瀬戸内海

- 68 *Kleinella amicalis* Yokoyama ハオリクチキレ
- ・ 宮古湾、大槌湾、10~30m, 砂泥底
 - ・ 三陸沿岸(宮古湾)~九州
69. *Kleinella neofelix* (Yokoyama) メグミクチキレ
- ・ 大槌湾、大船渡市末崎町泊里、10~30m 砂泥底
 - ・ 三陸南部北半、瀬戸内海
70. *Kleinella* sp. (cf. *neofelixoides* Nomura : *turris* Pilsbry, MS.) トウダカチリメンクチキレ
- ・ 大槌湾、10~30m, 砂泥底
 - ・ 三陸沿岸(大槌湾)以南~瀬戸内海、福岡県小戸
71. *Phasianema lirata* (A. Adams) ツトクチキレ
- ・ 大槌湾、赤浜港、湾口の深所
 - ・ 岩手大槌湾、浦賀、日本海見島

頭楯目

オオシイノミガイ科

1. *Acteon sieboldi* (Reeve) オオシイノミガイ
- ・ 宮古湾、10~300m, 砂底
 - ・ 三陸沿岸以南~九州

マメウラシマ科

1. *Ringicula (Ringiculina) doliaris* Gould マメウラシマ
- ・ 三陸沿岸一帯、5~150m, 砂泥
 - ・ 北海道・佐渡島以南~三陸沿岸、但馬沖、九州;朝鮮、中国

ベニシボリ科

1. *Bullina nobilis* Habe オオベニシボリ
- ・ 陸前高田市広田町前花貝、10~50m, 砂底
 - ・ 三陸沿岸(広田町)・但馬沖以南~九州

スイフガイ科

1. *Eoscapander fragilis* Habe オオスイフガイ
- ・ 駿河湾以北~東北東岸沖、北海道、100~300m、泥底
2. *Abderospira punctulata* (A. Adams) コキザミガイ
- ・ 大槌湾、50~210m、砂底
 - ・ 三陸沿岸・能登半島以南~九州
3. *Cylichna toyamaensis* Habe トヤマカイコガイダマシ
- ・ 久慈沖、250~400m
 - ・ 岩手久慈沖、日本海(但馬沖、能登半島、富山湾)
4. *Eocylichna braunsi* (Yokoyama) ツマベニクダタマガイ
- ・ 三陸北部南半、10~50m, 砂泥底
 - ・ 三陸沿岸・山形県以南~九州;東シナ海、中国、フィリッピン

オオコメツブガイ科

1. *Acteocina (Tomatina) exilis* (Daunker) ヨワコメツブガイ
- ・ 大槌湾、5~115m, 細砂底
 - ・ 三陸沿岸・男鹿半島以南~九州;東シナ海
2. *Acteocina (Tomatina) gordonis* (Yokoyama) ゴルドンコメツブガイ
- ・ 大槌湾、潮間帯~30m 砂泥底
 - ・ 三陸沿岸・若狭湾以南九州
3. *Acteocina (Tomatina) decorata* (Pilsbry) ツララガイ
- ・ 大槌湾、5~30m, 砂泥地
 - ・ 三陸沿岸・男鹿半島沖以南~九州
4. *Acteocina (Tomatina) truncatoides* (Nomura)
- ・ 東北地方(太平洋側)
5. *Acteocina (Actiocina) kesenensis* Nomura & Hatai
- ・ 三陸沿岸、南部北半
6. *Cylichnatys angusta* (Gould) カミスジカイコガイダマシ
- ・ 三陸南部北半
 - ・ 三陸沿岸一帯

キセワタ科

1. *Philine argentata* Gould キセワタ
- ・ 大槌湾、潮間帯~110m, 砂泥底
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南~日本各地;朝鮮、中国

2. *Yokoyamaia (Yokoyamaia) ornatissima* (Yokoyama) ヨコヤマキセワタ
 - ・ 大槌湾、大船度湾、5~30m, 内湾の泥底
 - ・ 北海道西南以南以南~九州

アワツブガイ科

1. *Diaphana tibai* Habe ミガキアワツブガイ
 - ・ 模式産地、久慈沖、200m
 - ・ 分布、同じ

タマゴガイ科

1. *Limulatys tortuosus* A, Adams クビレミドリタマゴガイ
 - ・ 東北沿岸以南~九州, by 清水目録, 1971, P. 219

ブドウガイ科

1. *Haloa japonica* (Pilsbry) ブドウガイ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯~50m, 海藻の生えたタイドプール
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南~九州;朝鮮半島
2. *Haloa margaritoides* Kuroda & Habe マタマブドウガイ
 - ・ 三陸沿岸以南、銚子沖、相模湾、潮間帯、海藻の間

ヘコミツララガイ科

1. *Retusa (Semiretusa) kesenensis* (Nomura & Hatai)
 - ・ 三陸沿岸気仙地方
2. *Retusa (Decolifer) insignis* (Pilsbry) コメツブガイ
 - ・ 大槌湾、気仙郡地方、潮間帯~30m, 砂底
 - ・ 本州沿岸以南~九州
3. *Retusa (Decolifer) matsusima* (Nomura) マツシマコメツブ
 - ・ 大槌湾、潮間帯~60m, 泥底
 - ・ 本州沿岸以南~九州
4. *Retusa (Decolifer) globosus* (Yamakawa) ドングリコメツブ
 - ・ 大槌湾、三陸南部北半、10~60m, 砂底
 - ・ 三陸沿岸以南~房総、志摩半島、九州
5. *Retusa (Decolifer) longispirata* (Yamakawa) クビマキコメツブ
 - ・ 三陸南部北半、10~60m, 泥底
 - ・ 三陸沿岸(南部)・島根県沖以南~瀬戸内
6. *Pyruunculus phialus* (A. Adams) シリプトカイコガイダマシ
 - ・ 大槌湾、20~400m, 砂泥底
 - ・ 北海道南部・佐渡島以南~九州
7. *Coleophysis succincta* (A. Adams) ヘコミツララガイ
 - ・ 大槌湾、10~400m, 砂泥底
 - ・ 北海道南西部・佐渡島以南~九州
8. *Coleophysis cucurbititina* (Yokoyama) ヒョウタンヘコミツララ
 - ・ 北海道南部以南~本州、九州、10~50m
9. *Coleophysis lineolatum* Yokoyama var. ヨコスジヘコミツララ近似種
 - ・ 三陸沿岸(大槌湾)
10. *Sulcoretusa minima* (Yokoyama) ヒメコメツブ
 - ・ 大槌湾、大船渡湾、三陸南部北半、10~100m, 砂泥底
 - ・ 本州沿岸~九州
11. *Volvulella eburneus* (A. Adams) マメヒガイ
 - ・ 大槌湾(20m)、潮下部~115m, 砂底
 - ・ 三陸沿岸・佐渡島以南~九州
12. *Rhizorus ovulinus* (A. Adams) タマゴマメヒメガイ
 - ・ 大槌湾 10~410m, 細砂底
 - ・ 北海道南部・佐渡島以南~九州
13. *Rhizorus tokunagai* (Makiyama) トクナガマメヒメガイ
 - ・ 大槌湾、5~115m, 砂泥底
 - ・ 三陸沿岸・栗島以南~九州
14. *Rhizorus radiolus* (A. Adams) アオモリマメヒメガイ
 - ・ 大船度、三陸南部北半、10~200m, 砂泥底
 - ・ 三陸沿岸、山形県沖、瀬戸内
15. *Rhizorus cylindrella* (A. Adams)
 - ・ 大槌湾、50~150m, 砂泥
 - ・ 三陸沿岸、若狭湾、見島、対馬

アメフラシ目

アメフラシ科

1. *Aplysia (Aplysia) juliana* Quoy & Gaimard アマクサアメフラシ
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南～日本全国;台湾、潮間帯～10m
2. *Aplysia (Varria) kurodai* (Baba) アメフラシ
 - ・ 大槌湾、三陸沿岸、潮間帯～20m, 緑藻類・褐藻類の間
 - ・ 北海道南西部・男鹿半島以南～日本全国
3. *Aplysia (Varria) oculifera* Adams & Reeve ミドリアメフラシ
 - ・ 青森県西南・相模湾以南～日本全国;台湾、インド・太平洋、潮間帯～岩礁の海藻
4. *Aplysia (Pruvotaplysia) parvula* Gould & Moersch クロヘリアアメフラシ
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南～九州、潮間帯～岩礁上褐藻上
5. *Petalifera punctulata* (Tapparone-Canefri) ウミナメクジ
 - ・ 青森県浅虫・新潟沿岸以南～九州;中国、アナアオサ等の海藻上
6. *Pleurobranchaea japonica* Thiele ウミフクロウ
 - ・ 本州全域(北陸を除く)、潮間帯～30m, 岩礁やアマモ等の砂上
7. *Gymnodoris bicolor* (Alder & Hancock) キヌハダモドキ
 - ・ 青森県以南～九州、;インド・太平洋、潮間帯～30m, 砂礫・岩礁

ウミウシ目

オカダウミウシ科

1. *Vaysiera elegans* Baba オカダウミウシ
 - ・ 北海道南部・山形沿岸以南～本州全域、潮間帯～30m, 岩礁・礫上の海藻

カドリナウミウシ科

1. *Cadrina japonica* Baba カドリナウミウシ
 - ・ 青森浅虫・男鹿半島以南～敦賀湾、相模湾、瀬戸内海、30～350m, 岩礁上

イロウミウシ科

1. *Chromodoris aureopurpurea* Collingwood コモンウミウシ
 - ・ 青森浅虫・男鹿半島以南～敦賀湾、相模湾、瀬戸内海、潮間帯～30m, 岩礁・礫上
2. *Hypselodoris festiva* (A. Adams) アオウミウシ
 - ・ 青森浅虫・山形以南～日本全域、潮下部～30m, 岩礁・礫の海藻上

チシオウミウシ科

1. *Aldisa sanguinea* (Cooper) チシオウミウシ
 - ・ 陸前高田広田湾鳥の巣、潮間帯
 - ・ 青森浅虫以南～大坂湾、九州西岸、潮間帯～30m, 岩礁・礫地

イソウミウシ科

1. *Rostanga orientalis* Rudman & Averm イソウミウシ
 - ・ 青森陸奥湾以南～日本ほぼ全域、潮間帯～30m, 岩礁・礫上

ヤマトウミウシ科

1. *Homoiodoris japonica* Bergh ヤマトウミウシ
 - ・ 気仙海岸、潮間帯～30m, 岩礁・礫地
 - ・ 青森以南～九州

クロシタナシウミウシ科

1. *Dendrodoris nigra* (Stimpson) クロシタナシウミウシ
 - ・ 陸前高田広田湾鳥の巣潮間帯
 - ・ 青森陸奥湾・男鹿半島以南～本州両岸全域、潮間帯～30m, 岩礁・礫上;インド・南太平洋

スギノハウミウシ目

ハナガサウミウシ科

1. *Tritonia exsulans* Bergh ホクヨウウミウシ
 - ・ 三陸沿岸、50～200m, 砂泥底
 - ・ 三陸沿岸・佐渡島以北～北海道;アラスカ、北アメリカ

スギノハウミウシ科

1. *Dendronotus frondosus* (Ascantius) スギノハウミウシ
 - ・ 三陸沿岸、10～100m, 岩礁
 - ・ 宮城女川・富山湾以北～北海道、大西洋・太平洋の北部海域

ミノウミウシ目

ヨツスジミノウミウシ科

1. *Facelinella quadrilineata* (Baba) ヨツスジミノウミウシ
 - ・ 青森陸奥湾・山形飛島以南～九州、潮間帯～30m、岩礁の海藻上

トモエウミウシ科

1. *Sakuraeolis enosimensis* (Baba) アカエラミノウミウシ
 - ・ 青森陸奥湾・山形飛島以南～本州両岸全域、潮間帯～30m、岩礁の海藻上

オオミノウミウシ科

1. *Aeolidia papillosa* (Linnaeus) オオミノウミウシ
 - ・ 三陸沿岸大槌湾、潮間帯～30m、岩礁
 - ・ 三陸沿岸以北～北海道;北太平洋、北大西洋
2. *Cerberill asamusiensis* Baba カスミノウミウシ
 - ・ 青森陸奥湾以南～九州、浅海の砂中に潜行

原始有肺目

オカミミガイ科

1. *Microtralia acteocinoides* Kuroda & Habe ナギサノシタタリ
 - ・ 岩手県、潮上部の礫間
 - ・ 北海道函館以南～九州

基眼目

カラマツガイ科

1. *Siphonaria (Scuclosiphonaria) japonica* (Danovan) カラマツガイ
 - ・ 三陸沿岸一体、潮間帯の岩礁や礫上
 - ・ 北海道南部・秋田県以南～九州;朝鮮、中国北部
2. *Siphonaria (Anthosiphonalia) sirius* (Pilsbry) キクノハナガイ
 - ・ 三陸南部北半、潮間帯の岩礁
 - ・ 本州沿岸以南～九州、沖縄;朝鮮半島
3. *Siphonacmea oplongata* (Yokoyama) キタノカラマツ
 - ・ 大槌、潮間帯、アマモの葉上
 - ・ 東北地方・男鹿半島以北～北海道;オホーツク、サハリン

頭足綱

八腕形目

アオイガイ科

1. *Argonauta argo* Linnaeus アオイガイ
 - ・ 気仙沿岸、越喜采、浮遊生活
 - ・ 北海道以南～太平洋、日本海の日本全国、全世界の熱帯・暖海域
2. *Argonauta hians* (Lightfoot) タコブネ
 - ・ 本州以南の日本全国;インド・太平洋の暖海域、浮遊生

二枚貝綱

キヌタレガイ目

キヌタレガイ科

1. *Petrasma pusilla* (Gould) キヌタレガイ
 - ・ 北海道南部以南～九州、潮間帯～200m 砂泥底
2. *Petrasma pervernicosa* Kuroda アブラキヌタレガイ
 - ・ 日本海・紀伊半島以北～北海道;オホーツク海、100～500m、砂泥底
3. *Petrasma japonica* (Dunker) アサヒキヌタレガイ
 - ・ 大槌、舟越、潮間帯～20m、砂泥底
 - ・ 北海道南部・山形以南～九州
4. *Acharax johnsoni* (Dall) スエヒロキヌタレガイ
 - ・ 銚子沖以北～北海道;ベーリング海、北米西岸、100～500m、泥底

クルミガイ目

クルミガイ科

1. *Nucula paulula* A. Adams マメクルミガイ
 - ・ 三陸海岸、大船度湾、潮間帯～150m, 砂泥底
 - ・ 三陸沿岸・能登半島以南～九州
2. *Acila (Acila) divaricata vigilia* Schenck カラフトキララ
 - ・ 久慈沖、三陸沖、160～500m, 砂泥底
 - ・ 銚子沖以北～三陸沿岸、北海道;千島、サハリン
3. *Acila (Truncacila) insignis* (Gould) キララガイ
 - ・ 大槌湾、大船渡湾、広田湾、三陸沿岸一帯、潮間帯～200m, 細砂泥底
 - ・ 五島列島以北～北海道、日本海;朝鮮、沿海州
4. *Ennucula tenuis* (Montagu) コグルミガイ
 - ・ 大槌湾、山田湾、大船渡湾、潮下部～335m, 砂泥底
 - ・ 三陸沿岸・但馬沖以北～日本海、北海道;ベーリング、北米、北太平洋
5. *Ennucula cyrenoides* (Kuroda) シジミナリクルミガイ
 - ・ 三陸沿岸、50～2230m, 細砂底
 - ・ 三陸沿岸以南～九州、但馬沖、対馬、九州西岸
6. *Ennucula mirifica* (Dall) オオクルミガイ
 - ・ 三陸沖、50～600m, 細砂底
 - ・ 相模湾沖以北～北海道;オホーツク

ハトムギソデガイ科

1. *Neilonella tibana* Oyama MS. チバハトムギソデガイ
 - ・ 三陸沖、200～800m, 砂底
 - ・ 銚子沖以北～三陸沖

シワロウバイ科

1. *Nuculana (Nuculana) pernula pernuloides* (Dunker) シワロウバイ
 - ・ 宮古重茂半島沖、20～200m, 細砂泥底
 - ・ 銚子沖・但馬沖以北～北海道;北太平洋、北大西洋
2. *Nuculana (Thestylea) yokoyamai* (Kuroda) アラボリロウバイ
 - ・ 大槌湾、50～450m, 細砂泥底
 - ・ 津軽半島・佐渡島以南～土佐沖、九州西岸
3. *Nuculana (Thestylea) sagamiensis* Okutani サガミアラボリロウバイ
 - ・ 三陸沖、700～1500m, 細砂泥底
 - ・ 北海道南部以南～三陸沖、相模湾、駿河湾
4. *Saccella gordonis* (Yokoyama) ゴルドンソデガイ
 - ・ 三陸北部南半、20～300m, 細砂泥底
 - ・ 三陸沿岸・佐渡島以南～九州;東シナ海
5. *Saccella sematensis* (Suzuki & Ishizuka) アラスジソデガイ
 - ・ 大槌湾、三陸北部南半、20～450m, 細砂泥底
 - ・ 三陸沿岸・男鹿半島以南～九州、日本海西部

ナギナタソデガイ科

1. *Yoldia (Yoldia) amygdalea* (Valenciennes) スモモソデガイ
 - ・ 三陸沿岸、20～30m, 細砂底
 - ・ 三陸沿岸・福井県以北～北海道、日本海、北太平洋、北大西洋
2. *Yoldia (Cnesterium) notabilis* Yokoyama フリソデガイ
 - ・ 大槌湾、気仙郡、5～6m, 内湾の砂底
 - ・ 房総半島・日本海中部以北～東北;オホーツク
3. *Yoldia (Cnesterium) johanni* Dall エゾソデガイ
 - ・ 三陸北部南半、10～100m, 細砂泥底
 - ・ 東北地方・朝鮮北東部以北～日本海、北海道;サハリン、千島、オホーツク
4. *Megayoldia thraciaeformis* (Storer) フネソデガイ
 - ・ 東北沖・但馬沖以北～日本海、北海道、25～550m, 泥底;カムチャツカ、北太平洋、北米西岸、北大西洋

フネガイ目

フネガイ科

1. *Arca avellana* Lamarck フネガイ
 - ・ 三陸沿岸、潮下部～50m
 - ・ 津軽半島・男鹿半島以南～日本各地;インド・西太平洋
2. *Arca boucardi* Jousseaums コベルトフネガイ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～50m, 岩礫や岩の隙間に足糸で付着
 - ・ 北海道以南～沖縄;朝鮮、沿海州南部、中国沿岸

3. *Barbatia (Abarbatia) foliata* (Forsk.) エガイ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯、岩礫や岩礁の隙間に足糸で付着
 - ・ 三陸沿岸・男鹿半島以南～日本各地;インド・太平洋
4. *Barbatia (Savignyarca) virescens* (Reeve) カリガネエガイ
 - ・ 三陸沿岸、潮間帯～20m, 岩礁の割れ目に足糸で付着
 - ・ 北海道南部能登半島以南～日本各地;インド・太平洋、中国
5. *Acar plicatum* (Dillwyn) コシロガイ
 - ・ 三陸南部北半、潮間帯～100m, 岩礫に付着
 - ・ 津軽半島・能登半島以南～日本各地;熱帯インド・太平洋
6. *Scapharca broughtonii* (Schrenck) アカガイ
 - ・ 気仙郡、三陸南部北半、潮下部～10m, 泥底
 - ・ 北海道南部以南～九州;朝鮮、中国北部
7. *Scaapharca satowi* Dunker サトウガイ
 - ・ 三陸南部北半、10～30m, 砂泥底
 - ・ 北海道南部以南～九州
8. *Scaapharca subcrenata* (Lischke) サルボウ
 - ・ 大槌湾、潮間帯～20m, 砂泥底
 - ・ 大槌湾・佐渡島以南～若狭湾、瀬戸内海;西太平洋、中国
9. *Arcopsis symmetrica* (Reeve) ミミエガイ
 - ・ 三陸南部北半、潮間帯～100m, 岩礫の下側に足糸で付着
 - ・ 三陸沿岸南部・佐渡島以南～熱帯インド・太平洋域

シコロエガイ科

1. *Porterius dalli* (Smith) シコロエガイ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～100m, 岩礫に付着
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南～三陸沖、紀伊半島;朝鮮南部

タマキガイ科

1. *Glycymeris (Glycymeris) aspersa* (A. Adams & Reeve) タマキガイ
 - ・ 三陸沿岸一帯、3～30m, 砂底
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南～九州;朝鮮南部
2. *Glycymeris (Glycymeris) imperialis* Kuroda ミタマキガイ
 - ・ 気仙郡、三陸北部南半、5～30m, 砂底
 - ・ 岩手県以南～相模湾、紀伊半島
3. *Glycymeris (Glycymeris) albolineata* (Lischke) ベンケイガイ
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南～九州;朝鮮南部、潮下部～50m, 砂底や砂泥底
4. *Glycymeris (Glycymeris) rotunda* (Dunker) ベニグリ
 - ・ 三陸北部南半、30～300m, 細砂底
 - ・ 津軽海峡・男鹿半島以南～九州;東シナ海
5. *Glycymeris (Glycymeris) yessoensis* (Sowerby) エゾタマキ
 - ・ 三陸北部南半、潮下部～40m, 砂底
 - ・ 房総半島・丹後半島以北～日本海、三陸沿岸、北海道;朝鮮北東岸、沿海州、千島
6. *Tucetilla pilsbryi* (Yokoyama) ビロウドタマキ
 - ・ 三陸北部南半、30～600m, 細砂底
 - ・ 津軽海峡・男鹿半島以南～但馬沖、土佐沖、九州西岸

オオシラスナガイ科

1. *Limopsis tokaiensis* Yokoyama オオシラスナガイ
 - ・ 気仙沖、宮古沖、三陸沿岸、100～800m, 泥底
 - ・ 津軽海峡・男鹿半島以南～九州
2. *Crenulilimopsis oblonga* (A. Adams) ナミジワシラスナガイ
 - ・ 大槌湾、三陸北部南半、10～400m, 砂泥底
 - ・ 津軽海峡・佐渡島以南～九州;東シナ海
3. *Oblimopa japonica* (A. Adams) シラスナガイ
 - ・ 三陸南部北半、10～400m, 砂泥底
 - ・ 三陸沿岸沖・佐渡島以南～本州、四国、日本海、九州西岸;台湾、フィリッピン
4. *Nipponolimopsis decussata* (A. Adams) マメシラスナガイ
 - ・ 大槌湾、40～400m, 砂泥底
 - ・ 三陸沿岸・能登半島以南～九州;東シナ海

イガイ目

イガイ科

1. *Mytilus edulis* Linnaeus ムラサキイガイ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～20m, 岩礁や養殖施設等に足糸で付着

- ・ 日本全国、世界中の温帯域
- 2. *Mytilus coruscus* Gould イガイ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～20m, 岩礁に足糸で付着
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南～日本全国;朝鮮南部、沿海州
- 3. *Crenomytilus grayanus* (Dunker) エゾイガイ
 - ・ 宮古湾、三陸南部北半、潮下部～60m, 岩礁に足糸で付着
 - ・ 宮古湾以北～北海道;朝鮮半島北東岸、沿海州、千島、サハリン、オホーツク
- 4. *Septifer (Mytilisepta) virgatus* (Wegmann) ムラサキインコ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯、岩礁に足糸で付着
 - ・ 北海道南部以南～日本全国;朝鮮、インド・太平洋
- 5. *Septifer (Mytilisepta) keenae* Nomura ヒメイガイ
 - ・ 宮古、広田湾、三陸南部北半、潮間帯、岩礁
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南～九州;朝鮮
- 6. *Modiolus (Modiolus) modiolus difficilis* (Kuroda & Habe) エゾヒバリ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～20m, 岩礁に足糸で付着
 - ・ 東京湾・男鹿半島以北～日本海、東北、北海道;朝鮮東岸、沿海州、サハリン、オホーツク
- 7. *Modiolus (Modiolus) nipponicus* Oyama ヒバリガイ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～100m, 岩礁に足糸で付着
 - ・ 陸奥湾・男鹿半島以南～九州、日本海;朝鮮南部
- 8. *Modiolus (Modiolus) margaritaceus* (Nomura & Hatai) マメヒバリ
 - ・ 三陸北部南半、三陸沿岸、30～450m, 砂貝殻底
 - ・ 北海道南西以南～三陸沿岸、本州、日本海、九州西岸
- 9. *Solamen spectabilis* (A. Adams) キサガイモドキ
 - ・ 三陸沿岸、30～300m, 細砂底
 - ・ 三陸沿岸・佐渡島以南～三重県、紀伊半島沖、土佐沖、日本海、九州
- 10. *Musculus (Musculus) laevigatus* (Gray) ハブタイタマエガイ
 - ・ 久慈沖、10～500m, 泥底
 - ・ 但馬沖・三陸沿岸以北～北海道、オホーツク、ベーリング、アラスカ
- 11. *Musculus (Modiolarca) cupreus* (Gould) タマエガイ
 - ・ 大槌湾、広田湾、潮間帯～100m, カラスボヤ等の被囊中に生息
 - ・ 北海道・佐渡島以南～沖縄;台湾
- 12. *Musculus (Musculista) sentrosia* (Benson) ホトトギス
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～20m, アジモ帯等の泥底に群棲
 - ・ 北海道以南の日本全国;沿海州、東南アジア
- 13. *Vignadula atrata* (Lischke) クログチガイ
 - ・ 宮古湾、三陸南部北半、内湾の潮間帯、岩礫地
 - ・ 本州沿岸以南～九州;朝鮮、台湾、中国南部、東南アジア
- 14. *Lithophaga (Leiosolenus) curtus* (Lischke) イシマテ
 - ・ 三陸沿岸、潮間帯の砂岩や造礁性サンゴ等に穿孔
 - ・ 陸奥湾・男鹿半島以南～沖縄

ハボウキガイ科

1. *Atrina (Serratrina) pectinata* (Linnaeus) タイラギ
 - ・ 気仙越喜来、広田湾、潮間帯～90m, 細砂泥底
 - ・ 岩手県・男鹿半島以南～日本全国;台湾、朝鮮南部、東南アジア、西太平洋

ウグイスガイ目

ウグイスガイ科

1. *Pinctada fucata martensii* (Dunker) アコヤガイ
 - ・ 気仙郡、潮間帯～20m, 岩礁
 - ・ 岩手(気仙郡)・男鹿半島以南～九州

イタヤガイ科

1. *Polynca mussium intuscostatum* (Yokoyama) モトリニシキ
 - ・ 津軽海峡・佐渡島以南～三陸沿岸、日本海、九州、50～400m, 細砂泥底
2. *Polynca mussium alaskense* (Dall) アラスカニシキ
 - ・ 久慈沖、50～560m, 宮古沖 150～450m, 砂泥底
 - ・ 三陸沿岸・但馬沖以北～男鹿半島沖、北海道;千島、北米西岸、男鹿半島、サハリン
3. *Chlamys (Chlamys) islandicus erthrocomatus* (Dall) カミオニシキ
 - ・ 岩手北方沖合、200～500m, 砂底
 - ・ 但馬沖・三陸沿岸以北～北海道;千島、サハリン、オホーツク、ベーリング
4. *Chlamys (Chlamys) chosonica* Kuroda チョウセンニシキ
 - ・ 気仙郡、三陸沿岸、100～200m, 砂泥底
 - ・ 三陸沿岸以北～北海道

5. *Chlamus (Swiftopecten) swifti* (Bernardi) エゾキンチャク
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮下部～275m, 岩礫に足糸で付着
 - ・ 本州東北沿岸以北～北海道、日本海;北朝鮮、沿海州、千島、サハリン、アラスカ
6. *Chlamus (Coralichlamys) irregularis* (Sowerby) ナデシコガイ
 - ・ 三陸北部南半、潮間帯～150m, 岩礫底
 - ・ 三陸沿岸・男鹿半島以南～日本各地;西太平洋
7. *Chlamus (Azumapecten) farreri farreri* (Jones & Preston) アズマニシキ
 - ・ 三陸沿岸一帯、15～60m, 岩礫に足糸で付着
 - ・ 北海道～九州;オホーツク海、沿海州、中国、朝鮮
8. *Delectopecten macrocheiricola* Habe ハリナデシコ
 - ・ 北海道以南～九州;サハリン、東シナ海、50～1350m, 岩礫底
9. *Pecten (Oppenheimopecten) sinensis puncticulatus* Dunker ハナイタヤ
 - ・ 陸前高田広田湾、60～80m, 砂底
 - ・ 北海道西南部以南～九州;朝鮮南部、東シナ海
10. *Pecten (Notovola) albicans albicans* (Schroter) イタヤガイ
 - ・ 三陸沿岸一帯、10～100m, 砂底
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南～九州;朝鮮半島、中国沿岸、東シナ海
11. *Patinopecten (Mizuhopecten) yessoensis* (Jay) ホタテガイ
 - ・ 三陸沿岸一帯、10～50m, 砂礫底
 - ・ 東北沿岸以北～北海道;千島、朝鮮東岸、沿海州

ウミギク科

1. *Spondylus (Spondylus) balbatus cruentus* Lischke チリボタン
 - ・ 気仙沿岸、潮間帯～20m, 岩礁に着生
 - ・ 気仙沿岸南部・男鹿半島以南～九州、沖縄

ミノガイ科

1. *Acesta (Acesta) goliath* (Sowerby) オオハネガイ
 - ・ 大槌、三陸町綾里沖、100～1417m, 砂礫底
 - ・ 紀伊半島・山口県見島以北～日本海、三陸沿岸、北海道南部
2. *Acesta (Plicacesta) smithi* (Sowerby) スミスハネガイ
 - ・ 三陸沿岸、100～700m, 砂泥底
 - ・ 紀伊半島・但馬沖以北～日本海、三陸沿岸、北海道南部
3. *Limaria (Limaria) basilanica* (Adams & Reeve) ユキミノ
 - ・ 三陸南部北半、潮間帯～20m, 砂礫底
 - ・ 三陸沿岸・佐渡島以南～沖縄、インド・太平洋
4. *Linaaria (Limaria) orientalis* (Adams & Reeve) フクレユキミノ
 - ・ 広田湾、5～120m, 細砂底
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南～九州、朝鮮、中国沿岸、東シナ海、西太平洋
5. *Limatula (Limatula) vladivostokensis* (Scarlatto) ヒメユキバネガイ
 - ・ 大槌湾、三陸南部北半、50～350m, 細砂底
 - ・ 紀伊半島・山口県見島以北～日本海、北海道;サハリン、オホーツク海
6. *Limatula (Limatula) japonica* A. Adams ニホンユキバネガイ
 - ・ 大槌湾、20～600m, 細砂底
 - ・ 北海道南部・能登半島以南～日本海、九州西岸、三陸沿岸、土佐沖

ナミマカシワ科

1. *Anomia chinensis* Philippi ナミマカシワ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～80m, 細砂底の礫や岩、他物に付着
 - ・ 北海道南部以南～日本全国;東南アジア
2. *Monia umbonata* (Gould) シマナミマガシワモドキ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～300m, 岩礫、他物に付着
 - ・ 北海道南部以南～日本全国;朝鮮、中国、東シナ海
3. *Monia macroschisma* (Deshayes) ナミマガシワモドキ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～40m, 足糸で岩礁に付着
 - ・ 東北以北～北海道;アリューシャン、ベーリング、カナダ西岸

ベッコウガキ科

1. *Neopycnodonte musashiana* (Yokoyama) ベッコウガキ
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南～九州;東シナ海、20～500m, 岩礫底や他物に付着

イタボガキ科

1. *Crassostrea gigas* (Thunberg) マガキ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯、低塩度地帯の岩礁・岩礫に群棲

- ・ 千島以南～北海道、九州までの日本全国
- 2. *Crassostrea nippona* (Seki) イワガキ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～20m, 岩礁
 - ・ 陸奥湾・津軽半島以南～九州までの日本全国
- 3. *Saccostrea kegaki* Torigoi & Inaba ケガキ
 - ・ 山田湾、潮間帯、岩礁
 - ・ 北海道南西部・津軽半島以南～奄美;インド、西太平洋
- 4. *Ostrea circumpicta* Pilsbry コケゴロモ
 - ・ 陸奥湾以南～九州、隠岐;朝鮮、中国沿岸

マルスダレガイ目

ツキガイ科

1. *Pillucina (Pillucina) pisidum* (Dunker) ウメノハナガイ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～30m, 細砂泥底
 - ・ 北海道南部・津軽半島以南～沖縄;台湾
2. *Wallucina striata* (Tokunaga) チヂミウメ
 - ・ 大槌湾、山田湾、潮間帯～300m, 細砂泥底
 - ・ 三陸沿岸・男鹿半島以南～沖縄;台湾
3. *Lucinoma annulatum* (Reeve) ツキガイモドキ
 - ・ 三陸沿岸一帯、10～750m, 泥底や砂底
 - ・ 北海道南部・津軽半島以南～九州;東シナ海、アラスカ～南カリフォルニア
4. *Lucinoma spectabilis* (Yokoyama) オオツキガイモドキ
 - ・ 大槌湾内外、40～125m, 泥底
 - ・ 三陸沿岸・男鹿半島以南～九州、50～700m
5. *Lucinoma yosidai* Habe ヨシダツキガイモドキ
 - ・ 大槌湾内外、45～137m, 砂泥底
 - ・ 紀伊半島・島根県以北～銚子沖、三陸沿岸、但馬沖、山形県沖
6. *Lucinoma adamsianum* Habe アダムズツキガイモドキ
 - ・ 大槌湾内外、52～137m, 砂泥底
 - ・ 三陸沿岸・日本海見島沖以南～紀伊半島、九州西岸
7. *Anodontia stearnsiana* Oyama イセシラガイ
 - ・ 北海道南部以南～九州、沖縄、潮間帯～20m, 砂底、泥底

ハナシガイ科

1. *Conchocele disjuncta* (Gabb) オウナガイ
 - ・ 宮古沖、100～300m, 泥底
 - ・ 土佐沖・但馬沖以北～北海道;アラスカ～北米西岸、4～1400m
2. *Thyasira (Thyasira) tokunagai* Kuroda & Habe ハナシガイ
 - ・ 大槌湾、大船渡湾、3～120m, 砂泥底
 - ・ 北海道・日本海栗島以南～九州、5～300m
3. *Maorithyas miyadai* (Habe) ウスハナシガイ
 - ・ 大槌湾外、136m 以深、細砂底
 - ・ 三陸沿岸、三重県尾鷲沖・若狭湾～紀伊半島沖、但馬沖、10～140m
4. *Axinopsida subquadrata* (Adams) ユキヤナギ
 - ・ 大槌湾内、大船渡湾、3～26m, 砂泥底
 - ・ 房総半島・日本海見島以北～三陸沿岸、北海道、若狭湾、佐渡島、5～300m

フタバシラガイ科

1. *Cycladicama cuminigii* (Hanley) シオガマ
 - ・ 久慈沖 200 尋、10～175m, 細砂底
 - ・ 三陸沿岸・男鹿半島以南～九州、沖縄;東南アジア
2. *Cycladicama semiasperoides* (Nomura) ヒラシオガマ(マルシオガマ)
 - ・ 三陸沿岸、10～100m, 砂底
 - ・ 北海道南西部以南～三陸沿岸、紀伊半島、九州西岸
3. *Cycladicama lunaris* (Yokoyama) マンゲツシオガマ
 - ・ 山田湾、10～500m、内湾の砂泥底
 - ・ 三陸沿岸・若狭湾以南～紀伊半島、九州西岸
4. *Felaniella usta* (Gould) ウソシジミ
 - ・ 大槌湾、広田湾、三陸南部北半、10～150m, 細砂底
 - ・ 銚子・若狭湾以北～日本海、北海道;オホーツク
5. *Diplodonta gouldi* (Yokoyama) フタバシラガイ
 - ・ 広田湾、気仙郡、三陸北部南半、10～150m, 砂底
 - ・ 北海道南部以南～三陸沿岸、紀伊半島、若狭湾
6. *Diplodonta figulina* (Gould) ハイイロフタバシラガイ

- ・ 東北地方以北～北海道;サハリン、10～30m、砂底
7. *Phlyctiderma japonicum* (Pilsbry) ヤエウメノハナガイ
 - ・ 三陸沿岸、潮間帯～20m、泥岩に穿孔
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南～日本海、九州

キクザルガイ科

1. *Chama japonica* Lamarck キクザルガイ
 - ・ 陸奥湾・津軽半島以南～沖縄;朝鮮、中国、熱帯インド・太平洋、潮間帯～100m、岩礁
2. *Chama fragum* Reeve イチゴザル
 - ・ 三陸沿岸南部、潮間帯～20m、岩礁
 - ・ 三陸沿岸南部・男鹿半島以南～沖縄;熱帯太平洋

チリハギガイ科

1. *Lasaea undulata* (Gould) チリハギガイ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～10m、ムラサキエンコ等の足糸間に付着
 - ・ 北海道西南部・男鹿半島以南～沖縄;朝鮮南岸、ハワイ

コハクノツユ科

1. *Kellia porculus* Pilsbry コハクノツユ
 - ・ 大槌湾、潮間帯～125m、砂礫・貝殻に付着
 - ・ 北海道・本州、四国、九州

ブンブクヤドリ科

1. *Montacutona japonica* (Yokoyama) マルヤドリガイ
 - ・ 大槌湾、5～70m、細砂泥底
 - ・ 三陸沿岸・男鹿半島以南～日本海、紀伊半島、九州
2. *Nipponomysella oblongata* (Yokoyama) マルヘノジガイ
 - ・ 三陸南部北半、潮下部～140m、細砂泥底
 - ・ 陸奥湾・佐渡島以南～日本海、三陸沿岸、紀伊半島、瀬戸内海

タナベガイ科

1. *Curvemysella paula* (A. Adams) ヘノジガイ
 - ・ 陸奥湾・若狭湾以南～九州;インド・太平洋、10～50m、ヤドカリ巻き貝の殻軸

ノミハマグリ科

1. *Turtonia minuta* (Fabricius) ノミハマグリ
 - ・ 東北地方以北～北海道;オホーツク、ベーリング海、北大西洋、潮間帯の海藻上

トマヤガイ科

1. *Cardita leana* Dunker トマヤガイ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯の岩礫に足糸で付着
 - ・ 陸奥湾・津軽半島以南～日本全国;朝鮮半島、台湾
2. *Cardita nodulosa* Lamarck モモイロトマヤ
 - ・ 大槌湾、三陸北部南半、5～450m、砂礫底
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南～本州、四国、日本海、九州西岸;熱帯太平洋
3. *Cyclocardia paucicostata* (Krause) アラスジマルフミガイ
 - ・ 東北地方以北～北海道;ベーリング海、10～50m、砂泥底
4. *Cyclocardia crebricostata* (Krause) オオマルフミガイ
 - ・ 陸前沖・但馬沖以北～日本海、北海道、10～200m、砂泥底;ベーリング、アラスカ、北米西岸
5. *Cyclocardia ferruginea* (Clessin) クロマルフミガイ
 - ・ 大槌湾、三陸北部南半、
 - ・ 九州、四国、本州、北海道南部、35～400m、砂底
6. *Cyclocardia erimoensis* (Tiba) クマアサリ
 - ・ 大槌沖、久慈沖、100～250m、砂泥底
 - ・ 北海道南部以南～東北三陸沿岸沖

ケシザルガイ科

1. *Carditella (Carditellona) hanzawai* (Nomura) ケシザルガイ
 - ・ 三陸沿岸一帯、10～150m、砂底
 - ・ 三陸沿岸・男鹿半島以南～紀伊半島、四国、日本海、九州西岸;東シナ海
2. *Carditellopsis toneana* (Yokoyama) ケシフミガイ
 - ・ 三陸沿岸、20～150m、細砂底
 - ・ 三陸沿岸・佐渡島以南～房総半島、日本海、九州

エゾシラオガイ科

1. *Astrte hakodatensis* Yokoyama ハコダテシラオガイ
 - ・ 相模湾・佐渡島以北～東北、北海道、50～150m, 砂泥
2. *Tridonta (Tridonta) borealis* Schmacher エゾシラオガイ
 - ・ 綾里沖、三陸沖、10～230m, 細砂泥底
 - ・ 三陸沖・但馬沖以北～日本海、北海道;サハリン、千島、カムチャツカ、アラスカ
3. *Tridonta (Tridonta) bennettii* (Dall) コエゾシラオガイ
 - ・ 久慈沖、200～250 尋、
 - ・ 紀伊半島・但馬沖以北～日本海、東北、北海道;アラスカ、ベーリング
4. *Tridonta (Tridonta) alaskensis* (Dall) アラスカシラオガイ
 - ・ 岩手北方沖、250 尋、宮古沖、200～400m
 - ・ 隠岐島・岩手北部沖以北～日本海、北海道;ベーリング海、100～500m, 細砂泥底

ザルガイ科

1. *Keenaeca samarangae* (Makiyama) シマキンギョ
 - ・ 大槌湾、64～102m, 砂礫底
 - ・ 三陸沿岸・男鹿半島以南～紀伊半島、土佐沖、日本海、九州西岸;東シナ海
2. *Clinocardium (Clinocardium) nuttallii* (Conrad) オオイシカゲガイ
 - ・ 三陸北部南半、10～50m, 砂泥底
 - ・ 三陸沿岸以北～北海道;アラスカ、ベーリング海、北米北西岸
3. *Clinocardium (Keenocardium) californiense* (Desheaves) エゾイシカゲガイ
 - ・ 三陸沿岸一帯、10～200m, 砂泥底
 - ・ 銚子沖以北～三陸沿岸、北海道、日本海;オホーツク海
4. *Clinocardium (Keenocardium) buellowi* (Rolle) イシカゲガイ
 - ・ 三陸北部南半、大槌湾、広田湾、3～30m, 砂泥底
 - ・ 九州北部以北～三陸沿岸、北海道、10～200m
5. *Clinocardium (Ciliocardium) ciliatum* (Fabricius) コケライシカゲガイ
 - ・ 久慈沖、206～207m, 大槌湾、150～200m, 砂泥底
 - ・ 東北地方以北～北海道、日本海;サハリン、千島、北極海、10～200m, 泥底
6. *Serripes groenlandicus* (Bruguere) ウバトリガイ
 - ・ 久慈沖、200 尋、砂泥底
 - ・ 三陸沿岸・但馬沖以北～日本海、北海道;北太平洋、北大西洋、10～260m
7. *Fulvia mutica* (Reeve) トリガイ
 - ・ 三陸沿岸一帯、3～60m, 砂泥底
 - ・ 陸奥湾、男鹿半島以南～三陸沿岸、日本海、九州;朝鮮半島、東シナ海
8. *Fulvia hungerfordi* (Sowerby) チゴトリガイ
 - ・ 大船渡湾、潮下部～30m, 泥底
 - ・ 三陸沿岸・男鹿半島以南～四国、日本海、九州西岸;中国沿岸

バカガイ科

1. *Maetra (Maetra) chinensis* Philippi バカガイ(エゾバカガイ)
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～20m, 砂泥底
 - ・ オホーツク海・サハリン以南～北海道、九州までの日本全国
2. *Maetra (Maetra) veneriformis* Reeve シオフキ
 - ・ 宮古湾、山田湾、広田湾、潮間帯～20m, 砂泥底
 - ・ 三陸沿岸・山形県以南～九州;沿海州南部、朝鮮、中国
3. *Maetra (Telemactra) crosseii* (Dunker) ヒメバカガイ
 - ・ 三陸沿岸、大槌湾、広田湾、潮下部～10m
 - ・ 東北地方以南～九州、潮下部～20m, 砂底
4. *Pseudocardium sachlinensis* (Schrenck) ウバガイ
 - ・ 三陸沿岸、潮間帯～30m, 細砂底
 - ・ 銚子・山形県以北～三陸沿岸、日本海北部、北海道;千島、オホーツク海
5. *Spisula (Mactromeris) polynympha* Stimpson ナガウバガイ
 - ・ 三陸沿岸、潮間帯～200m, 細砂泥底
 - ・ 銚子沖・若狭湾以北～日本海、北海道;ベーリング海、北米東岸
6. *Tresus keenae* (Kuroda & Habe) ミルクイ
 - ・ 三陸沿岸、潮下部～20m, 礫泥底
 - ・ サハリン・北海道以南～九州、日本海;沿海州、朝鮮半島
7. *Raetellops pulchella* (Adams & Reeve) チヨノハナガイ
 - ・ 大槌湾、大船渡湾、広田湾、3～100m, 砂泥底
 - ・ 北海道以南～九州までの日本各地;朝鮮、中国沿岸、東南アジア

チドリマスホウ科

1. *Coecella chinensis* Deshayes クチバガイ
 - ・ 宮古湾、三陸南部北半、潮間帯の砂礫底
 - ・ 北海道南部～三陸沿岸、九州;朝鮮、中国、フィリッピン

フジノハナガイ科

1. *Tentidonax kiusiuensis* (Pilsbry) キュウシュウナミノコ
 - ・ 三陸南部北半、潮間帯～10m, 砂底
 - ・ 北海道西南部・男鹿半島以南～日本全国;台湾、中国

ニッコウガイ科

1. *Pharaonella sieboldii* (Deshayes) ベニガイ
 - ・ 陸前高田大野湾、潮間帯～20m, 細砂底
 - ・ 津軽半島・下北半島以南～九州、種子島
2. *Angulus vestaliodes* (Yokoyama) クモリザクラ
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南～九州;台湾、東南アジア、10～300m, 砂泥底
3. *Megangulus venulosus* (Schrenck) サラガイ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～120m, 砂底
 - ・ 鹿島灘・若狭湾以北～日本海、三陸沿岸、北海道;朝鮮半島、沿海州、オホーツク海
4. *Megangulus zyonoensis* (Hatai & Nisiyama) アラスジサラガイ
 - ・ 銚子・北陸沿岸以北～日本海、北海道;朝鮮東岸、沿海州、10～60m, 細砂底
5. *Merisca (Pistris) subtruncata* (Hanley) ユウヒザクラ
 - ・ 陸奥湾・津軽半島以南～日本海、九州;西太平洋域、10～300m, 砂泥底
6. *Cadella lubrica* (Gould) トバザクラ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮下部～300m, 砂底
 - ・ 鹿島灘・若狭湾以北～北海道;千島、オホーツク海
7. *Moerella jedoensis* (Lischke) モモノハナ
 - ・ 大槌湾、広田湾、潮間帯～50m, 砂泥底
 - ・ 本州東北沿岸以南～九州までの日本各地;朝鮮、中国沿岸
8. *Moerella rutila* (Dunker) ユウシオガイ
 - ・ 大槌湾、潮間帯～20m, 砂底
 - ・ 陸奥湾・津軽半島以南の日本各地：朝鮮半島、中国沿岸
9. *Nitidotellina nitidula* (Dunker) サクラガイ
 - ・ 三陸北部南半、潮間帯～80m, 砂泥底
 - ・ 北海道南部・津軽半島以南～九州;朝鮮半島、中国、インドネシア
10. *Nitidotellina minuta* (Lischke) ウズザクラ
 - ・ 大槌湾、潮間帯～50m, 砂泥底
 - ・ 北海道南部以南男鹿半島以南～三陸沖、日本海、九州;朝鮮南部、中国沿岸
11. *Nitidotellina iridella* (Martens) カバザクラ
 - ・ 三陸南部北半、潮下部～30m, 細砂泥底
 - ・ 三陸沿岸・男鹿半島以南の日本全国;台湾
12. *Nitidotellina pallidula* (Lischke) ハツザクラ
 - ・ 三陸南部北半、10～80m, 細砂底
 - ・ 陸奥湾・男鹿半島以南～九州、日本海;中国、東南アジア
13. *Heteromacoma irus* (Hanley) シラトリモドキ
 - ・ 三陸沿岸、潮間帯の小石まじりの砂底
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南～九州、日本海;朝鮮、中国沿岸
14. *Macoma (Macoma) calcarea* (Gmelin) ケショウシラトリ
 - ・ 宮古湾、陸中海岸、潮間帯付近、細砂泥底
 - ・ 四国沖・能登半島以北～三陸沿岸、日本海;千島、ベーリング海
15. *Macoma (Macoma) praetexta* (Martens) オオモノハナ
 - ・ 三陸沿岸、潮間帯～50m, 細砂底
 - ・ 三陸沿岸・男鹿半島以南～九州、日本海
16. *Macoma (Macoma) tokyoensis* Makiyama ゴイサギガイ
 - ・ 三陸沿岸、潮間帯～100m, 泥底
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南～九州までの日本各地
17. *Macoma (Macoma) incongrua* (Martens) ヒメシラトリ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～50m, 泥底
 - ・ 九州地方以北～日本海、北海道までの日本各地、朝鮮、中国、アラスカ、カナダ
18. *Macoma (Macoma) contabulata* (Deshayes) サビシラトリガイ
 - ・ 宮古湾、山田湾、潮下部上位、砂泥底
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南～三陸沿岸、日本海、九州;朝鮮、山東半島
19. *Macoma (Macoma) nipponica* (Tokunaga) ニッポンシラトリ
 - ・ 三陸沿岸、20～100m, 砂泥底

- ・ 北海道南部・男鹿半島以南～三陸沿岸、日本海、九州
20. *Macoma (Macoma) moesta* (Deshayes) ソトオリシラトリ
- ・ 大槌湾、潮間帯～10m, 砂底
 - ・ 本州東北沿岸以北～北海道; オホーツク海、ベーリング海、アラスカ、潮下部、砂泥底
21. *Rexithaerus sector* Oyama サギガイ
- ・ 三陸南部北半、広田湾、10～30m, 泥底
 - ・ サハリン・北海道・男鹿半島以南から三陸沿岸、日本海、九州; 朝鮮、台湾、中国

アサジガイ科

1. *Theora fragilis* A. Adams シズクガイ
- ・ 大槌湾、山田湾、大船渡湾、三陸南部北半、3～35m, 砂泥底
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南～三陸沿岸、土佐、日本海、九州西岸、潮間帯～90m
2. *Abrina kinositai* Kuroda & Habe キノシタシロバトガイ
- ・ 大槌湾、40～150m, 砂泥底
 - ・ 鹿島灘、駿河湾、土佐沖、九州; 佐渡島、若狭湾、九州西岸、東シナ海

シオサザナミ科

1. *Gari anomala* (Deshayes) ウスベニマスホウ
- ・ 大槌湾、50～80m, 砂泥底
 - ・ 三陸沿岸・能登半島以西～九州; 東南アジア、北オーストラリア、20～170m
2. *Psammobia weinkauffi* Crosse アサヒガイ(鳥羽 in 千葉 1938)
- ・ 岩手県高田松原
3. *Gobraeus kazusensis* (Yokoyama) エゾマスホウ
- ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯下～80m, 砂底
 - ・ 三陸沿岸以北～北海道; 千島、オホーツク海、朝鮮、沿海州、潮間帯、砂礫泥底
4. *Hiatula diphos* (Linnaeus) ムラサキガイ
- ・ 宮古湾、潮間帯～30m, 泥底
 - ・ 三陸沿岸・但馬沖以南～九州; 台湾、中国南岸、インド・西太平洋
5. *Hiatula boeddinghausi* (Lischke) フジナミガイ
- ・ 宮古湾、三陸南部北半、潮間帯～50m, 細砂底
 - ・ 三陸沿岸・男鹿半島以南～本州、九州
6. *Nuttallia japonica* (Reeve) イソシジミ
- ・ 山田湾、広田湾、潮間帯～10m, 砂泥底
 - ・ 北海道南部・津軽半島以南～九州; サハリン、千島、朝鮮半島、中国
7. *Nuttallia obscura* (Reeve) ワスレイソシジミ
- ・ 大槌湾、片岸の浜、根浜、河口中央の砂底
 - ・ 三陸沿岸、紀伊半島、四国、瀬戸内海、九州、潮間帯～10m, 砂泥底
8. *Nuttallia ezonis* Kuroda & Habe エゾイソシジミ
- ・ 宮古湾、大槌湾、山田湾、広田湾、潮間帯の砂泥底
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南～三陸沿岸、日本海; サハリン、沿海州、朝鮮東岸

キヌタアゲマキ科

1. *Solecurtus divaricatus* (Lischke) キヌタアゲマキ
- ・ 山田湾、広田湾、潮下部～135m, 細砂泥底
 - ・ 三陸沿岸・男鹿半島以南～本州、日本海、九州、黄海、東シナ海、中国、西太平洋
2. *Azorinus abbreviatus* (Gould) ズングリアゲマキ
- ・ 大槌湾、40～80m, 砂泥底
 - ・ 三陸沿岸・男鹿半島以南～九州、東シナ海、朝鮮半島、中国南半、インド・太平洋

マテガイ科

1. *Solen (Solen) strictus* Gould マテガイ
- ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯の砂底
 - ・ 北海道南部・津軽半島以南～九州、朝鮮、中国沿岸
2. *Solen (Ensisolen) krusenstermi* Schrenck エゾマテ
- ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～30m 砂底・砂泥底
 - ・ 九州北岸以北～本州、北海道、日本海; 朝鮮、沿海州、サハリン、5～30m

ユキノアシタガイ科

1. *Siliqua costata* Say オオミゾガイ
- ・ 大槌湾、三陸北部南半、潮間帯～20m, 砂底
 - ・ 三陸沿岸以北～北海道、千島、オホーツク、アラスカ

ケシハマグリ科

1. *Ahvenius ojaranus* (Yokoyama) ケシトリガイ
- ・ 大槌湾、大船渡湾、潮下部～150m, 砂泥底

- ・ 三陸沿岸・佐渡島以南～九州

フナガタガイ科

1. *Trapezium (Neotrapezium) liratum* (Reeve) ウネナシトマヤガイ
 - ・ 三陸沿岸、汽水域の潮間帯、岩礫に足糸で付着
 - ・ 津軽・下北半島以南～日本海、台湾、中国南岸、インド・太平洋

マルスダレガイ科

1. *Veremolpa micra* (Pilsbry) ヒメカノコアサリ
 - ・ 大船渡湾、潮間帯～20m, 砂泥底
 - ・ 三陸沿岸・男鹿半島以南～沖縄、熱帯太平洋
2. *Mercenaria stimpsoni* (Gould) ビノスガイ
 - ・ 三陸沿岸一帯、3～20m, 砂底
 - ・ 房総半島以北～北海道;オホーツク海、潮下部～150m
3. *Callithaca adamsi* (Reeve) エゾヌノメアサリ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮下部～50m, 砂泥底
 - ・ 鹿島灘・若狭湾以北～北海道、日本海;サハリン、潮下部～160m、細砂底
4. *Prtothaca (Notochione) jedoensis* (Lischke) オニアサリ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～20m, 砂礫・砂底
 - ・ 北海道南部・津軽半島以南～九州;朝鮮半島、中国
5. *Protothaca (Novathaca) euglypta* (Sowerby) ヌノメアサリ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～砂泥底
 - ・ 駿河湾・能登半島以北～三陸沿岸、北海道;サハリン、沿海州
6. *Protothaca (Novathaca) schencki* (Nomura) メオニアサリ
 - ・ 山田湾、潮間帯、砂や泥岩などの穴のなか
 - ・ 東北沿岸以南～九州
7. *Microcirce dilecta* (Gould) ミジンシラオガイ
 - ・ 大船渡湾、三陸南部北半、10～300m, 砂泥底
 - ・ 北海道南部・佐波島以南～本州、九州;東シナ海
8. *Pitar (Pitarina) affine* (Gmelin) ムラクモハマグリ
 - ・ 三陸北部南半、大槌湾、75～107m, 粗砂底
 - ・ 三陸沿岸・男鹿半島以南～本州、日本海、沖縄、30～100m, 砂礫底
9. *Costellipitar chordatum* (Romer) チヂミマメハマグリ
 - ・ 岩手県、10～100m, 砂
 - ・ 三陸沿岸・佐渡島以南～紀伊、日本海、九州
10. *Dosimorbis (Phacosoma) japonicus* (Reeve) カガミガイ
 - ・ 三陸沿岸一帯、3～60m, 細砂底
 - ・ 北海道南部・津軽半島以南～九州;朝鮮半島、中国沿岸
11. *Dosinia (Phacosoma) troscheli* (Lischke) マルヒナガイ
 - ・ 大槌湾、広田湾沖、10～160m, 砂底
 - ・ 北海道南部・津軽半島以南～九州;朝鮮、中国沿岸
12. *Dosinella corrugata* (Reeve) ウラカガミ
 - ・ 陸奥湾・男鹿半島以南～日本海、九州;朝鮮、中国、潮下部～10m, 砂泥底
13. *Dosinella orbiculata* (Dunker) オトヒメカガミ
 - ・ 大槌湾、83m, 砂泥底
 - ・ 相模湾・若狭湾以南～日本海、九州;東シナ海、10～161m, 細砂底
14. *Ruditapes philippinarum* (Adams & Reeve) アサリ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～20m, 砂礫・泥底
 - ・ サハリン以南の日本全国、台湾、朝鮮、中国沿岸、ハワイ、アメリカ西岸
15. *Ruditapes variegatus* (Sowerby) ヒメアサリ
 - ・ 大槌湾、潮間帯～砂礫泥底
 - ・ 本州沿岸以南～日本全国、インド・太平洋
16. *Paphia (Paphia) euglypta* (Philippi) スダレガイ
 - ・ 大槌湾、広田湾、10～40m, 砂泥底
 - ・ 北海道南西部以南～九州迄の日本全国;朝鮮、中国
17. *Paphia (Paphia) vermicosa* (Gould) アケガイ
 - ・ 広田湾、潮間帯～50m, 細砂底
 - ・ 北海道南部以南～九州までの日本全国、中国沿岸
18. *Paphia (Neotapes) undulata* (Born) イヨスダレ
 - ・ 宮古湾、大船渡湾、潮下部～20m, 泥底
 - ・ 三陸沿岸・男鹿半島以南～九州、朝鮮、中国沿岸、インド・西太平洋
19. *Gomphina (Gomphina) neastartoides* (Yokoyama) キタノフキアゲアサリ
 - ・ 三陸南部北半、潮下部の砂底
 - ・ 三陸沿岸、能登半島以南～日本海、九州、沖縄
20. *Gomphina (Macridiscus) melanaegis* Romer コタマガイ
 - ・ 三陸沿岸一帯、3～60m, 砂底

- ・ 北海道南部以南～九州;朝鮮、中国沿岸、東南アジア
- 21. *Liocyma fluctuosum* (Gould) エゾハマグリ
 - ・ 三陸沿岸、潮下部～1400m, 砂泥底
 - ・ 本州東北・見島近海以北～日本海、北海道;オホーツク海、アラスカ、カナダ
- 22. *Liocyma beckii* Dall ハイイロエゾハマグリ(コガタエゾハマグリ)
 - ・ 大槌沖、206～207m, 砂泥底
 - ・ 房総半島以北～青森、北海道、オホーツク海、アラスカ、200～400m
- 23. *Irus (Irus) mitis* (Deshayes) マツカゼガイ
 - ・ 三陸南部北半、潮間帯の砂泥岩に穿孔生活
 - ・ 陸奥湾・津軽半島以南～九州の日本全国;中国南部、台湾、熱帯太平洋域
- 24. *Irus (Irus) macrophyllus* (Deshayes) ハネマツカゼ
 - ・ 三陸南部北半、潮間帯の泥岩に穿孔
 - ・ 三陸沿岸・佐渡島以南～日本海、九州;熱帯太平洋
- 25. *Callista (Callista) chinensis* (Holten) マツヤマワスレ
 - ・ 宮古湾、山田湾、三陸南部北半、潮間帯～150m, 砂底
 - ・ 三陸沿岸、男鹿半島以南の日本全国;台湾、朝鮮、中国沿岸
- 26. *Callista (Ezocallista) brevisiphonata* Carpenter エゾワスレ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮下部～85m, 砂泥底
 - ・ 本州東北以北～北海道;南千島、サハリン、沿海州
- 27. *Saxidomus purpurata* (Sowerby) ウチムラサキ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～40m, 礫泥砂泥底
 - ・ 北海道南部以南～九州の日本全国;朝鮮、中国沿岸
- 28. *Meretrix lusoria* (Roding) ハマガリ
 - ・ 北海道南部、男鹿半島以南～九州;朝鮮、中国、潮間帯～20m, 砂泥底
- 29. *Cyclina sinensis* (Gmelin) オキシジミ
 - ・ 三陸沿岸、潮間帯～20m, 砂泥底
 - ・ 三陸沿岸・男鹿半島以南～日本全国;台湾、朝鮮、中国、東南アジア
- 30. *Clementia (Clementia) vatheleti* Mabilie フスマガイ
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南～日本海、九州;朝鮮、東南アジア、潮間帯～140m, 砂泥

イワホリガイ科

1. *Petricola dibergens* (Gmelin) イワホリガイ
 - ・ 三陸南部北半、潮間帯～10m, 泥岩等に穿孔(三陸産はチヂミイワホリでないか?)
 - ・ 紀伊半島・若狭湾以南～沖縄、インド・太平洋
2. *Claudiiconcha japonica* (Dunker) セミアサリ
 - ・ 山田湾、広田湾、潮間帯～10m, 泥岩等に穿孔
 - ・ 三陸沿岸・能登半島以南～九州;インド・太平洋
3. *Pseudouris mirabilis* (Deshayes) チヂミイワホリガイ
 - ・ 三陸北部南半、潮間帯～20m, 泥岩に穿孔
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南～日本海、九州

オオノガイ目

オオノガイ科

1. *Mya (Mya) truncata* Linnaeus エゾオオノガイ
 - ・ 大槌湾、45～83m, 砂底
 - ・ 三陸沿岸北部～北海道;千島、オホーツク海、北極海、1～10m, 泥底
2. *Mya (Arenomya) arenaria oonogai* Makiyama オオノガイ
 - ・ 三陸沿岸一帯、潮間帯～10m, 砂泥底
 - ・ 九州中部以北～本州、北海道;朝鮮、中国
3. *Mya (Arenomya) japonica* Jay キタノオオノガイ
 - ・ 東北地方以北～北海道、サハリン、潮間帯～10m, 砂泥底
4. *Cryptomya busoensis* Yokoyama ヒメマスハウ
 - ・ 宮古湾、大槌湾、大船渡湾、10～75m, 砂泥底
 - ・ 北海道・男鹿半島以南～九州

クチベニガイ科

1. *Anisocorbula venusta* (Gould) クチベニデ
 - ・ 三陸沿岸一帯、18～149m, 砂礫・砂底
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南～九州;黄海、西太平洋

キヌマトイガイ科

1. *Hiatella orientalis* (Yokoyama) キヌマトイガイ
 - ・ 宮古湾、大槌湾、広田湾、潮間帯～20m, 海藻の根、養殖カキ、岩等に付着
 - ・ 北海道・男鹿半島以南～九州、沖縄;台湾、朝鮮、中国

2. *Panomya niponica* Nomura & Hatai シリキレチシマガイ
 - ・ 三陸南部北半, 50~100m, 泥底
 - ・ 三陸沿岸・日本海以北~北海道
3. *Panomya japonica* A. Adams ナミガイ
 - ・ 三陸沿岸一帯, 3~60m, 砂底
 - ・ 九州中部以北~本州, 日本海, 北海道; 沿海州, サハリン, 南千島, オホーツク海

ニオガイ科

1. *Barnea (Anchomasa) manilensis* (Philippi) ニオガイ
 - ・ 三陸沿岸, 潮間帯~20m, 泥岩に穿孔
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南~沖縄; 台湾, フィリッピン, 西太平洋
2. *Zirfaea subconstricta* (Yokoyama) ニオガイモドキ
 - ・ 北海道・男鹿半島以南~九州; 台湾, 東南アジア, 潮間帯の泥岩に穿孔
3. *Penitella kamakurensis* (Yokoyama) カモメガイ
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南~九州; 潮間帯の砂泥岩, 貝殻等に付着
4. *Penitella chishimana* (Habe) チシマカモメガイ
 - ・ 東北地方以北~北海道; 千島, 潮間帯の泥岩に穿孔
5. *Penitella extincta* Kuroda MS. オニカゴメガイ
 - ・ 銚子以北~東北地方
6. *Nettastomella japonica* (Yokoyama) ヨコヤマズガイ
 - ・ 北海道以南から九州の日本全国, 潮下部~300m, 泥岩に穿孔

キクイガイ科

1. *Neoxylophaga rikuzenica* (Iw. Taki & Habe) キクイガイ
 - ・ 岩手県陸前沖, 100 尋, 沈木に穿孔
 - ・ 三陸沖・但馬沖以南~日本海, 相模湾, 和歌山県沖, 200~1400m

フナクイムシ科

1. *Teredo navalis* Linnaeus フナクイムシ
 - ・ シベリア以南~日本全国; 世界の温帯海域, 海中の貯木, 木造船等
2. *Lyrodus pedicellatus* (Quatrefagus) ヤツフナクイムシ
 - ・ 北海道以南の日本全国; 台湾, 世界の温熱帯海域, 木材に穿孔

ウミタケモドキ目

ウミタケモドキ科

1. *Pholadomya pacifica* Dall ウミタケモドキ
 - ・ 北海道南部・津軽半島以南~日本海, 九州, 東シナ海, 50~200m, 砂泥底

サザナミガイ科

1. *Lyonsia ventricosa* Gould サザナミガイ
 - ・ 大槌湾, 広田湾, 5~50m, 砂底
 - ・ 北海道南部・佐渡島以南~九州; 沿海州
2. *Lyonsia kawamurai* Habe カワムラサザナミガイ
 - ・ 大槌湾, 52~150m, 砂底
 - ・ 三陸沿岸・若狭湾以南~九州, 10~200m
3. *Agriodesma navicula* (A. Adams & Reeve) オビクイ
 - ・ 三陸沿岸一帯, 潮間帯~83m 位迄, 海藻の板の間
 - ・ 北海道・男鹿半島以南~九州; 東南アジア

ネリガイ科

1. *Pandorella wardiana* (A. Adams) ヒラネリガイ
 - ・ 宮古湾沖, 10~300m, 砂泥底
 - ・ 駿河湾・但馬沖以北~三陸沿岸, 日本海, 北海道; オホーツク海
2. *Pandorella pseudobilirata* (Nomura & Hatai) ウスネリガイ
 - ・ 大槌湾, 45~207m, 砂底
 - ・ 三陸沿岸・山形県沖以南~九; 東シナ海

ミツカドカタビラ科

1. *Myodora fluctuosa* Gould ミツカドカタビラ
 - ・ 三陸沿岸一帯, 10~800m, 砂底
 - ・ 三陸沿岸・佐渡島以南~九州; 朝鮮, 東シナ海
2. *Myodora reeveana* (Smith) コカタビラ
 - ・ 三陸南部北半, 5~300m, 砂底
 - ・ 三陸沿岸・佐渡島以南~九州; 朝鮮, 中国沿岸

オキナガイ科

1. *Laternula (Laternula) anatina* (Linnaeus) オキナガイ
 - ・ 宮古湾、潮間帯～60m, 砂泥底
 - ・ 本州以南～九州; インド・太平洋
2. *Laternula (Exolaternula) marilina* (Reeve) ソトオリガイ
 - ・ 宮古湾、山田湾、潮間帯～20m, 砂泥底
 - ・ オホーツク海・サハリン以南～北海道から九州; 朝鮮、中国、インド・太平洋

スエモノガイ科

1. *Thracia kakumana* Yokoyama スエモノガイ
 - ・ 三陸沿岸, 4～300m, 砂泥底
 - ・ 三陸沿岸・佐渡島以北～日本海、北海道、沿海州、サハリン、オホーツク海
2. *Thracia itoi* Habe フクレスエモノガイ
 - ・ 三陸沿岸, 10～50m 砂泥底
 - ・ 三陸沿岸以北～陸奥湾、沿海州
3. *Trigonothracia pusilla* (Gould) ノムラスエモノガイ
 - ・ 大槌湾, 10～85m, 砂底、砂礫底
 - ・ 北海道南部以南～九州、各地の内湾 10～40m, 砂泥底
4. *Asthenothaerus sematana* (Yokoyama) セマタコスエモノガイ
 - ・ 大槌湾, 3～30m, 泥底
 - ・ 三陸沿岸・男鹿半島以南～九州

オトヒメゴコロガイ科

1. *Halocardia nipponensis* Okutani ニッポンオトヒメゴコロガイ
 - ・ 釜石沖, 600m, 泥底
 - ・ 三陸沿岸沖以南～銚子沖、相模湾, 400～1500m

スナメガイ科

1. *Poromya flexuosa* Yokoyama スナメガイ
 - ・ 大槌湾, 48～207m, 砂底
 - ・ 北海道南部・佐渡島沖以南～九州, 30～350m
2. *Poromya hayashii* Habe ヨコナガスナメガイ
 - ・ 大槌湾, 48～120m, 砂底・砂泥
 - ・ 三陸沿岸(大槌湾)、遠州灘以西、紀伊半島、土佐沖、九州西岸, 50～200m
3. *Cetoconcha japonica* Habe ダイオウスナメガイ
 - ・ 三陸沖, 200～650m, 細砂底
 - ・ 北海道南部以南～三陸沖、紀伊、土佐沖

シヤクシガイ科

1. *Cuspidaria (Cuspidaria) hindsiana* (A. Adams) ツギノシヤクシガイ
 - ・ 大槌湾, 90～95m, 砂底
 - ・ 三陸沿岸(大槌湾)、能登半島以南～九州, 50～200m, 砂泥底
2. *Cardiomya (Cardiomya) gouldiana* (Hinds) ヒメシヤクシガイ
 - ・ 山田湾, 10～400m, 砂泥底
 - ・ 三陸沿岸・佐渡島以南～九州; 東南アジア
3. *Cardiomya (Cardiomya) sagamiana* Okutani & Sakurai サガミヒメシヤクシ(トサヒメシヤクシ)
 - ・ 陸中海岸、大槌湾, 45～120m, 砂泥底
 - ・ 三陸沿岸以南～九州, 10～100m
4. *Cardiomya (Cardiomya) behringensis* Leach テングジャクシ
 - ・ 三陸沖, 40～2900m, 砂泥底
 - ・ 相模湾・但馬沖以北～三陸沖、日本海、北海道; 千島、ベーリング海
5. *Cardiomya (Cardiomya) kashimana* Okutani アラヒメシヤクシ
 - ・ 鹿島灘以北～東北、北海道, 100～200m, 砂泥底
6. *Plectodon ligulus* (Yokoyama) ヒナノシヤクシガイ
 - ・ 陸中海岸、大槌湾, 83～120m, 砂泥底
 - ・ 三陸沿岸・佐渡島以南～日本海、四国、九州西岸, 10～300m

堀足綱
ツノガイ目

ツノガイ科

1. *Dentalium (Paadentalium) octangulatum* Donovan ヤカドツノガイ
 - ・ 広田湾、潮下部～100m, 細砂泥底
 - ・ 北海道南部・佐渡島以南～九州迄の日本全国
2. *Fissidentalium (Fissidentalium) horikoshii* Okutani シンカイフトツノガイ
 - ・ 三陸沖, 2230～3020m

- ・ 本州北東部三陸沖
- 3. *Antalis weinkauffi* (Dunker) ツノガイ
 - ・ 三陸沿岸一帯、15～550m, 砂泥底
 - ・ 津軽・下北半島以南～三陸沿岸、日本海、四国、九州;東シナ海
- 4. *Striodentalium rhabdotum* (Pilsbry) ムチツノガイ
 - ・ 大槌湾沖、95～152m, 砂泥底
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南～日本海、三陸沿岸、九州;東シナ海
- 5. *Graptacme buccinula* (Gould) ヒメナガツノガイ
 - ・ 三陸南部北半、潮間帯～100m, 砂底
 - ・ 三陸沿岸・佐渡島以南～日本海、九州、沖縄;中国

ロウソクツノガイ科

1. *Episiphon makiyamai* (Kuroda & Kikuchi) ロウソクツノガイ
 - ・ 大槌湾、大船渡湾、25～114m, 砂底
 - ・ 陸奥湾・佐渡島以南～日本海、九州、沖縄;インドネシア、5～300m, 砂泥底
2. *Episiphon candellatum* (Kira) ワロウソクツノガイ
 - ・ 三陸南岸、100～200m, 砂泥底
 - ・ 三陸南部以南～相模湾、駿河湾、紀伊、土佐沖

シラサヤツノガイ科

1. *Gadilina insoluta* (Smith) シラサヤツノガイ
 - ・ 三陸南部北半、200～1134m, 泥底
 - ・ 三陸南部・富山湾以南～九州;インドネシア、西太平洋
2. *Compressidens kikuchi* (Kuroda & Habe) ヒナノツノガイ
 - ・ 三陸沿岸、100～500m, 泥底
 - ・ 日本海但馬沖・三陸沿岸沖以北～富山湾、北海道;千島、サハリン

ハリツノガイ科

1. *Omniglypta cerina* (Pilsbry) ハリツノガイ
 - ・ 大槌湾、大船渡湾、45～87m, 砂底、砂泥底、泥底
 - ・ 北海南西以南～駿河湾、四国、九州西岸;インドネシア

クチキレツノガイ目

クチキレツノガイ科

1. *Entalinopsis intercostata* (Boissevain) ユキツノガイ
 - ・ 大槌湾
 - ・ 津軽海峡・日本海九六島以南～日本海、四国、九州;インドネシア、40～835m, 細砂底
2. *Siphonodentalium japonicum* Habe ニッポンクチキレツノガイ
 - ・ 岩手北部、30～300m, 砂底
 - ・ 岩手県北部以南～本州、四国、九州西岸
3. *Siphonodentalium isaotakii* Habe クチキレツノガイ
 - ・ 大槌湾外、90～114m, 砂礫底
 - ・ 北海道南部・若狭湾以南～日本海、四国、九州西岸
4. *Siphonodentalium okudai* Habe キタノクチキレツノガイ
 - ・ 大槌湾外、52～100m, 砂泥底
 - ・ 北海道南東岸(20m, 粗砂泥底)以南～三陸沿岸
5. *Pulsellum hige* Habe ヒゲツノガイ
 - ・ 大槌湾、3～20m
 - ・ 北海道南部・男鹿半島以南～日本海、四国、九州、潮下部、砂泥底

ハラプトツノガイ科

1. *Polyschides (Polyschides) sakuraii* (Kuroda & Habe) サクライハラプトツノガイ
 - ・ 三陸沿岸沖
 - ・ 相模湾以北～鹿島灘、三陸沿岸、北海道南部、100～1400m, 泥底

引用文献

- * 日本貝類学会貝類学雑誌、VENUS、ちりぼたん関係
 - ・鳥羽源蔵 (1915) 貝類雑話(一) 介類雑誌, 4(1) : 13-16.
 - ・鳥羽源蔵 (1928) 東北産貝類漫談(1) VENUS, 1(1) : 24-26.
 - ・鳥羽源蔵 (1929) 東北産貝類漫談(2) VENUS, 1(3) : 102-104.
 - ・鳥羽源蔵 (1929) 東北産貝類漫談(3) VENUS, 1(5) : 194-196.
 - ・鳥羽源蔵 (1930) 東北産貝類漫談(4) VENUS, 1(6) : 221-224.
 - ・鳥羽源蔵 (1930) 東北産貝類漫談(5) VENUS, 2(2) : 71-74.
 - ・鳥羽源蔵 (1935) 東北産貝類漫談(6) VENUS, 5(2, 3) : 117-120.
 - ・鳥羽源蔵・千葉蘭児 (1938) 採集籠(1) VENUS, 8(3, 4) : 168-171.
 - ・千葉蘭児 (1937) トロール曳網状況見学記 VENUS, 7(4) : 189-192.
 - ・千葉蘭児 (1939) コシタカサルアワビ VENUS, 9(1) : 44-45.
 - ・千葉蘭児 (1939) カラフトキアラの測定による種の検討 VENUS, 9(3, 4) : 150-160.
 - ・千葉蘭児 (1940) ヒラサザイの分布と海水温度 VENUS, 10(2) : 107-109.
 - ・千葉蘭児 (1941) シライトマキの各螺層に於ける高さや径の成長率に就いて VENUS, 11(1) : 29-30.
 - ・千葉蘭児 (1941) エゾボラ科の貝殻に表れた雌雄性 VENUS, 11(2, 3) : 37-94.
 - ・千葉蘭児 (1942) *Trochus (Gibbula) yamadanus* を探して VENUS, 11(4) : 169-172.
 - ・千葉蘭児 (1943) 測定による邦産サルアワビ属の検討 VENUS, 12(3, 4) : 183-195.
 - ・千葉蘭児 (1943) 水中のオホノガイを探す VENUS, 13(1-4) : 134.
 - ・千葉蘭児 (1960) 貝のくらし(1) ちりぼたん, 1(4) : 130.
 - ・千葉蘭児 (1963) 貝のくらし(2) ちりぼたん, 2(8) : 225-226.
 - ・千葉蘭児 (1965) 30年も姿を見せないモロハバイ ちりぼたん, 3(6) : 146-147.
 - ・千葉蘭児 (1966) 再びクマアサリとオオマルフミガイについて ちりぼたん, 4(1) : 1-3.
 - ・千葉蘭児 (1972) マルフミガイ属の2新種 エリモマルフミガイとイサオマルフミガイの記載 VENUS, 30(4) : 135-140.
 - ・千葉蘭児 (1973) オオモロハバイとその類似種について ちりぼたん, 7(5) : 91-93.
 - ・千葉蘭児 (1973) カミオボラ属の1新種 ミユキカミオボラ VENUS, 32(2) : 29-30.
 - ・千葉蘭児 (1973) ツムバイ属の2新種の記載 VENUS, 32(3) : 65-68.
 - ・千葉蘭児 (1973) カミオボラとイトマキカミオボラ ちりぼたん, 7(6) : 115-117.
 - ・千葉蘭児 (1974) 北区産ツムバイ類の同定私案 ちりぼたん, 8(1) : 77-78.
 - ・千葉蘭児 (1979) ヒモマキバイの変異について ちりぼたん, 10(7) : 184.
 - ・波部忠重 (1955) 岩手県大槌湾の貝類遺骸の堆積 VENUS, 18(4) : 244-251.
 - ・石川政治 (1970) 淡青丸で採集した三陸沖の漸深海底の貝類群 VENUS, 29(4) : 131-136.
 - ・黒田徳米 (1931) モロハバイ属とネズキバイ属とについて VENUS, 2(5) : 221-234.
 - ・黒田徳米 (1935) 日本産エゾバイ属目録 VENUS, 5(2, 3) : 149-161.
 - ・黒田徳米 (1936) 日本北区エゾバイ科の目録 VENUS, 6(3) : 175-187.
 - ・黒田徳米 (1953) 邦産ツノオリイレ属について VENUS, : 186-202.
 - ・土田英治・佐々木猛智・豊原哲彦 (1998) 岩手県大槌湾から再発見されたキクノカラマツガイ ちりぼたん, 28(3) : 63-65.
 - ・桜井欽一・千葉蘭児 (1969) エゾボラ属の一新種 貝類学雑誌 VENUS, Jap. Malac. 28(2) : 99-100. Jour.
 - ・石山尚珍 (1972) 宮古湾と山田湾に於ける貝類の生息環境の比較について. 地質調査月報.
 - ・石山尚珍 (1973) 岩手県の海に生息する貝類とその環境について. 地質調査月報24(10).
- * 研究報告
 - ・堀越増興・土田英治・今島 実・武田正倫・蒲生重男・太田 秀 (1979) 大槌湾及びその周辺三陸沿岸の底生無脊椎動物第一次動物目録 東京大学海洋研究所大槌臨海研究センター報告, (5) : 38-85.
 - ・土田英治・堀 成夫 (1992) 岩手県大槌湾とその周辺海域の貝類相. 異腹足目 後鰓亜綱と掘足綱. 東京大学海洋研究所大槌臨海研究センター報告, (18) : 1-23.
 - ・土田英治・黒住耐二 (1995) 岩手県大槌湾とその周辺海域の貝類相(5). 二枚貝綱-2. 東京大学海洋研究所大槌臨海研究センター報告, (20) : 13-31.
 - ・土田英治・黒住耐二 (1996) 岩手県大槌湾とその周辺海域の貝類相(6). 二枚貝綱-3. 東京大学海洋研究所大槌臨海研究センター報告, (21)
 - ・斎藤 寛・土田英治 (1998) 岩手県大槌湾とその周辺の貝類相(8) 多板綱 東京大学海洋研究所大槌臨海研究センター報告, (23) : 22-35.
 - ・S. NOMURA and E. HATAI (1935) Catalogue of Shell-bearing Mollusca collected from the Kesen and Motoyosi Districts, Northeast Honshu, Japan, immediately after the Sanriku Tsunami, March 3, 1933, with the Descriptions of five New Species. Saito Ho-on Kai Museum Research Bulletin No. 5 : 1-45.
 - ・Ranji, Tiba (1985) Descriptions of Two New Species of the Family Naticidae. Bulletin of the Institute of Malacology of Tokyo. VOL.2 : No.2.
- * 目録、図鑑等の出版書類
 - ・千葉蘭児・小菅貞男 (1979) North Pacific Shells, (1) Genus Volutopsius. Occasional Publication of the Institute of Malacology of Tokyo : 1-26 (with 12 Plate).
 - ・千葉蘭児・小菅貞男 (1980) North Pacific Shells, (2) Genus Arctomelon. Occasional Publication of the Institute of Malacology of Tokyo : 1-3 (with 3 Plate).
 - ・千葉蘭児・小菅貞男 (1980) North Pacific Shells, (3) Genus Volutomitra. Occasional Publication of the Institute of Malacology of Tokyo :

1-5 (with 3Plate).

- 千葉蘭児・小菅貞男 (1980) North Pasific Shells, (4) Genus Pyrolofus. Occasional Publication of the Institute of Malacology of Tokyo : 1-18 (with 10Plate).
- 千葉蘭児・小菅貞男 (1980) North Pasific Shells, (5) Genus Volutharpa. Occasional Publication of the Institute of Malacology of Tokyo : 1-10 (with 5Plate).
- 千葉蘭児・小菅貞男 (1980) North Pasific Shells, (6) Genus Japelon. Occasional Publication of the Institute of Malacology of Tokyo : 1-14 (with 7Plate).
- 千葉蘭児・小菅貞男 (1980) North Pasific Shells, (7) Genus Plicifusus. Occasional Publication of the Institute of Malacology of Tokyo : 1-35 (with 15Plate).
- 千葉蘭児・小菅貞男 (1981) North Pasific Shells, (8) Genus Colus. Occasional Publication of the Institute of Malacology of Tokyo : 1-16 (with 13Plate).
- 千葉蘭児・小菅貞男 (1981) North Pasific Shells, (9) Genus Fusivolutopsius. Occasional Publication of the Institute of Malacology of Tokyo : 1-8 (with 2Plate).
- 千葉蘭児・小菅貞男 (1981) North Pasific Shells, (10) Genus Beringius. Occasional Publication of the Institute of Malacology of Tokyo : 1-25 (with 8Plate).
- 千葉蘭児・小菅貞男 (1981) North Pasific Shells, (11) Genus Ancistrolepis. Occasional Publication of the Institute of Malacology of Tokyo : 1-14 (with 6Plate).
- 千葉蘭児・小菅貞男 (1982) North Pasific Shells, (12) Genus Clinopegma. Occasional Publication of the Institute of Malacology of Tokyo : 1-49 (with 18Plate).
- 千葉蘭児・小菅貞男 (1982) North Pasific Shells, (13) Genus Parancistrolepis. Occasional Publication of the Institute of Malacology of Tokyo : 1-9 (with 2Plate).
- 千葉蘭児・小菅貞男 (1984) North Pasific Shells, (14) Genus Buccinum. Occasional Publication of the Institute of Malacology of Tokyo : 1-128 (with 46Plate).
- 千葉蘭児・小菅貞男 (1985) North Pasific Shells, (15) Genus Trophon. Occasional Publication of the Institute of Malacology of Tokyo : 1-36 (with 14Plate).
- 千葉蘭児・小菅貞男 (1985) North Pasific Shells, (16) Genus Nipponotrophon. Occasional Publication of the Institute of Malacology of Tokyo : 1-10 (with 3Plate).
- 千葉蘭児・小菅貞男 (1988) North Pasific Shells, (17) Genus Neptunea. Occasional Publication of the Institute of Malacology of Tokyo : 1-96 (with 30Plate).
- 千葉蘭児・小菅貞男 (1992) North Pasific Shells, (18) Genus Mohnia. Occasional Publication of the Institute of Malacology of Tokyo : 1-26 (with 11Plate).
- 千葉蘭児・小菅貞男 (1995) North Pasific Shells, (19) The Memories of the late Mr. Ranji TIBA. Occasional Publication of the Institute of Malacology of Tokyo : 1-28.
- 肥後俊一・後藤芳央 (1993) 日本及び周辺地域産軟体動物総目録, : 1-69. エル貝類出版局.
- 奥谷喬司・斎藤寛・瀧巖・田近謙一・馬場菊太郎・山田真弓 (1999) 動物系統分類学 5(上) 軟体動物(1), 中山書店.
- 岩田文夫・長谷川和範・濱谷巖・山田真弓 (1999) 動物系統分類学 5(下) 軟体動物(2), 中山書店.
- 岡田要・内田清之助・内田亨 著者代表 (1965) 新日本動物園鑑 中巻, 北隆館.
- 吉良哲明 (1954) 原色日本貝類図鑑, 保育社.
- 波部忠重 (1961) 続原色日本貝類図鑑, 保育社.
- 波部忠重・伊藤潔 (1965) 原色世界貝類図鑑 Vol. 1 北太平洋編, 保育社.
- 波部忠重・小菅貞男 (1967) 標準原色図鑑全集 貝, 保育社.
- 波部忠重 (1977) 日本産軟体動物分類学 二枚貝綱/掘足綱, 図鑑の北隆館.
- 奥谷喬司 (1986) 決定版 生物大図鑑 貝類, 世界文化社.

* 調査報告等

- 戸羽親雄 (1978) 貝類 岩手百科事典, : 116, 286, 485, 500, 535, 557, 688, 702, 742, 765. 岩手放送.
- 戸羽親雄 (1979) 宮古市の海産貝類 宮古市の自然 : 229-244, 宮古市.
- 戸羽親雄 (1986) 岩手の生物 2 淡水産貝類 3 海産貝類 日本生物教育会岩手大会記念誌, : 110-117.
- 戸羽親雄 (1990) 三陸町海産貝類 三陸町史 第一巻 自然・考古学, : 61-100, 三陸町.

陸産貝類

凡例

- 1 目、科および種(亜種、変種も含む)の配列と学名は、湊 宏(1988) 日本陸産貝類総目録 日本陸産貝類総目録刊行会に依った。

腹足綱
原始腹足目

ヤマキサゴ科

1. *Waldemaria japonica* (A. Adams) ヤマキサゴ

中腹足目

ヤマタニシ科

1. *Nakadaella micron* (Pilsbry) ミジンヤマタニシ

ゴマガイ科

1. *Palaina (Cylindropalina) pusilla pusilla* (Martens) ヒダリマキゴマガイ
2. *Diplommatina (Sinica) cassa* Pilsbry ゴマガイ

基眼目

ケシガイ科

1. *Carychum pesimum* Pilsbry ケシガイ
2. *Carychum nipponense* Pilsbry & Hirase ニホンケシガイ

柄眼目

ヤマボタルガイ科

1. *Cochlicopa lubrica* (Moeller) ヤマボタル

キセルガイモドキ科

1. *Mirus reinianus* (Kobelt) キセルガイモドキ
2. *Mirus andersonianus* (Moellendorff) クリイロキセルガイモドキ

キセルガイ科

1. *Zapychopsis buschi* (Pfeiffer) ヒカリギセル
2. *Pinguiphaedusa pinguis dlatyauchen* (Martens) ツムガタモドキギセル
3. *Pinguiphaedusa expansilabris* (Boettger) チビギセル
4. *Vitriphaedusa micropeas micropeas* (Moellendorff) ヒメギセル
5. *Stereophaedusa japonica japonica* (Crosse) ナミギセル
6. *Euphaedusa digonoptyx* (Boettger) オオタキコギセル
7. *Mundiphaedusa miyoshii* Kuroda & Minato ミヨシギセル

オカクチキレガイ科

1. *Allopeas clavulinum kyotoensis* (Pilsbry & Hirase) オカチョウジガイ

ナタネガイ科

1. *Punctum anblygonum pretiosm* (Gould) ヒメナタネ

パツラマイマイ科

1. *Discus pauper* (Gould) パツラマイマイ

ナメクジ科

1. *Inciliaria bilineata* (Benson) ナメクジ
2. *Inciliaria fruhstorferi* (Colling) ヤマナメクジ
3. *Inciliaria fruhstorferi daiseniana* Azuma ダイセンヤマナメクジ

オカモノアラガイ科

1. *Succinea lauta* Gould オカモノアラガイ

ベッコウマイマイ科

1. *Trochochlamis mutsuensis* (Hirase) ムツオオキビ

2. *Urazirochlamys doenitzii* (Reinhardt) ウラジロベッコウ
3. *Otesiopsis kawaguchii* Habe カワグチレンズガイ
4. *Japanochlamys cerasina* (Pilsbry) クリイロベッコウ
5. *Trochochlamis crenulata crenulata* (Gude) カサキビ

コハクガイ科

1. *Zonitoides nitidus* (Müller) オオコハクガイ
2. *Zonitoides arboreus* (Say) コハクガイ

ナンバンマイマイ科

1. *Satsuma japonica japonica* (Pfeiffer) ニッポンマイマイ
2. *Nipponochloritis oscitans iwatensis* Sorita イワテビロウドマイマイ

オナジマイマイ科

1. *Aegista kunimiensis* M. Azuma & Y. Azuma ササミケマイマイ
 2. *Aegista (Plectotropis) pannosa pannosa* (Pilsbry) オオウケマイマイ
 3. *Bradybaena similis* Férussac オナジマイマイ
 4. *Euhadra senckenbergiana aomoriensis* (Gulick & Pilsbry) アオモリマイマイ
 5. *Euhadra brandtii* (Kobelt) ヒタチマイマイ
 6. *Euhadra decorata decorata* (Pilsbry & Hirase) ムツヒダリマキマイマイ
 7. *Euhadra decorata diminuta* Toba & Kuroda ナンブマイマイ
 8. *Euhadra decorata tobai* Hirase トバマイマイ
 9. *Euhadra decorata iwadensis* Toba & Kuroda イワデマイマイ
 10. *Euhadra decorata quaesitula* Pilsbry
 11. *Euhadra quaesita quaesita* (Deshayes) ヒダリマキマイマイ
 12. *Euhadra grata grata* (Gude) オオタキマイマイ
 13. *Trishoplita commoda* (A. Adams) マメマイマイ
- オナジマイマイ亜科
14. *Acusta despecta siboldiana* (Pfeiffer) ウスカワマイマイ
 15. *Ezohelix gainesi forma flexibilis* (Fulton) ブドウマイマイ

引用文献

- ・波部忠重・吉良哲明 (1971~72) 原色日本貝類図鑑・同続. 保育社.
- ・東 正男 (1995) 原色日本陸産貝類図鑑. 保育社.
- ・柵山龍司編 (1980,1981,1982,1983,1985) 盛岡陸貝の会機関誌. 不定期刊めつける, Vol.1~Vol.5.
- ・編・監修 奥谷喬司 (1986) 決定版生物大図鑑貝類. 世界文化社
- ・川口洋治 (1976) 秋田県の陸貝.
- ・湊 宏 (1988) 日本陸産貝類総目録. 日本陸産貝類総目録刊行会.

淡水産貝類

凡例

- 1 淡水二枚貝類の学名及び分類体系は主として紀平肇(1990)「琵琶湖淀川淡水貝類」(たたら書房)に依っている。
- 2 本県に生息する淡水二枚貝は7種である。なお、カラスガイは確実な情報がないため、ここでは除いている。現在の分類体系ではそれぞれが「種」として記載されている。
- 3 マメシジミ類は、分類が複雑で決着を見ていないが、ここでは一応紀平(1990)に従ってマメシジミ1種にまとめておく。ただし、今後いくつかの種または亜種に分けられる可能性も否定できない。

腹足綱 中腹足目

タニシ科

1. *Cipangopaludina japonica* (Martens) オオタニシ
2. *Cipangopaludina chinensis laeta* (Martens) マルタニシ

カワニナ科

3. *Semisulcospira libertina libertina* (Gould) カワニナ

二枚貝綱 イシガイ目

カワシンジュガイ科

1. *Margaritifera laevis* Hass カワシンジュガイ

イシガイ科

1. *Inversidens japonensis* (Lea) マツカサガイ
2. *Anodonta woodiana* (Lea) ドブガイ
3. *Anodonta japonica* タガイ

マルスダレガイ目

シジミ科

1. *Corbicula leana* Prime マシジミ
2. *Corbicula japonica* Prime ヤマトシジミ

マメシジミ科

1. *Pisidium japonicum* Pilsbry et Hirase マメシジミ

ドブシジミガイ科

1. *Sphaerium japonicum* Westerlund ドブシジミ

引用文献

- ・紀平 肇 (1990) 琵琶湖・淀川淡水貝類, たたら書房.
- ・Kondo, T. (1982) Taxonomic Revision of *Inversidens* (Bivalvia : Unionidae) VENUS, 41 (3) : 181-198.
- ・Kondo, T. (1987) Breeding Seasons of Seven Species of Unionid Mussels (Bivalvia : Unionidae) in a Small Creek, VENUS, 46 (4) : 227-236.
- ・福原修一・長田芳和・山田卓三 (1986) 溜池におけるドブガイ *Anodonta woodiana* の幼生の寄生時期とその寄主および寄生部位. VENUS, 45 (1) : 43-52.
- ・田部雅昭・福原修一・長田芳和 (1994a) 淡水二枚貝ドブガイに見られる遺伝的2型 VENUS, 53 (1); 29-35.
- ・田部雅昭・福原修一・近藤高貴・河村章人 (1994b) 淡水二枚貝ドブガイに見られる遺伝的2型の繁殖期. VENUS, 53 (1); 37-42.
- ・藤原次男 (1995) シジミ貝からの伝言. ひむか新書22, 鈺脈社.
- ・小林敬典・中山一郎・古丸明・酒井治己 (1997) DNA 多型から見た淡水産二枚貝マシジミの遺伝的変異性. DNA 多型, 5; 233-237.
- ・近藤高貴・山田雅彦・草野恭文・酒井健司 (2000) 布礼別川におけるカワシンジュガイ幼生の寄主. 平成12年度大会(山口)研究発表要旨. VENUS, 59 (1); 69.
- ・佐竹邦彦・沢田邦久・大畑靖夫 (1984) 岩手県における縄文時代以降のカワシンジュガイ(イシガイ科, 二枚貝綱)の衰退について

- て. 岩手県立博物館研究報告, 2 : 1-11.
- 松田征也 (1991) 滋賀県の淡水産貝類. 滋賀県自然史, 滋賀県自然保護財団.
 - 小野山隆司・野田善郎・高田裕美・家山博史・高橋茂 (2000) マメシジミ属3種の生殖腺構造. 平成12年度大会(山口)研究発表要旨. VENUS, 59(1);70.
 - 竹内 基 (1994) 久慈川の淡水魚, くじ・川の会.
 - 竹内 基 (1999) 過去から未来へのレフュジアに. 風土の記憶(99 田野畑村村 勢要覧), 田野畑村.