

新型^{しんがた}コロナワクチン^{せつめいしよ}説明書^{ちゆう}：中^{こうがくねんよう}～高学年用

【コロナウイルスにかかるとどうなるか】


「かぜ」にかかると人がいます。「お腹^{なか}」の調子^{ちようし}が悪^{わる}くなったり、「味^{あじ}」や「におい」が感じ^{かん}にくくなったりすることもあります。とても具合^{ぐあい}が悪^{わる}くなり、こどもでも入院^{にゆういん}が必要^{ひつよう}な人もいます。

【ワクチンは何^{なに}がいいの】

ワクチンを打^うつことで、コロナウイルスに打ち勝^かつための「めんえき力^{りよく}」が強^{つよ}くなります。ただしワクチンで具合^{ぐあい}が悪^{わる}くなることや、打^うてない人^{ひと}もいるので打^うつかどうかは大人^{おとな}と相談^{そうだん}して決^きめます。

【どうやって打^うつか？】

ファイザーのワクチンを「うで」の筋肉^{きんにく}に打^うちます。
1回目^{かいめ}から3週間^{しゅうかん}たったら、2回目^{かいめ}をします。



【ワクチンのときに気^きをつけること】

- ちゅうしゃの「痛み^{いた}」で具合^{ぐあい}が悪^{わる}くなる人^{ひと}がいます。
- ゆっくり「いきをして」、気持ち^{きもち}がおちついてから打^うちましょう。
- ちゅうしゃの後^{のち}は、15～30分^{ぶん}はしずかに休^{やす}んでください。
- 調子^{ちようし}がおかしい、むねが痛^{いた}い・くるしい、いきができない、
ふらふらするときは、近く^{ちか}の大人^{おとな}にすぐおしえましょう。