

【引用文献】

1. 福岡拓也 (2016) 三陸沿岸域に來遊するアオウミガメ (*Chelonia mydas*) の採餌生態に関する研究. 東京大学大学院 167pp. (博士論文)
2. Fukuoka T, Narazaki T, Kinoshita C, Sato K (2019) Diverse foraging habits of juvenile green turtles (*Chelonia mydas*) in a summer-restricted foraging habitat in the northwest Pacific Ocean. *Marine Biology* 166(3): 25. doi: 10.1007/s00227-019-3481-9.
3. 日本爬虫両棲類学会編 (2021) 新・日本両生爬虫類図鑑. サンライズ出版, 彦根 232pp.
4. 檜崎友子 (2010) 三陸沿岸域に來遊するウミガメ類に関する研究. 東京大学大気海洋研究所国際沿岸海洋研究センター研究報告 35: 5-8.
5. Narazaki T, Sato K, Miyazaki N (2015) Summer migration to temperate foraging habitats and active winter diving of juvenile loggerhead turtles *Caretta caretta* in the western North Pacific. *Marine Biology* 162(6): 1251-1263. doi: 10.1007/s00227-015-2666-0.
6. Okamoto T, Hikida T (2012) A new cryptic species allied to *Plestiodon japonicus* (Peters, 1864) (Squamata: Scincidae) from eastern Japan, and diagnoses of the new species and two parapatric congeners based on morphology and DNA barcode. *Zootaxa* 3436(1): 1-23.
7. Okamoto T, Tsukamoto S, Kuro-o M, Kuriyama T, Motokawa M (2021) Complex historical biogeography of the Eastern Japanese skink, *Plestiodon finitimus* (Scincidae, Squamata), revealed by geographic variation in molecular and morphological characters. *Zoological Science* 38(2): 148-161.
8. 山崎陽平 (2014) タカチホヘビ 珍蛇と呼ばれた美しいヘビ. 山林 7: 56-59.
9. 山崎陽平 (2018) タカチホヘビ (*Achalinus spinalis*) とシロマダラ (*Dinodon orientale*) の自然史・生態・保全. 帝京科学大学大学院 109pp. (博士論文)
10. 木村青史 (2017) 秋田県産シロマダラ *Dinodon orientale* における体鱗列数. 爬虫両棲類学会報 2017(1): 103. (講演要旨)
11. Guo P, Zhu F, Liu Q, Zhang L, Li J.X, Huang Y.Y, Pyron R.A (2014) A taxonomic revision of the Asian keelback snakes, genus *Amphiesma* (Serpentes: Colubridae: Natricinae), with description of a new species. *Zootaxa* 3873(4): 25-440.
12. 中村健児・上野優一 (1963) 原色日本両生爬虫類図鑑. 保育社, 大阪 214pp.