

# 農作物技術情報 第6号 野菜

発行日 令和元年 8月 29日  
発行 岩手県、岩手県農作物気象災害防止対策本部  
編集 岩手県農林水産部農業普及技術課 農業革新支援担当（電話 0197-68-4435）

携帯電話用 QR コード



「いわてアグリベンチャーネット」からご覧になれます  
パソコン、携帯電話から「<https://i-agri.net/Index/gate002>」

- ◆ 施設果菜類 気象条件に応じた温度・かん水管理の徹底を
- ◆ 露地きゅうり 草勢維持、摘葉と病害防除の徹底を
- ◆ 雨よけほうれんそう 適切な品種への切り替え、秋雨・台風への備えを万全に
- ◆ 露地葉茎根菜類 収穫率向上のための適切な管理と病虫害防除

## 1 生育概況

- (1) トマトの雨よけ栽培では、高温の影響による落花や裂果、日焼け果の発生、着果負担による草勢の低下が見られます。病虫害ではうどんこ病やすずかび病、オオタバコガ、アザミウマ類の発生が見られます。
- (2) ピーマンでは施設、露地栽培とも生育は概ね順調ですが、高温や乾燥による尻腐果の発生が見られます。病虫害ではタバコガの発生が多く見られるほか、斑点病やCMV、アザミウマ類、アブラムシ類なども見られます。
- (3) きゅうりの露地栽培は成り疲れなどにより草勢が弱く、果形が不良となっている圃場が多く見られます。また、病虫害ではべと病の発生が広く見られるほか、炭そ病や褐斑病なども見られます。
- (4) 雨よけほうれんそうは、高温の影響による生育遅延・葉先枯れ・枯死等が発生している圃場が一部で見られます。病虫害では、萎凋病が散見され、一部でアブラムシ類、アザミウマ類、コナダニ類、シロオビノメイガの発生が見られます。
- (5) 高冷地キャベツは、干ばつの影響で生育がやや遅れたほか、定植苗の枯死が目立ちました。病虫害では、ネギアザミウマによるゴマ症の発生が見られます。高冷地レタスの生育は概ね順調ですが、腐敗病、軟腐病、斑点細菌病などの病害の発生や、オオタバコガ、アザミウマ類の発生が見られています。
- (6) ねぎの生育は概ね順調です。べと病の発生が多かったことから二次的に葉枯病の発生が広く見られます。アザミウマ類の発生も多い傾向にあります。

## 2 技術対策

### (1) 果菜類（トマト・ピーマン）

#### ア 施設果菜類（共通）

今後も気温の変動や急な豪雨などが懸念されますので、気象条件に応じた温度・かん水管理を徹底するとともに、大雨でも速やかに排水できるような事前準備をして下さい。また、今後秋雨前線が活発になるとハウス内の湿度が上がりますので、十分な換気を行うことと、病虫害の防除にはくん煙剤を使用する等、湿度を上げない工夫が必要です。

気温が低下してきたら、施設果菜類では夜間の保温を行います。

## イ 雨よけトマト

裂果の発生を抑えるため、土壌水分の急激な変化を起こさないよう少量多回数のかん水管理とするとともに、ハウス外からの雨水の横浸透にも留意し、ハウス周囲の明渠の点検整備をしましょう。また、最低気温が14℃を下回るようになったら保温を行って下さい。

最終摘心時期は収穫打ち切りの日から逆算して決めますが、10月末まで収穫する場合は、9月上旬頃が目安となります。開花花房の上の葉を2枚残して摘心すると、放任するよりも果実の肥大が良くなります。

病害では今後、灰色かび病や葉かび病、疫病の発生が懸念されるので、これら病害に効果のある薬剤を選択し、防除に努めてください。高温期に萎れが多く発生した圃場では、次年度対策のためにきちんと診断を受け、萎れの原因を確認しておきましょう。

## ウ ピーマン

施設・露地とも気温の低下とともに赤果や黒変果の発生が増えてきます。ハウス栽培では最低気温16℃をめどに保温を開始し、気象条件に応じて換気を行い、適切な温度管理に努めてください。

病害虫では、降雨後に軟腐病の発生が多くなる時期となります。軟腐病の予防には降雨前後の薬剤散布が効果的です。特に、タバコガの食害痕など傷の付いた部分から病原菌が侵入しますので、地域の予察情報等を参考にタバコガの防除もあわせて実施して下さい。罹病果を圃場に放置すると軟腐病の伝染源となりますので、速やかに圃場外で処分しましょう。

## (2) 露地きゅうり

成り疲れや急激な気温の変化の影響で草勢が低下している圃場が見られることから、不良果の摘果に努めて草勢回復を図り、摘心はアーチの外側に飛び出しているところを指先で止める程度にとどめます。

摘葉は、生育後半でも太陽光がアーチ内部に十分入り込み、新葉が常に発生するように図1を参考に行います。

さらに、草勢回復には液肥を薄い倍率で葉面散布することも有効です。気温も徐々に低下してきますので、追肥は速効性の資材を利用するようにします。

病害では褐斑病、炭そ病、べと病に効果のある薬剤を中心に選択し、古葉や病葉の摘葉作業と併せながら効果的な防除に努めます。特に、アーチの上部で病害がまん延しないよう丁寧な薬剤散布に努めてください。

また、キュウリホモプシス根腐病に感染しているかどうかを判断するために、根の残渣診断をお勧めしています。収穫終了後、まだ軸が青いうちに診断する必要がありますので、気になる萎れが見られる場合は、最寄りの普及センターへご相談ください。

## (3) 雨よけほうれんそう

秋まき作型品種への切り替え時期です。品種によっては、高温で徒長したり、気温の低下により生育が大幅に遅れる場合がありますので、天気予報等を参考にしながら各地域で示されている品種体系に従い、適期に播種しましょう。




図1 露地きゅうり後半の管理ポイント

気温の低下や秋雨の影響でハウスを閉める時間が長くなると、べと病が発生しやすくなります。抵抗性品種を利用している場合でも、日中は積極的に換気を行い、発生しにくい環境にしましょう。

また、害虫では、ハウレンソウケナガコナダニやシロオビノメイガ等の害虫が発生しやすい時期になります。効果のある薬剤を適期に使用しましょう。

今後、台風の影響を受けやすい時期になります。屋根ビニールが破損したり、ハウス内に雨水が流入するのを防止するため、ビニールの破れの補修、ハウス周りの排水対策を再度確認しましょう。

#### (4) 露地葉菜類

##### ア ねぎ

台風の影響を受けやすい時期になりますので、圃場に滞水しないよう排水対策を行うとともに、倒伏等の被害を減らすため、適期に土寄せを行います。

最終土寄せをした後の日数が長くなると葉鞘部のしまりが悪くなる等、品質が低下しますので、収穫の20~30日を目安に最終培土を行いましょう。

収穫が近くなってからの病虫害被害は品質の低下に直結しますので、早めの防除を心がけましょう。なお、農薬の使用にあたっては収穫前日数を確認して適切に防除しましょう。

##### イ キャベツ・レタス

高冷地の定植作業は概ね終了しています。今後は生育中の栽培管理をしっかり行い、適期収穫により収穫率の向上を目指しましょう。

大雨や長雨に備えて圃場排水を確認し、降雨後の防除を円滑に行えるようにしましょう。また、収穫終了後の廃棄株や残渣は放置せず、病虫害の発生源とならないように注意しましょう。

##### ウ アスパラガス

アスパラガスは、地上の茎葉部に存在している養分が地下部へ徐々に移行する時期となります。これからの追肥は貯蔵根への養分転流の妨げになりますので行わないようにしましょう。

また、茎葉部を最後まで健全に保つことが重要になりますので、病虫害防除を徹底しましょう。

倒伏防止対策をしている場合は、台風等に備えてもう一度ネットや誘引線の確認を行いましょう（写真1）。



写真1  
フラワーネット利用による倒伏防止例

次号は9月26日（木）発行の予定です。気象や作物の生育状況により号外を発行することがあります。

農業普及技術課農業革新支援担当は、農業改良普及センターを通じて農業者に対する支援活動を展開しています。