

# 農作物技術情報 号外 凍霜害対策（果樹・野菜）

発行日 平成30年 4月 12日  
 発行 岩手県、岩手県農作物気象災害防止対策本部  
 編集 中央農業改良普及センター 県域普及グループ（電話 0197-68-4436）

携帯電話用QRコード



「いわてアグリベンチャーネット」からご覧になれます  
 パソコン、携帯電話から「<http://i-agri.net/Index/gate002>」

- ◆現在、県内のりんごの生育ステージは展葉期前後となっており、3月の高温の影響で生育は平年よりもかなり早まっています。今後開花期に近づくにつれ、凍霜害の危険性が高くなりますので、毎日の気象情報に注意し、被害軽減対策の徹底を図りましょう。
- ◆露地野菜は、定植直後の活着していない時に霜に当たると葉の白変や枯死に至る場合がありますので、べたがけ資材を利用して低温から守りましょう。

## りんご

### 1 生育概況

定点観測地点の調査結果（表1）によると、発芽は全ての地区で確認され、生育進度は平年より8日前後早く、近年では平成27年に次いで記録的に早い生育となっています。展葉は内陸南部・沿岸南部で確認され、この時点で平年より11日早い生育となっていますが、内陸中北部や沿岸北部では確認されておらず、4月第2～3半旬の低温の影響で生育が停滞している傾向にあります。

現時点の開花予想について、平年の発芽から開花に要する日数を今年の発芽日に当てはめて算出すると、4月第6半旬には開花始期を迎える可能性があります（表1）。

一般に展葉期以降、開花期に近づくほど、凍霜害を被る危険性が高くなりますので、今後毎日の気象情報に注意し、事前対策の徹底を図りましょう。特に例年凍霜害を被る園地では注意してください。

表1 「ふじ」の生態と開花予想（4月11日時点）

| 市町村     | 地区    | 発芽日(月/日) |      |     |      | 展葉日(月/日) |     |      |     | 発芽日から推定した開花予想※1<br>(月/日±標準偏差) | 平年<br>開花日 |            |      |
|---------|-------|----------|------|-----|------|----------|-----|------|-----|-------------------------------|-----------|------------|------|
|         |       | 本年       | 平年   | 差   | 前年   | 差        | 本年  | 平年   | 差   |                               |           | 前年         | 差    |
| 岩手町     | 一方井   | 4/4      | 4/13 | -9  | 4/14 | -10      |     | 4/24 |     | 4/21                          |           | 5/2 ± 3.7  | 5/11 |
| 盛岡市     | 三ツ割   | 4/2      | 4/10 | -8  | 4/8  | -6       |     | 4/19 |     | 4/18                          |           | 4/30 ± 3.9 | 5/8  |
| 紫波町     | 長岡    | 4/2      | 4/8  | -6  | 4/7  | -5       |     | 4/18 |     | 4/17                          |           | 4/30 ± 4.0 | 5/7  |
| 花巻市     | 中根子   | 4/1      | 4/7  | -6  | 4/6  | -5       |     | 4/17 |     | 4/17                          |           | 4/30 ± 3.7 | 5/6  |
| 北上市     | 更木    | 3/30     | 4/7  | -8  | 4/6  | -7       |     | 4/16 |     | 4/17                          |           | 4/28 ± 3.7 | 5/6  |
| 奥州市     | 前沢稲置  | 3/29     | 4/4  | -6  | 4/6  | -8       | 4/4 | 4/14 | -10 | 4/12                          | -8        | 4/27 ± 3.6 | 5/3  |
|         | 江刺伊手  | 3/31     | 4/10 | -10 | 4/9  | -9       | 4/7 | 4/20 | -13 | 4/16                          | -9        | 4/28 ± 4.3 | 5/8  |
| 一関市     | 花泉町金沢 | 3/27     | 4/4  | -8  | 4/5  | -9       | 4/5 | 4/15 | -10 | 4/15                          | -10       | 4/26 ± 3.2 | 5/4  |
|         | 大東町大原 | 3/30     | 4/9  | -10 | 4/6  | -7       | 4/8 | 4/18 | -10 | 4/16                          | -8        | 4/27 ± 4.0 | 5/7  |
| 陸前高田市   | 米崎    | 3/28     | 4/6  | -9  | 4/6  | -9       | 4/3 | 4/13 | -10 | 4/14                          | -11       | 4/25 ± 3.7 | 5/4  |
| 宮古市     | 崎山    | 3/28     | 4/7  | -10 | 4/8  | -11      | 4/6 | 4/17 | -11 | 4/17                          | -11       | 4/26 ± 4.2 | 5/7  |
| 岩泉町     | 乙茂    | 3/30     | 4/9  | -10 | 4/8  | -9       |     | 4/19 |     | 4/18                          |           | 4/27 ± 4.5 | 5/7  |
| 洋野町     | 大野    | 4/3      | 4/14 | -11 | 4/11 | -8       |     | 4/24 |     | 4/23                          |           | 4/30 ± 4.0 | 5/12 |
| 二戸市     | 下山井   | 4/1      | 4/9  | -8  | 4/8  | -7       |     | 4/19 |     | 4/16                          |           | 4/29 ± 3.6 | 5/8  |
| 県平均(参考) |       | 3/30     | 4/8  | -9  | 4/7  | -8       | 4/5 | 4/18 | -11 | 4/16                          | -10       | 4/28 ± 3.9 | 5/7  |

※1 平年の発芽から開花に要する日数を、今年の発芽日に当てはめて算出した推定値



### 3 凍霜害対策

降霜は無風、晴天の日で、降雨の1～2日後は特に危険性が高く、さらに前日夕方18時の気温が6℃以下の場合には要注意です(図1)。但し、強い放射冷却現象が起きた場合は、前日夕方が10℃以上でも翌朝の最低気温が2℃以下になる場合もあります。

#### (1) 凍霜害の防止対策

##### ア 霜溜まりの解消

傾斜地の場合、園地下方の障害物は、霜溜まりを作りやすいので除去します。例えば、園地周囲の防風ネットが冷気の流れをせき止めるような場合は、巻き上げておくか除去します。

低温層の発生位置をできるだけ低くするため、マルチを除去し草刈り等で清耕状態にしておきます。

##### イ 燃焼法による防止

降霜は、数日間連続することが多いので、燃焼法で対応可能な園地では、燃料を十分準備しておきます。

例) 市販の防霜資材、灯油、霜カット等

火点数は概ね40カ所/10a以上を確保し、風上側に多く配置します。着火は気温が0℃になる直前に行いましょう。

なお、福島県では灯油にせん定枝チップを混用した燃焼法が利用されており、灯油をそのまま燃焼させたときと比較し、黒煙の発煙量が少なく、燃焼時間も長くなります。また、点火性も良く、資材費等の面からも有効で、1.5mの高さで2～4℃の気温上昇が期待できますので、参考にしてください(表3)。




図1 18時の気温、湿度から翌朝の最低気温を推定する図(名古屋地方気象台)

※18時の最低気温が7.5℃で、湿度が72%の場合、翌朝の最低気温は1～0℃と予想できる。また、同じ気温でも湿度が低いほど、翌朝の最低気温が低下する。

表3 資材別燃焼法の特徴(福島県)

| 燃焼資材         | 点火数<br>(10a 当) | 燃焼時間<br>(時間) | 内容物                                 |
|--------------|----------------|--------------|-------------------------------------|
| 灯油+せん定枝チップ   |                |              |                                     |
| ミルク缶 (平棚用)   | 80             | 4.3          | 灯油2Lにせん定枝チップ300gを混合。                |
| 一斗半切缶(立木用)   | 40             | 3.8          | 灯油5Lにせん定枝チップ1Kgを混合。                 |
| 市販防霜資材(霜キラー) | 20             | 3.5          | 米ぬかから抽出された植物ロウ。点火数は、霜キラー専用缶を使用した場合。 |

注1 灯油とせん定枝チップを利用した燃焼法は、炎の高さを考慮して立木栽培の場合は石油半切缶を、棚栽培の場合はミルク缶を利用する。

注2 灯油は引火性が強いので燃焼中の給油は絶対行わない。

注3 消防法及び各地域の火災予防条例で、灯油を一定数量以上貯蔵する場合、標識や貯蔵法等について様々な規制や届け出の必要があるので注意する。

#### ウ 防霜ファンの準備

防霜ファンを設置している園地では、動作の確認、始動温度(2℃)の確認をしておきます。

#### エ 1輪摘花を控える

摘花作業は1花そう1花とする「1輪摘花」を避け、数花そうに1花そうを残す「株摘み」とします。

#### オ 散水氷結法

畑地かんがい施設が整備されている地域では、スプリンクラーかん水による散水氷結法が可能ですので、防霜ファン同様に始動温度の設定等準備しておきます。

### (2) 被害発生後の対策：被害が発生した場合は次の対策を講じてください

#### ア 被害状況の確認

凍霜害発生後、被害状況を把握するためにはナイフなどでつぼみや花を割り、内部の状況を肉眼で確認して下さい(図2参照)。確認する内容は、めしべから胚珠の色が健全か否かです。褐変している場合は結実が期待できません。

そして、以下の点を確認し、被害の少ない品種、少ない部位を確実に結実できるように結実対策を実施しましょう。

- ①中心花と側花の被害程度(中心花及び側花は結実可能であるか)
- ②樹上部と目通り高さの被害程度(樹上部の花は結実可能であるか)
- ③傾斜した園地では、園地下部と上部の被害程度
- ④品種毎の被害程度(被害の少ない品種は何か)




図2 りんご花器の凍霜害の事例

#### イ 人工授粉の徹底

被害を免れた花を確実に結実させるため、人工授粉を徹底します。

#### ウ 摘花・摘果

摘花作業は慎重、摘果剤の散布も控え、荒摘果は正常なガク立ちと果実肥大を確認後、過剰な着果を除く程度に行います。

## なし、おうとう

なしはりんごより若干、霜害に強いといわれていますが、りんごより生育が早い品種が多いため、霜害のリスクはりんごと同程度と考えられます。

おうとうもりんごに比べて開花が早いため、特に今年のような生育の早い年は凍霜害に遭うリスクが非常に大きいと考えられます。

凍霜害が懸念される場合には、りんごと同様の対策を行い、凍霜害にあった場合には、被害を免れた花に人工授粉などの対策を施しましょう。

## 野菜

レタスやキャベツ、ねぎは比較的低温に強い作物ですが、定植直後の活着していない時に強い霜に当たると、葉の白変や枯死に至る場合がありますので（図3）、不織布等のべたがけ資材を利用して低温から守りましょう。

また、定植前であれば、強い霜が降る時期の定植を避け、比較的温暖な日が続き、活着が促進される日を選んで定植しましょう。

ハウス栽培の果菜類はトンネル等により低温障害を回避しますが、急激な温度上昇による高温障害にも留意し、早目に開放しましょう。



図3 ねぎの凍霜害事例