

農作物技術情報 第7号 果 樹

発行日 平成29年 9月 28日
 発行 岩手県、岩手県農作物気象災害防止対策本部
 編集 中央農業改良普及センター 県域普及グループ (電話 0197-68-4436)

携帯電話用QRコード



「いわてアグリベンチャーネット」からご覧になれます
 パソコン、携帯電話から「<http://i-agri.net/Index/gate002>」

◆ りんご 中生種の熟度はほぼ平年並、適期収穫・すぐりもぎを徹底しましょう！

りんご

1 生育状況

先ずもって、台風18号の暴風により、落果・倒木被害にあわれました生産者におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。何かとご苦労も多いと思いますが、一日も早く復旧できますことを切にお祈り申し上げます。

(1) 果実肥大 (表1)

定点観測地点の果実肥大(横径)は、「ジョナゴールド」「ふじ」とも、ほぼ平年並となっています。

(2) 果実品質 (図1、2、3)

「ジョナゴールド」の果実品質は、県平均で硬度、糖度、デンプン指数ともにほぼ平年並の状態となっており、おおよそ平年並の暦日で収穫期の品質に達すると考えられます。

現時点(9月21日)の1カ月予報で、平均気温は平年並または低く、日照時間は平年並または多い予報となっており、りんごの着色には適した条件となっています。よって、中晩生種でも着色が先行する可能性もありますので、適切な管理、適期収穫を心がけましょう。

表1 県内各定点圃場における果実肥大(横径)状況(9月21日現在)

単位:mm

市町村・地区・公所	ジョナゴールド					ふじ				
	本年(H29)	平年	比	前年(H28)	比	本年(H29)	平年	比	前年(H28)	比
農研センター	89.3	90.0	99%	91.6	97%	85.1	84.3	101%	87.6	97%
岩手町一方井	83.9	89.4	94%	84.2	100%	82.9	83.7	99%	81.8	101%
盛岡市三ツ割	87.2	89.0	98%	92.3	94%	82.6	83.3	99%	87.6	94%
紫波町長岡	85.6	88.4	97%	87.5	98%	86.6	85.6	101%	87.2	99%
花巻市上根子	88.6	89.5	99%	88.9	100%	83.2	82.0	101%	82.1	101%
北上市更木	95.1	92.3	103%	96.4	99%	84.9	86.2	98%	90.7	94%
奥州市前沢区稲置	91.1	88.2	103%	92.1	99%	83.7	85.2	98%	84.6	99%
奥州市江刺区伊手	91.2	89.9	101%	92.0	99%	81.6	81.5	100%	82.2	99%
一関市花泉町金沢	93.3	89.1	105%	90.4	103%	81.5	81.2	100%	81.2	100%
一関市大東町大原	85.2	88.2	97%	91.6	93%	79.3	83.5	95%	87.4	91%
陸前高田市米崎	92.4	88.6	104%	93.5	99%	85.1	83.0	103%	87.4	97%
宮古市崎山	93.2	91.8	102%	93.5	100%	86.2	85.0	101%	93.2	92%
岩泉町乙茂	92.1	88.1	105%	92.4	100%	85.9	84.1	102%	92.2	93%
二戸市金田一	88.9	89.7	99%	90.1	99%	88.4	85.4	104%	88.0	100%
県平均値(参考)	89.8	89.4	100%	91.1	99%	84.0	83.8	100%	86.6	97%

※ 県平均値に農研センターの数値は含まれていない




図1 ジョナの硬度の経時変化




図2 ジョナの糖度の経時変化




図3 ジョナのデンブンプン指数の経時変化

2 管理作業

(1) 中生種の管理

ア 「ジョナゴールド」などの着色管理は、1回目の軽い葉摘み終了後、陽光面の着色が進んでから、葉や枝カゲをつくらないように玉回しを収穫まで2～3回行います。玉回しと同時に適当な強さに葉を摘みます。

イ りんごの着色適温は10～20℃です。気温の高い日が続くと、必要以上に葉摘みを強くしても着色は進まないため、過度の葉摘みにならないよう注意します。

ウ 「ジョナゴールド」については、着色が不揃いとなりやすいので、徹底したすぐりもぎを行い、収穫と同時に葉摘み、玉回し等着色管理を進めます。

エ 収穫が遅れると果肉の軟化、果皮の油上がりが発生して、販売上不利になりますので、適期収穫を心がけましょう（表3）。

(2) 「ふじ」の着色管理

ア 「ふじ」は、着色期間が30～40日間と長いため、陽光面が着色してきた頃（9月下旬～10月上旬）と10月中～下旬の2回に分けて葉摘みを行います。1回目の葉摘みは、果実に密着する葉を摘む程度とし、2回目は適当な強さまで葉を摘み、陽光面の着色が進んできたら葉や枝カゲを残さないよう玉回しを行います。

イ 過度の葉摘みは、葉が少なくなり果実の着色やみつ入りが劣り、翌年の花芽の充実が悪くなるなどマイナスの影響が出ますので注意してください（表2）。

表2 ふじの摘葉が果実品質に及ぼす影響

(青森りんご試)					
処理区分	果周増加量(mm)	糖度(%)	蜜の発生(%)	着色	翌年の開花率(%)
全葉の摘葉	0.74	13.6	0	3	25.0
新梢葉摘葉	3.60	14.5	31	3	58.4
果そう葉摘葉	6.85	14.9	77	4	65.1
無摘葉	7.40	14.9	86	4	66.6

(摘要) 摘葉処理は10月3日～10日に行った。果周増加は10月11日～11月11日までの分。

(3) 「シナノゴールド」の収穫

ア 年内販売の場合は、表3の収穫時期を目安に、果面にワックスが感じられるようになり、デンプン指数が1以下になったことを確認して収穫してください。

イ 越年販売の場合は、満開後150～160日頃を目安に収穫することで、収穫後約4ヶ月の貯蔵が可能となります。ただし、満開後150日より早く収穫するとやけ病が多くなり、満開後160日より遅く収穫すると貯蔵して4～5ヶ月ころから内部褐変が見られる場合がありますので、注意してください。

表3 中生・晩生種の収穫開始期の目安

品種	満開日※	販売時期	満開日 起算日数	満開日起算 による収穫予想日	硬度 (lbs)	糖度 (%)	ヨード 指数
ジョナゴールド	5月9日		145～155日	10/1～10/11	13以上	13以上	2～3
王林	5月7日		160～170日	10/14～10/24	14以上	14以上	
シナノゴールド	5月12日	越年販売	150～160日	10/9～19	15程度	15以上	1以上
		年内販売	170日以上	10/29以降			1以下
ふじ	5月10日	2月～4月末	165～175日	10/22～11/1	14以上	14以上	1～2
		即売～3月末	175～180日	11/1～11/6			
		即売～年内	180～185日	11/6～11/11			

※ 満開日は農業研究センター観測値。

○ 収穫予想日は、満開日より機械的に算出した数値です。収穫にあたっては果実品質を確認の上、実施してください。

(4) お礼肥の施用

樹の衰弱がみられる場合には、早生・中生品種では9月下旬以降、晩生種では10月中下旬以降からそれぞれ落葉までに施肥を実施してください。施肥量は成木で多くても10a当たり窒素成分5kgを目安としてください。

3 気象災害対策

(1) 台風対策

10月に入っても、まだまだ台風が多く発生する時期です。強風で倒木が発生しないよう、防風ネットの設置、支柱との結束を確認してください。また、気象情報に注意し、場合によっては台風の接近前に収穫可能な品種は収穫を進めるなど、被害を最小限にできるよう対策をとってください。

(2) 湿害対策

台風に伴う大雨や秋の長雨など、園地内が過湿となった場合、裂果や根部の障害による樹勢衰弱の要因となります。園地内に水が停滞しないよう、溝を掘るなど排水対策を実施しましょう。

次号は10月26日（木）発行の予定です。気象や作物の生育状況により号外を発行することがあります。発行時点での最新情報に基づいて作成しております。発行日を確認のうえ、必ず最新情報をご利用下さい。

**9月15日～11月15日は
秋の農作業安全月間です**

**いつもの慣れが落とし穴
急がずあせらず 農作業安全**

中央農業改良普及センター・地域普及グループは、地域農業改良普及センターを通じて農業者に対する支援活動を展開しています。