

注意！

■この記事は発行年月日時点の内容のまま公開していますので、ご覧になった時点の法規制(農薬使用基準等)等に適合しなくなった内容を含む可能性がありますから、利用にあたってはご注意ください。

農作物技術情報

第4号

果樹

発行日 平成27年 6月25日
 発行 岩手県、岩手県農作物気象災害防止対策本部
 編集 中央農業改良普及センター 県域普及グループ (電話 0197-68-4436)

携帯電話用 QR コード



「いわてアグリベンチャーネット」からご覧になれます
 パソコンからは「<http://i-agri.net>」 携帯電話からは「<http://i-agri.net/agri/i/>」

- ◆ りんごは、翌年の花芽形成を促すため、早期に適正着果数に摘果しましょう！
- ◆ ぶどうは、結実を確認のうえ、状況に応じた適切な摘房、摘粒を進めましょう。
- ◆ まとまった雨が1週間以上ない場合には、今年植栽した幼木を中心に灌水を行いましょよう！

りんご

1 生育状況

県内の定点観測調査結果によると結実率は概ね平年並からやや高めとなっていますが、地域、品種、場所によって中心果の欠落などが見受けられます。また、全般的に花芽率は平年よりやや高め(平成26年12月調査)であることから、結実量は全般的に多いと推測されます。

一方、果実の肥大(横径)は、開花が早かったため、6月1日時点では平年比130~200%となり、その後も好天に恵まれたため、6月21日時点の県平均も、平年を上回る肥大となっています(表1)。翌年の花芽形成と果実肥大を促すため、早期の適正着果数への摘果に努めてください。

表1 県内各定点圃場における果実肥大(横径)状況(6月22日現在)

単位:mm

市町村	地区	つがる					ジョナゴールド					ふじ				
		本年(H27)	前年(H26)	平年	前年比(%)	平年比(%)	本年(H27)	前年(H26)	平年	前年比(%)	平年比(%)	本年(H27)	前年(H26)	平年	前年比(%)	平年比(%)
農研センター		49.8	46.2	37.6	108	132	47.8	41.6	38.4	115	124	44.9	40.1	35.1	112	128
岩手町	一方井	42.0	35.3	32.7	119	128	43.0	33.3	33.4	129	129	39.0	33.2	30.7	117	127
盛岡市	三ツ割	47.2	42.2	36.7	112	129	47.8	40.6	37.2	118	128	43.6	37.2	33.6	117	130
紫波町	長岡	44.1	37.3	38.3	118	115	44.3	37.7	38.2	118	116	42.9	38.0	34.5	113	124
花巻市	上根子	48.3	45.0	37.7	107	128	47.2	43.6	40.6	108	116	40.5	38.2	34.8	106	116
北上市	更木	-	-	-	-	-	49.7	42.6	41.9	117	119	43.1	40.1	37.4	107	115
奥州市	前沢区稲置	48.2	43.6	40.9	111	118	47.8	43.5	41.2	110	116	41.6	38.9	37.3	107	112
	江刺区伊手	40.6	38.3	35.6	106	114	44.9	39.8	36.6	113	123	38.6	33.6	32.0	115	121
一関市	花泉町金沢	49.0	42.5	39.3	115	125	45.3	39.7	39.2	114	116	38.9	35.0	34.0	111	114
	大東町大原	-	-	-	-	-	52.1	41.9	36.9	124	141	44.8	37.1	33.1	121	135
陸前高田市	米崎	48.5	37.6	38.0	129	128	48.4	39.6	37.2	122	130	43.3	36.8	34.2	118	127
宮古市	崎山	47.9	37.9	34.5	126	139	47.7	39.0	36.2	122	132	45.0	36.1	33.1	125	136
岩泉町	乙茂	-	41.0	34.7	-	-	45.2	42.3	34.7	107	130	38.2	35.3	31.9	108	120
二戸市	下山井	-	-	34.8	-	-	42.9	37.9	35.3	113	122	42.2	36.5	31.3	116	135
県平均(参考)		46.6	40.6	36.7	115	126	46.7	40.2	37.6	116	124	41.9	36.9	33.8	114	124

2 花芽分化と管理


7月に入ると、りんごは翌年の花芽分化が始まります（表2）。着果過多や日照不足、高温乾燥などが花芽形成を阻害する要因になりますので、(1) 早期の適正着果数への摘果、(2) 徒長枝の整理などによる日照条件の改善、(3) 防除による健全な葉の維持、(4) 適正な土壌水分管理に努めましょう。

(1) 早期摘果のすすめ

りんごの果実は、摘果作業が遅れると小玉果となる可能性が高くなります。表3の摘果強度に留意して、仕上げ摘果および着果量の見直しを進めてください。結実量は多い傾向がみられますので、次年度のためにも計画的に摘果を進めましょう。

(2) 摘果のポイント

- ・三角実や扁平果など果形の悪い果実、病虫害果、サビなどの傷害果は摘果します。
- ・「ふじ」で果台が極端に長いもの（25mm以上）や短いもの（10mm以下）は、斜形果の発生割合が高くなるので、できるだけ摘果します（図1）。
- ・「ふじ」では、途中で肥大の止まる果実が出てくるので、随時見直しを行います。



- 果台とは、果実の付け根の緑色部分
- 果台の長過ぎる果実は、青味果や小玉となる可能性が高い。

図1 りんご着果部の構成

表2 主要品種の花芽分化開始時期

時期	7月上	7月中	7月下
品種名	王林		
	陸奥・つがる		
		ふじ・ジョナ	

表3 主要品種の摘果強度

品種名	摘果強度
	わい性樹
紅玉	4～5頂芽1果
ふじ、つがる、王林、さんさ、千秋	5～6 "
ジョナゴールド、陸奥、北斗	6～7 "

(3) 土壌水分管理

りんごの樹体にとって、土壌水分を適正に管理することが果実肥大、花芽の確保など健全な樹体の維持に有効です。

ア 乾燥対策

今後、高温、干ばつで経過する場合は、養水分の競合を避けるため草生を短く維持し、樹冠下に刈草やわら等でマルチします。また、畑地かんがい施設の整備が進められている地域では、適宜灌水を実施します。特に幼木は根量が少なく、乾燥の影響を受けやすいため、優先して実施してください。

イ 排水対策

降雨が続き、園地内が過湿となる場合、根部が障害を受けて樹勢が衰弱することがあります。園地内に水が停滞しないよう、溝を掘るなど排水対策を講じましょう。

3 樹相診断

樹相診断でりんご樹の栄養状態の良否を判断し、適正な肥培管理に活かしてください。特に「ふじ」の収穫時の果実品質は、今の時期の樹相の良否が大きく影響しますので、樹相診断を積極的に実施しましょう。

岩手県農業研究センターでは、平成21年度研究成果としてりんご「ふじ」わい性台木利用樹の簡便な樹相診断法を報告しています。簡便な樹相診断では、先端新梢の葉枚数を主要な調査項目とし、葉の縦径を補助的な調査項目とします。従来の先端新梢長を測る代わりに先端新梢の葉数を数えることで樹勢の判断が可能です。また、葉の縦径を測ることで葉色の測定に代えることができます。物差しだけで簡単に行えますので、実践してみてください（表4、5）。

(1) 強樹勢の対策

新梢長が長く、葉色も緑色が濃い強樹勢樹については、夏季剪定の実施、冬季剪定時は側枝の間引きを中心として結果枝を多めに残す、施肥量を減じるなどして樹勢を落ち着かせるよう管理します。

(2) 弱樹勢の対策

新梢の伸長が短く、葉色が極端に淡くなるなど弱樹勢樹については、着果量を減らし、冬季剪定で花芽の間引き、延長枝の切り戻し等を積極的に行い、施肥量を増やすなど樹勢の回復を図ります。

表4 「ふじ」わい化樹の簡便な樹相診断基準

調査項目		調査時期	基準値
簡便な診断項目	先端新梢の葉枚数	7月上旬	11～14枚
	葉の縦径		7～8cm
従来の診断項目	先端新梢長		20～30cm
	葉色カラーチャート値		4.5～5.5

表5 「ふじ」わい化樹の樹勢の目安

樹勢	先端新梢の葉枚数 (先端の新梢長)	葉の縦径 (葉色)	新梢停止期	樹相
強勢	17枚以上 (40cm以上)	8cm以上 (カラーチャート5.5以上)	7月中旬以降	栄養生長が盛んで繁茂し、樹幹内部は暗い。
適正	11～14枚 (20～30cm)	7～8cm (カラーチャート4.5～5.5)	6月下旬～ 7月上旬	栄養生長と生殖生長バランスがとれている。
弱勢	10枚以下 (20cm以下)	6.5cm以下 (カラーチャート4以下)	6月中旬以前	栄養生長が弱く、再生産力の弱い樹相。

4 病虫害防除

今後、降雨が続くようになると、斑点落葉病や褐斑病、輪紋病、炭そ病等の感染が増えてきます。また、気温も高くなりハダニ類などの害虫も発生してきます。近年、各地で被害が増加しているヒメボクトウは、7月上旬のフェニックスフロアブルの散布により新たな樹体内部への食入を防ぐ効果が高いといわれています。被害がみられる園地では使用について検討ください。

病虫害防除所の発生予察情報や防除情報を参照し、園地の発生状況をよく観察して、適期防除に努めてください。

ぶどう

1 生育状況（表6）

4月の気温が高めで推移したため、発芽展葉は早めとなり、その後も気温は高めに推移したため、定点観測地点（紫波町赤沢）「キャンベルアーリー」の調査結果では、満開期は6月2日と平年より16日早まり、定点観測を開始してから最早の生育となりました。その後も気温が高かったことから6月15日現在の新梢の伸長も進んでおり、節数、房長の生育も平年より進んでいます。

表6 ぶどう(キャンベルアーリー)の生育状況(観測地点:紫波町赤沢)

調査年次		生態			6月15日時点での生育		
		開花期			新梢長 (cm)	節数 (葉数)	房長 (cm)
西暦	元号	開花始	満開期	落花期			
2015	27	5/30	6/2	6/6	101.9	12.5	15.7
平年差・比		-16	-16	-16	137%	124%	157%
前年差・比		-6	-6	-6	114%	117%	143%
2013	25	6/12	6/14	6/18	72.7	9.5	10.0
2014	26	6/5	6/8	6/12	89.3	10.7	11.0
平年(平均)値		6/15	6/18	6/22	74.2	10.1	10.0

2 管理の要点

(1) 摘粒

- ・果粒肥大を促し、裂果や病害の誘発を防ぎ、着色向上など品質確保に不可欠な作業です。
満開後30日以内に終了するのが目標であるため、今年は6月中に実施するのが理想です。
- ・詳細は、5月28日発行の「農作物技術情報第3号 果樹」をご覧ください。

(2) 袋掛け

- ・時期は7月上旬以降できるだけ早い時期が良く、摘粒などが遅れる場合には、晩腐病の一次感染期を逃さずに防除し、その後、袋かけを行うことが大切です。

(3) 摘房

- ・「キャンベルアーリー」では、表7を参考に葉数に応じて着房数を決定してください。最終的には一坪(3.3m²)当たり、新梢数20本、着房数27~30房が基準となります。樹勢が弱い場合は、1房あたりに必要な葉数を参照に、葉数に応じて着房数を制限して下さい。
- ・「紅伊豆」、「ハニーブラック」、「安芸クイーン」などの大粒種では、1新梢1房が基本です。強い新梢は、1新梢2房着果させておき、着色期前までに1房に摘房していきます。弱い新梢は、早期に1新梢1房とし、同様に着色期をめどに、伸長の程度に合わせて2~3新梢1房に調整していきます(図2)。
- ・着色期以降も着果が多いままだと、着色や糖度上昇が遅れ収穫も遅れるほか、樹体の凍寒害の危険が増しますので十分に注意してください。

表7 「キャンベルアーリー」の収量構成要素

品種	新梢数 (本/坪)	着房数		必要な葉数	目標収量 (kg/10a)
		(房/坪)	(房/本数)		
キャンベル アーリー	20	27~30	1.35~1.5	1房:12~16枚	2200
				2房:17~22枚	

新梢の勢力	作業時期		
	開花期	着色期	収穫期
強	摘穂 (第3～4花穂)	→	摘房 (第1または第2房)
中	強	→	摘房 (第1または第2房)
	弱	→	摘房 (第1または第2房)
弱	摘穂 (全部)	→(空枝)	

図2 「紅伊豆」の新梢の強弱と摘穂・摘房時期

(4) 土壌水分管理

土壌が乾燥した条件で、ぶどうの果粒が柔らかくなってきた時期以降に、まとまった降雨や急激な灌水を実施すると裂果が助長されることがあります。

灌水が実施できる園地では、点滴灌水等の方法で少量の水を定期的に灌水することで裂果を軽減できるといわれています。

灌水が実施できない園地では、稲わらなどを用いて、マルチを行いましょう。

逆に降雨が続く場合は、雨よけハウスでは、雨樋等を点検し、園地内に水が停滞しないよう、溝を掘るなど排水対策を講じましよう。

3 病虫害防除

(1) 病虫害の発生状況に合わせて防除を実施します。

(2) 薬剤によっては、果粉の溶脱、果面の汚れなど品質を損ねることがありますので、薬剤を選択する際は注意してください。

**6月1日～8月31日は
農薬危害防止運動期間です**

- 近隣住民・周辺環境に配慮しましょう
- 農薬散布準備、作業中・後の事故に注意しましょう
- 農薬の保管・管理は適切にしましょう

今回の発行予定日は7月30日(木)です。気象や作物の生育状況により号外を発行することがあります。発行時点での最新情報に基づき作成しています。発行年月日を確認のうえ、最新の情報をご利用ください。

中央農業改良普及センター・県域普及グループは、現地農業改良普及センターを通じて先進農業者に対する支援活動を展開しています。