

キャベツ

1 予報（6月）の内容

病害虫名	発生時期	発生量・感染量	予報の根拠
コナガ	－	並	(1) 5月の巡回調査では、圃場での産卵は確認されなかった。(－) (2) 6月の気温は平年並か高く、降水量はほぼ平年並の予報であり、増殖に好適な条件である。(＋)
ヨトウガ	やや早	並	(1) 有効積算温度から推定される産卵盛期は、平年よりもやや早い。 (2) 昨年秋の発生量は、平年よりも少なかった。(－) (3) 6月の気温は平年並か高く、降水量はほぼ平年並の予報であり、増殖に好適な条件である。(＋)
モンシロチョウ	－	並	(1) 5月の巡回調査では、産卵圃場率は平年より低かった。(－) (2) 6月の気温は平年並か高く、降水量はほぼ平年並の予報であり、増殖に好適な条件である。(＋)

記号の説明 (++)：重要な多発要因、(+)：多発要因、(±)：並発要因、(－)：少発要因、(－)：重要な少発要因

2 防除のポイント

【コナガ】

- (1) 圃場内をよく観察し、幼虫の発生が確認されたら防除を開始する。
- (2) 今後、定植する作型では、定植時に必ず薬剤処理する。
- (3) 薬剤抵抗性個体の出現を回避するため、以下のことに留意する。
 - ア コナガは飛来性の害虫であり、ジアミド系殺虫剤の効果が低いコナガは本県に広く発生している可能性がある。ジアミド系殺虫剤による防除を実施したにもかかわらず、コナガの幼虫が見られる場合には、他系統の薬剤により防除を実施する。
 - イ コナガは薬剤抵抗性が発達しやすいので、同一薬剤、同一系統の連用は避け、系統の異なる薬剤をローテーション使用する。また、ジアミド系殺虫剤の使用は1作型1回にとどめ、年間使用回数の削減に努める。

【ヨトウガ】

- (1) 有効積算温度から予測した産卵盛期および防除適期は、表1の通りである。
- (2) 成長した幼虫は食害量が多いので、下記を目安に圃場をよく観察し、適期防除を行う。

表1 有効積算温度による産卵盛期および防除適期の予測

アメダス地点	産卵盛期		防除適期	
	本年	平年	本年	平年
軽米	6月4日	6月8日	6月7日～6月12日	6月11日～6月16日
奥中山	6月15日	6月17日	6月19日～6月23日	6月21日～6月25日
松尾	6月5日	6月6日	6月8日～6月13日	6月9日～6月14日
盛岡	5月31日	6月1日	6月3日～6月6日	6月4日～6月8日
北上	5月27日	5月29日	5月30日～6月3日	6月1日～6月5日

※本年の予測には、5月24日までは各地点におけるアメダス日平均気温実況値、5月25日以降は日平均気温平年値を用いた。

【モンシロチョウ】

- (1) 通常はコナガ、ヨトウガと同時防除される。
- (2) 若齢幼虫の発生が目立つ場合は直ちに薬剤による防除を実施する。