



リンゴに対する落果防止剤(1-ナフタレン酢酸ナトリウム)の使用方法

【1 成果の内容】

- (1) 1-ナフタレン酢酸ナトリウム(商品名:ヒオモン水溶剤)を収穫開始予定の21~4日前に1000倍で1回あるいは2000倍で2回散布することで、高い落果防止効果が認められます(図1)。
- (2) 1-ナフタレン酢酸ナトリウムの2000倍1回散布は落果防止効果が認められますが、ジクロロクロップ液剤(商品名:ストップール液剤)よりも効果が劣る場合があります(図2)。
- (3) 農薬使用基準は以下のとおりです。(平成24年2月現在)

作物名	使用目的	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
りんご	収穫前落果防止	1000~2000倍	300~600L/10a	収穫開始予定日の21~4日前	2回以内	立木全面散布

使用する場合は最新の登録情報を確認して下さい。



【2 留意事項】

- (1) 1-ナフタレン酢酸ナトリウムは10aあたり成木で400リットル以上単用で樹全体へむらがないように散布します。
- (2) ジクロロクロップ液剤と比較すると着色促進効果は同等かやや小さく、硬度への影響は年によって異なり判然としません。