

## 直播に使える一成分の水稲用中期剤「ワイドアタック SC」

### 【1 「ワイドアタック SC」は安定した効果のある水稲用中期除草剤】

高葉齢の「ル`I」及び広葉雑草全般に高い効果が期待できます。(表1)

表1 草種別殺草性と殺草幅

残効期間(日)	一年生雑草			多年生雑草								
	ル`I	タマガヤツリ	その他広葉	マツルイ	ホタルイ	ハラオモタカ	ミスガヤツリ	ヒルムシロ	アオミドロ 表層剥離	クダマライ	オモダカ	シズイ
10	5葉				5葉	5葉	増殖始	-	(×)	草丈 20cmまで	草丈 20cmまで	-

凡例 卓効、 効果極大、 効果大、 ×効果なし、 -未確認



ル`I 5葉



ホタルイ 5葉

雑草への吸収部位は茎葉部、茎葉基部、根部であるため、適度な土壤水分がある場合は、茎葉散布時に土壤に落下した薬剤も根部から吸収されるので、効果が安定しています。

### 【2 直播栽培での使用時期】

- 1 直播栽培での本剤の散布時期である稲6期以降となる時期は、5月中旬以降の播種で播種後40日頃、5月初旬播種で播種後47日頃からです。
- 2 直播栽培では、一発処理剤との体系処理で使用してください。(図1)

播種期	播種後日数										
	+0(播種)	+15	+20	+25	+40頃	+50頃					
5月上旬	ノ ビ エ	(始	2.0葉	2.5葉)	・	枯死	・	・	・	・	5.0葉以下
5月下旬		(始	2.0葉	2.5葉)	・	・	・	・	・	・	・

  

播種期	播種後日数					
	+0(播種)	+15	+20	+40頃	+50頃	収穫30日前
5月上旬		一発処理剤				稲6.0葉以降~ル`I 5.0葉迄
5月下旬		一発処理剤		雑草が残った場合		稲6.0葉以降~ル`I 5.0葉迄

図1 播種期の違いによる雑草の葉齢進展と適期防除体系(直播栽培)

### 【3 使用にあたって注意する点】

- 1 一発剤などの理剤後に雑草が残った場合に使用してください。
- 2 使用適期を十分に確認した上で、落水後茎葉散布し、散布後、少なくとも3日間は水を動かさないでください。
- 3 スルホニルウレア抵抗性を示すホタルイ、アゼナ及びコナギについても効果が認められています。ただし、今後、抵抗性雑草が発生する可能性があるため、ワイドアタック SC の前に使用する初期剤及び一発処理剤も含めて、他薬剤と2~3年ごとにローテーション使用することが望ましいです。

### 【4 効果】

水田雑草(直播栽培)の効果的な防除が可能となります。

### 【5 適応対象】

県下全域の水稲生産農家等