

斑点米カメムシ類の薬剤防除を徹底しましょう！

今年、**斑点米カメムシ類**の発生が多いと予想されています。

- **出穂期**は**平年並**ですが、**株内**での生育に**ばらつき**がみられ、**出穂期間**が長くなっています。
- 遅く出た穂を斑点米カメムシから守るために、**粉剤**による**2回**の**薬剤防除**を**徹底**しましょう。

1 いわてっこの出穂について

市町村 地区	幼穂形成期(月/日)		出穂期(月/日)	
	R4年	平年差	R4年	平年差
洋野町宿戸	7/13	±0	8/8	+2
洋野町阿子木	7/10	▲1	8/5	+3
久慈市大川目	7/12	—	8/7	—
野田村泉沢	7/15	±0	(8/11)	(+2)

2 薬剤防除について

株内での生育にばらつきが見られ、**小さな分けつ**でも**穂が出る**可能性があります。遅く出た穂を斑点米カメムシから守るために、**粉剤**による**2回**の**薬剤防除**を**徹底**しましょう。

(ア) 粉剤による薬剤防除

散布時期は、穂揃期1週間後（目安：8月15～21日頃）と、穂揃期2週間後（目安：8月22～26日頃）の2回です。

ただし、スタークル剤を使用した場合、2回目散布は穂揃期3週間後（目安：8月29日～9月4日頃）に実施します。

(イ) 粒剤による薬剤防除

散布時期は、穂揃期～穂揃期1週間後（目安：8月8～15日頃）の1回です。

3 出穂後の草刈りについて

出穂後の草刈りは、水田に斑点米カメムシを追い込むこととなるので、**控えましょ**う。ただし、薬剤散布後1週間以内の草刈りは可能です。

※刈取時期については、9月上旬頃にお知らせします。

※このような情報をタイムリーに入手することに役立つ、メール配信をしています。ご自身のメールから ce0026@pref.iwate.jp（普及センター組織アドレス）まで「氏名」、「住所」、「電話番号」を送信していただければ登録できます。ぜひご活用ください。

お問合せ先：JA 新いわて久慈営農経済センター（電話 0194-52-1318）
久慈農業改良普及センター（電話 0194-66-9683）