

麦類作況調査（3月25日現在の生育状況）

令和7年3月28日
岩手県農業研究センター
県北農業研究所

1. 気象概況

前回の調査（令和6年11月25日）以降、平均気温は、12月は平年よりやや低く、1月以降は概ね平年より高めに推移した。日照時間は、11月第6半旬、12月第6半旬、3月第1・4半旬を除き平年並～平年よりやや多かった。根雪期間は12月15日から2月28日までの76日間で、3月25日現在の今冬の積雪日数は92日となっている。




図1 県北農業研究所における半旬別気象経過図（3月第5半旬まで）

※ 気温と日照時間は県北農業研究所気象観測値、降水量は軽米アメダス観測値

※ 「平年」は、H9～R5の27ヵ年平均

2. 生育状況（3月25日現在）

「ナンブコムギ」と「ゆきちから」は、草丈は平年並で、葉数と株あたりの茎数は平年並～少なかった。地上部乾物重はナンブコムギが平年比88%、ゆきちからが平年比72%であった。「ナンブキヤリ」は、昨年と比較して草丈は短いものの、葉数と株あたりの茎数は多く、地上部乾物重は前年比60%であった。

表 1 根雪期間

年次 播種-収穫	根雪期間		日数	
	始め	終わり		
R6-7	12/15	2/28	76	根雪期間
R5-6	-	-	-	①長期積雪（積雪継続が30日以上）の時の初日から終日までの期間
R4-5	12/14	3/7	84	②積雪継続が10日以上の間が2つ以上で、かつ、2つの期間の無積雪日が5日以内
R3-4	12/27	3/10	74	③上記②が2つ以上ある場合はそれぞれを第一、第二、…第nとし、根雪期間は第一の初日から第nの終日とする。
R2-3	12/14	1/26	44	
R1-2	12/20	2/22	65	
H30-31	-	-	-	
H29-30	1/22	3/9	47	
H28-29	12/24	3/21	88	
H27-28	-	-	-	
H26-27	1/17	2/26	41	
H25-26	12/21	3/28	98	
H24-25	12/24	3/8	75	
H23-24	12/24	4/1	100	※ 平年は10カ年平均
平年			72	※ 根雪期間がなかった場合は平均計算から除外

表 2 生育状況

品 種	播種 年次 (令和)	播種25日後 (10/25)						播種56日後 (11/25)					
		株数	草丈	葉数	茎数 ^{※1}		地上部 乾物重	株数	草丈	葉数	茎数		地上部 乾物重
		(株/m ²)	(cm)	(葉)	(本/株)	(本/m ²)	(g/株)	(株/m ²)	(cm)		(本/株)	(本/m ²)	(g/株)
ナンブ	R6	150.0	21.3	4.3	2.8	412.5	0.18	150.0	26.5	6.3	8.6	1282.5	1.09
コムギ	平年 ^{※2}	194.0	19.9	4.4	3.2	600.7	0.18	194.0	26.3	7.3	10.1	1891.1	1.13
	差・比	77%	1.4	-0.1	-0.4	69%	99%	77%	0.3	-1.0	-1.6	68%	97%
ゆき	R6	195.0	19.5	4.2	2.8	546.0	0.12	195.0	24.5	6.6	8.7	1686.8	0.87
ちから	平年 ^{※2}	205.0	19.4	4.3	3.7	744.8	0.16	205.2	26.4	7.0	9.4	1917.3	0.95
	差・比	95%	0.2	-0.1	-0.9	73%	74%	95%	-1.9	-0.5	-0.8	88%	92%
ナンブ	R6	185.0	20.7	4.2	3.5	638.3	0.14	185.0	26.6	6.7	8.6	1591.0	0.88
キラリ	R5 ^{※4}	186.7	21.9	4.6	3.4	625.3	0.19	186.7	35.8	7.7	11.6	2165.3	1.44
(参考)	差・比	99%	-1.2	-0.4	0.1	102%	76%	99%	-9.2	-1.0	-3.0	73%	61%

品 種	播種 年次 (令和)	播種176日後 (3/25)						越冬後	
		株数	草丈	葉数	茎数 ^{※1}		地上部 乾物重	雪腐病 ^{※3}	被害程度
		(株/m ²)	(cm)		(本/株)	(本/m ²)	(g/株)		
ナンブ	R6	146.7	24.0	7.6	10.3	1503	1.61	0.0	
コムギ	平年 ^{※2}	184.2	23.9	9.3	10.7	1985	1.82	0.0	
	差・比	80%	0.1	-1.7	-0.4	76%	88%	-	
ゆき	R6	200.0	21.5	8.0	8.8	1760	1.13	0.0	
ちから	平年 ^{※2}	196.3	24.9	8.9	10.7	2114	1.58	0.0	
	差・比	102%	-3.3	-0.8	-1.9	83%	72%	-	
ナンブ	R6	186.7	23.4	7.7	7.6	1419	1.03	0.0	
キラリ	R5 ^{※4}	186.7	31.5	6.8	7.0	1307	1.72	0.0	
	差・比	100%	-8.1	0.9	0.6	109%	60%	-	

※ 1 m²当たり茎数は、株当たり茎数を四捨五入した関係上、この表の「株数」と

「株当たり茎数」を使った乗算の結果とは一致しない。

※ 2 平年値は、令和元年～令和5年播種の5年間平均値である。

※ 3 雪腐病被害程度は0～5（無、微、少、中、多、甚）の6段階評価。

※ 4 ナンブキラリは令和5年から作付を開始したため平年値を算出できない関係上、令和5年のデータと比較した。



図1 小麦の生育状況（3月25日撮影）

3. 耕種概要

播種日：令和6年9月30日

播種量：9 kg/10a（設定値）

播種様式：手播き（条間30cm）

施肥量：N-P₂O₅-K₂O=6.0-11.3-13.5kg/10a

供試品種：ナンプコムギ、ゆきちから

雑草防除：ゴーゴーサン乳剤（9月30日播種後）

病害防除：フロンサイドSC（9月30日播種前）

種子消毒：トリフミン水和剤（9月17日）

麦踏み：11月25日、3月25日