

令和7年6月27日

令和7年度大豆生育定期調査結果 No.1（6月20日現在）

岩手県農業研究センター 県北農業研究所 作物研究室 (TEL 0195-47-1073 FAX 0195-49-3011)

1 気象経過（図1）

- ・ 播種（5月第6半旬）後、気温は5月第6半旬から6月第1半旬にかけて平年を下回ったが、以降は平年を大きく上回った。
- ・ 日照時間は平年並～平年より多く、特に6月第2、第4半旬で平年を大きく上回った。
- ・ 降水量は6月第1半旬を除き平年を下回った。また、東北北部の梅雨入りは6月14日で平年並であった。

2 生育概況（写真1、表1）

- ・ 出芽に要した日数は、いずれの品種も平年並で、9日から10日であった。
- ・ 6月20日時点の生育について、主茎長は平年差-0.9～+0.3 cmで平年並～平年を下回り、主茎節数は+0.1～+0.4節で平年並、地上部乾物重は平年比92～118%であり「シュウリュウ」のみ平年を下回った。




写真1 各品種の生育状況（6月20日撮影）

表1 各品種の生育状況

品 種	播種 年次	出芽に 要した 日数	6月20日		
			主茎長 (cm)	主茎節数 (節)	地上部 乾物重 (g/m ²)
ナンプシロメ	R7	9	9.9	3.6	9.5
	平年値	8	10.8	3.4	8.1
	差・比	1	-0.9	0.2	117%
シュウリュウ	R7	10	9.0	3.4	10.6
	平年値	9	9.2	3.3	11.5
	差・比	1	-0.2	0.1	92%
リュウホウ	R7	10	8.9	3.7	11.2
	平年値	9	8.7	3.3	9.5
	差・比	1	0.3	0.4	118%
リョウユウ	R7	10	9.0	3.7	10.0
	平年値	10	8.9	3.5	9.5
	差・比	0	0.1	0.2	105%

※ 平年値の取扱いは以下のとおり。

- ・ ナンプシロメ、シュウリュウ及びリュウホウ：H30、R3～R6の5ヶ年平均（R1～R2は調査日が異なるため除外）。リョウユウ：R3～R6の4ヶ年平均

3 耕種概要

播種日：令和6年5月27日

栽植密度：14,286株/10a（畦幅70cm、株間10cm、1株1本仕立て）

施肥量（kg/10a）：N-P₂O₅-K₂O：3.0-9.0-7.5

堆肥：おがくず牛ふん堆肥 1,000kg/10a

雑草防除：ラクサー乳剤 薬液500mL/10a、希釈水量100L/10a（播種後出芽前）

病虫害防除：クルーザーMAXX 8mL/乾燥種子1kg（播種前、塗沫処理）




図1 令和7年 県北農業研究所における半旬別気象経過図（6月第4半旬まで）

※ 気温と日照時間は県北農業研究所気象観測値、降水量は軽米アメダス観測値

※ 平年はH9～R6の過去28カ年平均