令和８年度

発表日：令和８年４月15日

農作物病害虫発生速報 No.1　りんご編－１

岩手県病害虫防除所

リンゴ黒星病の早期感染が懸念されます。
今後の降雨に注意し、適期に防除を実施しましょう。

現在の状況

１　前年の黒星病発生量は平年より少ないものの（図１）、前年発生園では本年も伝染源密度は高いと考えられる。

２　「ふじ」の展葉期（北上市）は平年より９日早く進んでおり、本病の重点防除時期である「花蕾着色期」は４月第４～５半旬、「開花直前」は４月第５～６半旬と見込まれる。

３　１ヵ月予報（４月９日、仙台管区気象台発表）では、「花蕾着色期」（４月第４～５半旬）の気温は平年より高く、重点防除時期に感染好適日が出現すると予想される。



図１　黒星病（葉）の発生園地率の年次推移（年間評価）

防除対策

１　重点防除時期は「花蕾着色期」と「開花直前」であり、特に「花蕾着色期」の防除は必須である。

２　前年発生園では、「花蕾着色期」にカナメフロアブル、「開花直前」にミギワ20フロアブルまたはキワミPZ水和剤を散布する。なお、これらの剤は降雨直後に散布すると効果的である。

３　本病を対象としたＤＭＩ剤及びＳＤＨＩ剤の使用は、耐性菌出現を回避するため開花直前までとする。

４　散布ムラが無いように十分量を丁寧に散布する。

５　苗木及び未結果樹も成木と同様に防除を徹底する。

写真１　果そう葉の葉裏病斑

写真２　幼果の病斑

【利用上の注意】

本資料は、令和８年４月８日現在の農薬登録情報に基づいて作成しています。

・ 農薬は、使用前に必ずラベルを確認し、使用者が責任を持って使用しましょう。

・ 農薬使用の際は（１）**使用基準の遵守**　（２）**飛散防止**（３）**防除実績の記帳**を徹底しましょう。

【情報のお問い合わせは病害虫防除所まで】ＴＥＬ 0197(68)4427　ＦＡＸ 0197(68)4316

☆この情報は、いわてアグリベンチャーネットでもご覧いただけます。

https://www.pref.iwate.jp/agri/i-agri/boujo/index.html