



～ 掲 載 内 容 ～

ページ

1 久慈地域の情報

○普及現地情報

・・・1

- ・久慈地域の特産品「手作りアイスクリーム」、郷土料理「手打ちそば」を作ろう
～小学生への特産品・郷土料理を伝承！！～
- ・手打ちうどん「いげばっと」を作ろう
～高校生への郷土料理伝承会（第3回）開催～
- ・管内学校給食において「白銀のひかり」の提供と小学校での出前授業を行いました！
- ・「まめぶ」をテーマに交流の輪を広げよう！
～むら・もり・うみネットワーク会議集合研修開催～
- ・地元農業者の農業現場視察と作業体験を実施

2 お知らせ

○農業技術情報 大雪対策

・・・6

- ・園芸施設や水稻育苗ハウスなどの大雪への備えは、降雪前からの準備が重要です。
今から万全の対策をして被害発生を防止しましょう！

○肥料コストの低減に努めましょう！

・・・14

- ・施肥体系の見直しを行い、肥料コスト低減に取り組みましょう。

久慈地域の特産品「手作りアイスクリーム」、 郷土料理「手打ちそば」を作ろう ～小学生への特産品・郷土料理を伝承！！～

久慈地方農業農村活性化推進協議会では、11月10日に、久慈市立大川目小学校の6年生11名を対象として、食の匠による小学生への郷土料理伝承会を開催しました。

今回は、よつば乳製品加工グループ 下館つな子さんに「手作りアイスクリーム」、成谷自然食の会 岩脇ヨシエさんに「手打ちそば」を教わりました。

児童たちは、アイスクリームの作成過程で、温度を測りながら材料を混ぜるコツや、手打ちそばの生地を滑らかに仕上げるコツを教わりながら作っていました。

出来上がったアイスクリームと手打ちそばを食べ、児童たちから「アイスクリームを初めて自分で作った、美味しい」、「そばを細く切るのが難しかった」とコメントがありました。

食の匠の下館さんからは「普段買って食べる食べ物を手作りすると美味しい」、岩脇さんからは「ぜひお家の人と作って食べて欲しい」とコメントをいただきました。

子ども達にとって、本伝承会は地域の食文化に触れる貴重な機会となったようです。



左上：アイスクリーム、中下：手打ちそばを教わる子どもたち



出来上がった手作りアイスクリーム、手打ちそば

手打ちうどん「いげばっと」を作ろう ～高校生への郷土料理伝承会（第3回）開催～

久慈地方農業農村活性化推進協議会では、11月14日に、久慈翔北高校食物系列の3年生18名を対象として食の匠による高校生への郷土料理伝承会（第3回）を開催しました。

今回は、澤口ゆう子さん（久慈市侍浜町）に食の匠認定料理の「いげばっと」を教わりました。

「いげばっと」は手打ちうどんのことで、地域の人が集まる行事等で宴会の最後に振舞われた料理です。「いげ」＝「帰れ」、「はっと」＝麺類を組み合わせた料理名で、客はこれを食べ家路につきました。

「いげばっと」を上手につくるコツは、よくこねることがポイントとすることで、生徒たちは澤口さんに生地のコネ方のコツについて教わっていました。その後、長い時間をかけて忍耐強く生地を薄く延ばしていききました。

出来上がったうどんを食べ、生徒たちは喜びもひとしお！「生地を伸ばすこと、丁度良い細さに切ることが難しかった」、「自分で作ったうどんは美味しい」と口々に話していました。

生徒たちは、今年度全3回の伝承会を通して、郷土料理の大切さを学び、気持ちを新たにしました。



生徒へ生地をこねるコツを教える食の匠・澤口氏



できあがった「いげばっと」

管内学校給食において「白銀のひかり」の提供と 小学校での出前授業を行いました！

「白銀のひかり」の認知度向上及び食育を目的として、11月中・下旬に、久慈地域の小中学校の児童・生徒に向け、「白銀のひかり」の学校給食の提供と出前授業を行いました。

学校給食には、新米の「白銀のひかり」が提供され、「甘い」「粒がしっかりしていておいしい」などの声が多く、味にも満足した様子でした。

また、各市町村の小学校1校で、「白銀のひかり」の特徴や生産などについて説明する出前授業を行いました。

説明の後、児童からは、「白銀のひかり」の名前の由来や特徴などに関する質問が出され、その関心の高さがうかがえました。

普及センターでは、引き続き「白銀のひかり」の高品質・安定生産に向けた生産者の活動支援のほか、地域の子供達の理解を深める活動を行っていきます。



11/27 久慈市・宇部小での授業の様子



11/20 に普代村で提供された学校給食

「まめぶ」をテーマに交流の輪を広げよう！ ～むら・もり・うみネットワーク会議集合研修開催～

久慈農業改良普及センターでは、11月19日にむら・もり・うみネットワーク会議集合研修を開催し、会員ら25名が参加しました。本研修会は、久慈地域で農業や漁業に携わる女性組織の会員が互いの活動を知り、交流を深め組織活動へ活かすこと目的に、毎年企画しています。

今年は久慈地方生活研究グループ協議会が企画を担当。谷地ユワノ会長を講師として、山形町の郷土料理「まめぶ」をテーマに、料理研修会と伝承活動の講演を行いました。

午前は、谷地会長から調理のコツを教わりながら、参加者で協力してまめぶを完成させました。まめぶの試食と昼食の後は、各団体の活動内容について情報交換。午後は、谷地会長の40年間のまめぶ伝承活動について講演。県内外で活躍する谷地会長は、昨年12月には台湾のイベントにも出店しており、参加者からは、「台湾のお客さんの反応は？」など質問があり、関心が寄せられました。

異なる組織のメンバーとの交流により、互いの活動について知見を広げ、親睦を深める一日となりました。



料理研修会の様子



完成した「まめぶ」

地元高校生たちが農業現場の視察と体験を通じて 農業の楽しさを体感

久慈地方農業農村活性化推進協議会は11月17日に、令和7年度久慈地域農業現場視察研修会を開催しました。これは、久慈翔北高校（旧：久慈東高校）環境緑化系列専攻の高校生を対象に、平成26年度から毎年実施しているものです。

今年度は新たな試みとして、農業に関心のある一般の方を対象に加え、高校2年生5人と一般の方12名が参加しました。内容は果樹生産の現場視察と作業体験、菌床しいたけ生産の現場視察です。

果樹の生産現場では、気候の変動に合わせた、さくらんぼや大粒のぶどう「シャインマスカット」の導入など経営の取組をお聞きしたほか、りんご「ふじ」の収穫を体験し、収穫適期の判断方法を学びました。

菌床しいたけの生産現場では、地域資源を燃料としたバイオマスボイラーを使用した環境負荷の低減の取組、しいたけの出荷量調整の工夫などを学びました。

高校生からは「今回の体験で学んだことを将来役立てたい」、一般の方からは「ふだん見られないところを知ることができて良かった」などの感想があり、今後の農業振興につながる結果となりました。



(りんご収穫作業体験)



(菌床しいたけの生産現場視察)

農作物技術情報 第9号 大雪対策

発行日 令和7年11月27日
発行 岩手県、岩手県農作物気象災害防止対策本部
編集 岩手県農林水産部農業普及技術課 農業革新支援担当（電話 0197-68-4435）

携帯電話用
二次元コード



「いわてアグリベンチャーネット」からご覧になれます
パソコン、携帯電話から「<https://www.pref.iwate.jp/agri/i-agri/>」

今年の冬の気温は平年並みか高いと発表されています（気象庁3か月予報、11月25日発表）が、一時的に強い寒気が入り大雪になる可能性があります。
園芸施設や水稲育苗ハウスなどの大雪への備えは降雪前からの準備が重要ですので、今から万全の対策を講じて被害発生を防止しましょう。

農業施設

降雪前から対策を実施しましょう！

1 雪の被害の特徴

(1) 積雪荷重の強度超過

平年並みの降雪に対しては、予め柱の補強や暖房機の設定温度を上げるなどの対策で対処できますが、記録的な積雪の場合、ハウスの耐雪強度を大幅に超過するため、構造的に必要なと思われる筋交いがない、水平ばりが配置されていない等のハウスは倒壊する危険が高まります。



単棟パイプハウスのM字型陥没



水平ばりの折れ



連棟パイプハウスの倒壊

(2) 耐用年数

耐用年数を超過したハウスは、基礎や柱が腐食している場合が多く倒壊を助長します。

アーチパイプの地際部が腐食している場合は、同じ太さの新しいパイプを補強用として差し込み、接続金具（バインドクロス）により上下2か所をつないで補修します。



地際部の腐食による折れ

2 降雪前の対策

- (1) ビニールハウス等被覆資材の破損部を補修して風の吹込みによる破損を避けます。
- (2) 筋交い直管は、各アーチパイプを針金等で固定し、下端部は必ず地面に30cm以上埋め込みます（図1）。既存の筋交いも台風等で緩んでいることがあるので、しっかりと固定されているか確認します。
- (3) 雪でハウス屋根中央部が陥没しないように、中柱（補強用の支柱）を3～4m間隔で設置します。中柱の上部は屋根面の直管パイプとT字金具等で固定し、下部はブロックや厚板等で沈み込みを防止します（図2）。
- (4) 暖房装置が設置されている場合、燃料の残量や暖房装置の動作を確認します。また、停電になった場合に備え、暖房機を稼働できるように発電機を確保するか、石油ストーブ等を準備します。
- (5) 降雪後に除雪機を使用する場合は、ハウス周囲の障害物を取り除いておきます。




図1 筋交い直管による補強




図2 中柱による補強

3 降雪時の対策

- (1) 降雪前から施設内の温度を高めて積雪の自然落下を促進
ア 暖房機が設置されている場合は運転して室内温度を上げます。

イ 暖房機がない場合、内部を密閉して気密性を高めることで、地熱により室内温を上昇させて屋根雪を滑り落ちやすくします。緊急に暖房（石油ストーブ等）を入れて融雪を促す場合は、くれぐれも火災や一酸化炭素中毒に注意してください。

ウ ハウス内でカーテンを使用している場合は、カーテンを開いて、屋根面からの放熱量を増やして融雪を促します。

(2) 積もっているハウス側面の雪を遅れることなく除雪

ハウスの雪下ろしを行う場合、あらかじめハウスの周辺、特に両サイドの雪を取り除いてから上部にたまった雪を下ろし、再度ハウス側面の雪を除雪します。

なお、散水による屋根の除雪・融雪については、滑落目的で降り始めから行い、積雪後は実施してはいけません。

(3) 除雪作業が追いつかない場合の緊急対策（非常手段）

ア 積雪による重みや、側面からの圧力によるハウス骨材の損傷を防止するため、ビニールを切断・除去し、雪をハウスの内部にも入れます。この時、事故防止のため、作業は複数人で行います。

イ ハウスの倒壊が予測される場合には、ハウスへの立ち入りを避け事故を防ぎます。

4 降雪後の対策

(1) 耐雪強度を超えた積雪があった場合は、倒壊の恐れがありますので、ハウスに近付かないでください。また、ハウスの片側だけ太陽光があたったり、風によって積雪が偏ったりすると、ハウスのバランスが崩れ、倒壊する危険性があるので十分に注意します。

(2) 除雪を行う場合は、ヘルメット等をかぶり、複数人で作業を行うなど安全確保に努めます。

(3) 施設倒壊の恐れがなくなったら、施設各部の損傷や被覆資材の緩み等を点検します。また、屋根・軒下・ハウスの間に積雪がある場合は、次回の降雪に備えて直ちに除雪します。

5 大雪になった時の注意

ハウスの軒下に積もった雪は、屋根に積もった雪の滑落の妨げになるとともに、ハウスの側壁に圧力を加えます。また、降雪前にハウスビニールを剥いだ場合でも、施設全体もしくはハウスの軒高を超える積雪になると、大きな被害を受ける可能性があります。骨組が完全に雪に埋没しないうちに、できるだけ除雪を行います。湿った雪は骨組に付着するので注意が必要です。

6 大雪被害発生に伴う復旧作業

(1) ハウスの倒壊が始まった場合には、ハウス内への立ち入りを避け事故を防ぎます。

(2) 倒壊した施設は、一般的に修復が困難であり、施設内の作物は放棄せざるを得ない場合が多いことから、十分に除雪して融雪を待ってから無理のない復旧作業に努めます。

7 関連情報

農林水産省では、降雪前の11月を「災害に強い施設園芸づくり月間」と定め、チェックリストや農業版BCP（事業継続計画）の活用、園芸施設共済、収入保険への加入などにより、災害に負けない施設園芸づくりを推進しています。関連する各種被害防止技術等の情報を岩手県ホームページ(<https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/nougyou/seisan/1022400/index.html>)に掲載していますので、これらの情報を参考にして対策に努めてください。

1 事前対策

施設野菜については、育苗・栽培用ハウスが倒壊しないよう、「農業施設」の項を参考にして、事前にハウスの補強や降雪時の除雪を行うとともに、ハウスの倒壊による育苗開始の遅れや、栽培できないことも想定し、事後対策を十分検討しておきます。

2 事後対策

施設野菜で大雪によりハウスが倒壊した場合は、育苗や栽培が継続できるよう、いくつかの対応を検討します。被害の状況によっては、露地栽培への変更も検討します。

(1) 倒壊を免れたハウスを最大限活用する場合

ハウスの倒壊は免れたものの、修理・修繕に時間を要し、定植時期が遅れることが懸念される場合には、苗の順化の延長や大きいポットへの仮植を行い、定植時期を調整します。

(2) ハウスを再建する場合

ア 品目、作型の検討

再建されたハウスを活用して栽培を行う場合、復旧の遅れから、栽培期間が限定されることも想定されるので、品目や作型の変更を検討します。なお、再建時期が5月の場合はトマトやきゅうり、6～7月の場合はきゅうりの栽培が可能ですが、8月以降は果菜類の栽培は難しく、葉菜類のみが栽培可能です。

イ 定植苗の管理

再建が遅れた場合、6月以降（高温期）の育苗が想定されることから、苗の軟弱徒長が懸念されます。そのため、昼間は24～25℃を目安に換気を行うとともに、夜間は出来るだけ温度を下げ、苗の充実を図ります。

(3) 露地栽培を行う場合

出荷量の確保を図るため、露地栽培の導入も検討します。この場合、必要な苗、誘引資材（パイプ支柱、イボ竹等）の確保を計画的に進めます。特に、誘引資材については地域内に活用できる資材があるかを確認し、低コストな調達方法を検討します。

(4) 遊休ハウスを活用する場合

地域内に栽培を休止した遊休ハウスがある場合は、その活用を検討します。その場合、土壤診断を実施し、必要に応じて土壤改良を行います。

(5) 水稻育苗ハウスを活用する場合

- ・ 置き床育苗ハウスを活用する場合、土耕栽培では水稻育苗時に使用した農薬が残留農薬として検出されるリスクがあるので、必ず、隔離栽培（夢果菜恵、ういずOne等）を行います。
- ・ プール育苗ハウスを活用する場合は、プールの用水がハウス外にしっかりと排水される等の残留農薬のリスクがない場合に限り、土耕栽培を行うことが可能です。この場合、土壤診断を実施し、必要に応じて土壤改良を行います。なお、地盤を壊せない場合は隔離栽培を行いますが、「いわて型自動点滴灌水システム」等の点滴かん水システムが必要となります。

1 事前対策

(1) りんご

ア 幼木は、支柱を立てて結束をしっかりと行い、普通樹の成木は、大枝に予め支柱を立てます。

イ 雪害を受けそうな枝は根雪前に粗めの剪定を行い、傷口に枝の保護剤を塗布します。

ウ 雪に埋まった枝を掘り出すとともに、雪が軽いうちに枝の上の雪おろしを行います。

(2) ぶどう

降雪前にぶどう棚を点検し、粗めの剪定により枝を短くするなどの対策を行います。また、ぶどう棚は、倒壊のおそれがある場合は棚上の雪おろしを行います。



写真1 落葉前の積雪によるりんご樹への着雪



写真2 降雪による側枝の折損
(青森りんごT S導入協議会 HP より)

2 事後対策

(1) りんご

ア 樹が倒伏した場合

積雪の状況を見ながら、できるだけ早く、根を切らないように樹を立て直します。立て直した後は支柱等にしっかりと固定します。

イ 枝が裂開・折損した場合

大きな枝の分岐部が裂開した場合は、ボルトやカスガイで接合し、支柱等に固定します。裂開や折損した部位はできるだけ滑らかに削り、保護剤を塗布します。

ウ 倒伏や大きい枝の著しい折損により回復の見込みが無い場合

栽培に有利な系統（着色系ふじ）や高収益な品種（「紅いわた」、「はるか」）などへの更新（改植）を検討するとともに、りんごでは早期成園化技術（ポット養成フェザー苗）の導入により未収益期間の短縮を図ります。

なお、りんごのわい化栽培の場合、同一樹列内に異なった品種を植えると、品種により摘果、収穫、病害虫防除等の作業が異なる場合があるので、同一品種を植栽することが望ましいですが、周辺樹の樹齢や品種の植栽状況を考慮し、計画的な改植を検討します。

(2) ぶどう

降雪により棚が倒壊した場合には、安全が確保されてから早めに棚の針金の締め直し等を行い、剪定、枝の結束を速やかに行います。枝の倒伏、裂開等についてはりんごに準じます。

1 事前対策

- (1) 積雪により、倒壊の恐れのある建物は可能な限り補強します。
- (2) 大雪被害による停電を想定し、搾乳等作業に支障が生じないように、早期の電力回復を図るため、電力会社や発電機の借用先の連絡先を確認するとともに、近所や団体等とも情報共有をしておきます。
- (3) 降雪が予想される場合、貯水タンク等を利用して必要な水を確保します。

2 事後対策

- (1) 畜舎等から異音等がないか巡視を強化し、異音が聞こえた場合は直ちに避難します。
- (2) 速やかに除雪と雪おろしを行います。屋根の雪おろしは転落や落雪に注意し、また、複数人で行うなど安全性を十分確保します。特に建物内に家畜が居ない場合（建設中、飼料庫、機械庫など）、内部からの家畜の放射熱がないため、屋根の滑雪が起こりにくくなります。また、積雪後、しばらく経ってから倒壊する二次被害もみられるので注意して下さい。
- (3) 停電等により、搾乳が出来なかった時間が 16 時間を超えると乳房炎のリスクが高まります（表）。搾乳再開後は、前搾り乳の凝固物（ブツ）の有無を確認し、クォーターミルカーでの搾り分けを行うとともに、獣医師に早めに治療を依頼します。

表 搾乳中止時間の乳量、乳成分への影響

	影響	回復の状況
16 時間以内	乳量、乳質に問題なし	—
16～35 時間	乳量、乳質はやや低下 乳房炎の危険性	<ul style="list-style-type: none"> ・ 乳量、乳質の回復は概ね 1～2 週間 ・ 乳汁分泌停止の場合、泌乳後期にシフトする事例もまれにあり
35 時間以上	乳量、乳質は大きく低下 乳房炎の増加	<ul style="list-style-type: none"> ・ 乳房炎は、発症あるが早期治療により回復

平成 19 年釧路技術支援会議資料より

1 事前対策

育苗ハウスが倒壊しないよう、「農業施設」の項を参考にして事前にハウスの補強や降雪時の除雪を行うとともに、ハウスの倒壊により育苗開始の遅れや育苗できない可能性もあることを想定し、事後対策を十分検討しておきます。

2 事後対策

大雪により育苗ハウスが倒壊した際は、通常どおりの育苗ができなくなる可能性がありますので、以下の対策を講じます。

(1) ハウス再建によりは種・育苗の遅れが想定される場合

育苗は、品質・収量の確保を図るため、安全出穂期内に収穫可能な種晩限、移植晩限の範囲で行います。は種晩限までにハウスを再建できない場合は、JA等を通じるなどして必要な苗の購入を検討してください。

(2) ハウス再建のめどが立たず、利用可能な育苗施設に限られる場合

ア 育苗箱数の低減のための対策

(ア) 苗の種類の変更

中苗又は稚苗の適正範囲内では種量を増やすほか、中苗から稚苗に変更することで箱数の低減が可能です。

(イ) は種量増加による箱数の低減

慣行の稚苗移植栽培に比べ、は種量を4～7割増やし、加温出芽後に21日程度育苗して移植する「高密度播種苗移植栽培」、同じく稚苗移植栽培よりは種量を2～4割増やし、加温出芽後に常時被覆で9～12日育苗後に移植する「乳苗移植栽培技術」により、育苗箱数の低減が可能です。

イ 直播栽培（育苗自体が省略できる技術）

代かきしたほ場に鉄粉でコーティングした種子を土壌表面には種する「鉄コーティング湛水直播栽培」、畑地状態の乾籾または催芽籾を土中は種する「乾田直播栽培」などがあります。

ウ 露地プール育苗

育苗ハウスが利用できない際の緊急対策として、加温出芽させた水稲苗を露地プールで育苗する方法があります。

露地プール育苗では、育苗期間の日平均気温を置床日の翌日より積算して340℃程度確保することで、機械移植に適する稚苗相当の苗質を確保することができます。

上記のいずれの事後対策でも留意事項がありますので、詳細については、お近くの農業改良普及センターまでお問い合わせください。

例年どおりの春作業が進められるよう、除雪や融雪作業を進めます。ハウスが倒壊した際に、跡地にハウスを再建する場合は、早期に作業ができるよう、除雪や融雪資材の散布で融雪を早めます。

1 除雪

除雪機等の利用により、圃場外に排雪します。なお、除雪にあたっては、周辺の圃場や交通等への影響がないよう留意するほか、施設や作業員・通行人の安全に十分配慮してください。

2 融雪資材の散布

融雪資材を散布することで融雪を5～10日早めることができます。なお、表を参考に使用する資材を選ぶとともに、留意点を気をつけて散布してください。

(1) 融雪資材の種類と使用量

資材名	散布量 (10aあたり)
畑土 (火山灰土等)	40～50kg
炭 (粉、微粒)、炭化鶏糞	40～80 ㍓
もみがらくん炭	10～15kg
てんろ石灰	40～60kg
ようりん、BM ようりん	40～60kg

※塩類集積土壌では、てんろ石灰やようりんの使用は避ける。

(2) 散布時の留意点

ア 散布時期

- ・ 最高気温が0℃を越える日が続き、10cm以上の新雪が降り積もる見込みがなくなる時期になったらなるべく早く散布する。
- ・ 降雪が続いているときは、資材を散布した層が堅雪になる恐れがあることから散布を見合わせる。
- ・ 散布後の積雪が多く散布した資材が見えなくなるような場合は、2回目の散布も検討する。

イ 散布方法

- ・ 雪が深くても堅雪で歩行に支障がなければ背負式動力散布機での散布が可能。
- ・ 全面散布が難しい場合は、吹きだまりや日陰など、融雪が遅れそうなところに処理する。
- ・ 足場が不安定なので、作業にあたっては安全に十分配慮する。

ウ 散布量

過剰に散布しても効果は変わらないので、適量を散布する。

エ 排水対策

融雪水が速やかに排水されるよう排水溝を整備する。

農作物技術情報の本年度定期発行は今号で終了となりますが、気象や作物の生育状況により号外を発行することがあります。

農業普及技術課農業革新支援担当は、農業改良普及センターを通じて農業者に対する支援活動を展開しています。

肥料コストの低減に努めましょう！

施肥体系の見直しを行い、肥料コスト低減に取り組みましょう。

1 肥料コスト低減の基本的な考え方

- 土壌診断に基づく適正施肥の推進
 - ・ 土壌養分の蓄積状況を診断して、各作物に応じた必要な施肥をおこないましょう
- たい肥等有機物の活用
 - ・ 久慈地域に豊富にあるたい肥を有効に活用しましょう
- 施肥量低減技術の導入
 - ・ 肥料の利用効率を高める側条施肥や株元施肥など、効率的な施肥を工夫しましょう
- 低価格肥料の導入
 - ・ リン酸肥料の配合の少ない化成肥料や比較的単価の安い単肥を活用しましょう
(リン酸は肥料3要素の中で、最もコストが高い)



2 各作物に応じた肥料コストを低減する技術

水稲

側条施肥技術の利用やたい肥の活用、単肥の活用による減肥など

野菜

土壌診断をもとにした減肥や単肥の活用など

飼料作物(牧草やデントコーン)

たい肥の有効活用など



技術の詳細に関してのお問い合わせ先

久慈農業改良普及センター(電話 0194-66-9683(産地育成課直通))

電子メールを活用した農業情報のサービスを行っています

久慈農業改良普及センターでは、農作物技術情報、台風や気象災害などへの注意情報、病害虫に関する情報、スマート農業に関する情報などをタイムリーに入手することに役立つメール配信をしています。

ご自身のメールから ce0026@pref.iwate.jp (普及センター組織アドレス) まで「氏名」、「住所」、「電話番号」を送信していただければ、いつでも登録できます。登録すれば久慈農業改良普及センター(地域 ML) からだけでなく、県(県 ML)からも情報が配信されます。

【QR コードからも申込みできます】

これまでに県から配信した内容は、次のような内容です。

- ・農作物技術情報(毎月、号外あり)
- ・農作物病害虫発生予察情報
- ・病害虫防除速報(水稻、野菜、果樹、花きなど)
- ・産地情報「産地紹介・人物紹介」(毎月)
- ・県からのお知らせ(イベント案内、研修会案内など)



今後も随時、情報発信していきますので、ぜひご利用ください。

～いわてアグリベンチャーネット掲載記事の紹介～

いわてアグリベンチャーネットでは、毎月、各地域の農業情報をお知らせしています。

【11～12月分の掲載記事】

○産地紹介:《八幡平》松っちゃん市場「八幡平の美味しさを召し上がれ！」

○人物紹介:《盛岡》産直の主力生産者、中村幸記さんを紹介します！

《二戸》二戸市期待のりんごの星！！中村太耀さん

○『普及活動年報』 県内各地域の普及センターの取組を紹介します。

下記の URL、または右の QR コードからご覧ください。

<https://www.pref.iwate.jp/agri/i-agri/index.html>



久慈農業改良普及センターfacebook 公開中！

久慈寒次郎が、最新の情報や、HOT な情報をお届けします。

下記の URL、または右の QR コードからご覧ください。

<https://www.facebook.com/岩手県久慈農業改良普及センター-581601925540151/>

