

# 令和8年度 水稻の生育状況及び栽培管理のポイント No.3

大船渡農業改良普及センター

電話：0192-27-9918 FAX：0192-27-9936

## 1 管内の生育状況(7月9日現在)

### ○銀河のしずく

- 管内全体の生育状況は、平年と比べ草丈がやや短く、茎数は並み。葉齢はやや遅れている。  
(生育診断予察ほにおける銀河のしずくの生育は、昨年と比較して茎数が多い(表1)。ただし、生育診断予察ほは昨年の生育が悪かったためあくまで参考。)

### ○ひとめぼれ

- 管内全体の生育状況は、銀河のしずくと同様に、草丈がやや短く、茎数は並みで、葉齢はやや遅れている。  
(生育診断予察ほにおけるひとめぼれの生育は、昨年と比較してやや遅れており、草丈も短い(表1)。ただし、本年の生育診断予察ほのひとめぼれは密苗であり、前年までの慣行苗との比較が正確にはできないため、あくまで参考。)

表1 調査結果(7月9日生育診断予察ほの調査)

| 項目                        |         | 銀河のしずく | ひとめぼれ |
|---------------------------|---------|--------|-------|
| 草丈<br>(cm)                | 本年      | 62.9   | 48.5  |
|                           | 前年      | 60.2   | 58.8  |
|                           | 前年との差   | +2.7   | -10.3 |
| 茎数<br>(本/m <sup>2</sup> ) | 本年      | 263    | 313   |
|                           | 前年      | 163    | 337   |
|                           | 前年比 (%) | 161    | 93    |
| 葉齢<br>(葉)                 | 本年      | 9.9    | 9.9   |
|                           | 前年      | 10.1   | 10.6  |
|                           | 前年との差   | -0.2   | -0.7  |



銀河のしずく



ひとめぼれ

## 2 今後の栽培管理

### 〈斑点米カメムシ類防除〉


- ・ 今年度はカメムシが多い予報のため、**薬剤防除の2回実施**をご検討ください。1回目の散布適期は穂揃い期から7日後です。
- ・ 斑点米カメムシ類の増殖源となる畦畔、牧草地、雑草地、農道などでは、イネ科植物が出穂しないよう管理を徹底します。また、水稻出穂の15～10日前までに地域一斉に草刈りを実施します。
- ・ なお、養蜂活動が行われている地域で殺虫剤を散布する計画がある場合は、養蜂家と協議のうえ、散布時期を事前に通知するなど、ミツバチへの危害防止に努めてください。

### 〈水管理〉

- ・ 中干し終了後は**間断かんがい**とし、根を徐々に水に慣らしましょう。中干し後、急に深水にすると根が酸欠になり、生育不良の原因となります。
- ・ 幼穂形成期（※）は水深4～6cmを基本、減数分裂期（※）は水深10cm以上を基本とします。
- ・ 幼穂形成期以降も日最低気温17℃以下の低温の心配がない場合は、出穂まで間断かんがいとしましょう。


#### 「幼穂形成期」

- ・ 穂の基となる部分（幼穂）を作る時期
- ・ 出穂する約20～25日前
- ・ 幼穂が1～2mmとなる頃
- ・ 水田の数ヵ所から株を選び、株の中で一番長い茎を抜き取って幼穂を調べましょう。



#### 「減数分裂期」

- ・ 花粉が作られる時期
- ・ 出穂する約10～15日前
- ・ 止葉の付け根が前の葉の付け根と重なる時期
- ・ 水田の数ヵ所から株を選び、止葉の付け根の位置を確認しましょう。



### ★★いわてアグリベンチャーネットメールサービス会員募集中(情報料無料)★★

農作物技術情報や農村地域の情報を幅広く提供する岩手県公式サイト「いわてアグリベンチャーネット」のメールサービス会員を募集します。登録方法は以下のホームページをご確認ください。

<https://www.pref.iwate.jp/agri/i-agri/maillinglist.html>