

令和8年8月24日

## 令和8年度 小麦生育状況（令和8年産 成熟期・収量調査結果）

岩手県農業研究センター 県北農業研究所作物研究室（TEL：0195-47-1073、FAX：0195-49-3011）

### 1 気象概況（5月第4半旬～6月第6半旬；図1）

前回の調査（5月20日）以降、気温は大きく上下し、5月第5半旬、6月第2、第5半旬で平年（平成9年～令和6年の28か年平均）より低くなった。降水量は6月第5半旬に大きく上回ったが、その他の時期は概ね平年並であった。

東北部の梅雨入りは6月21日頃（速報値）で平年より6日遅く、昨年より2日早かった。




図1 県北農業研究所における半旬別気象経過図

※ 気温と日照時間は県北農業研究所気象観測値、降水量は軽米アメダス観測値

※ 「平年」は、H9～R6の28か年平均

## 2 成熟期における生育及び収量

「ナンプコムギ」と「ゆきちから」について、出穂後、数回低温となったことから登熟の進みは緩慢となり、成熟期は平年（播種年次令和2～6年の5か年平均）より3～4日遅くなった。成熟期における生育は平年に比べ、両品種とも稈長や穂数は上回り、子実重（収量）は平年を大きく上回った。また、容積重や千粒重は平年並であった。

「ナンプキラリ」についても同様に、令和6年播種と比較して、成熟期は3日遅く、稈長及び穂数は大きく上回り、子実重（収量）は2倍近く上回った。

表1 生育状況

| 品 種  | 播種<br>年次         | 成熟期<br>(月/日) | 倒伏 <sup>※3</sup><br>程度 | 成熟期調査        |            |                           | 収量調査 <sup>※4</sup> |              |             |
|------|------------------|--------------|------------------------|--------------|------------|---------------------------|--------------------|--------------|-------------|
|      |                  |              |                        | 稈長<br>(cm)   | 穂長<br>(cm) | 穂数<br>(本/m <sup>2</sup> ) | 子実重<br>(kg/a)      | 容積重<br>(g/L) | 千粒重<br>(g)  |
| ナンプ  | <b>R7</b>        | <b>6/28</b>  | <b>0.0</b>             | <b>105.2</b> | <b>9.5</b> | <b>553</b>                | <b>51.1</b>        | <b>770</b>   | <b>40.5</b> |
| コムギ  | 平年 <sup>※1</sup> | 6/25         | 0.1                    | 97.4         | 9.4        | 516                       | 44.5               | 780          | 40.6        |
|      | 差・比              | +3           | -0.1                   | +7.8         | +0.1       | 107%                      | 115%               | 99%          | 100%        |
| ゆき   | <b>R7</b>        | <b>7/1</b>   | <b>1.0</b>             | <b>103.1</b> | <b>8.9</b> | <b>772</b>                | <b>71.2</b>        | <b>793</b>   | <b>36.2</b> |
| ちから  | 平年 <sup>※1</sup> | 6/27         | 0.0                    | 91.1         | 8.6        | 577                       | 49.1               | 787          | 36.5        |
|      | 差・比              | +4           | +1.0                   | +12.0        | +0.3       | 134%                      | 145%               | 101%         | 99%         |
| (参考) | <b>R7</b>        | <b>7/2</b>   | <b>0.0</b>             | <b>91.1</b>  | <b>9.5</b> | <b>613</b>                | <b>80.4</b>        | <b>799</b>   | <b>42.6</b> |
| ナンプ  | R6 <sup>※2</sup> | 6/29         | 0.0                    | 79.0         | 8.4        | 371                       | 41.0               | 766          | 40.0        |
| キラリ  | 差・比              | +3           | ±0                     | +12.1        | +1.1       | 165%                      | 196%               | 104%         | 107%        |

※1 平年値は、過去5か年（令和2～6年播種）の平均値。

なお播種量は、令和2～6年播種は9kg/10a、令和7年播種は8kg/10aとした。

※2 「ナンプキラリ」はデータ数が不十分のため、令和6年播種と比較した。

※3 倒伏は成熟期における達観評価で、0（無）～5（甚）の6段階評価。

※4 子実重は2.0mm篩上、容積重及び千粒重は2.2mm篩上の子実を用いて測定した値。

### 〈耕種概要〉

播 種 日：令和7年9月25日

播 種 量：8 kg/10a（設定値）

播種様式：条播（条間30cm；手播き）

施 肥 量：基肥 N-P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-K<sub>2</sub>O=6.0-11.3-13.5 kg/10a（麦専用）

追肥 N-P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-K<sub>2</sub>O=2.0- 0.0- 0.0 kg/10a（硫安；3月16日）

N-P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-K<sub>2</sub>O=2.0- 0.0- 0.0 kg/10a（硫安；4月20日）

種子消毒：トリフミン水和剤（9月11日）

病害防除：フロンスайдSC（9月24日、11月25日）、

トップジンM水和剤（5月14日）、ストロビーフロアブル（5月22日）

雑草防除：ゴーゴーサン乳剤（9月26日）

踏 圧：11月25日、3月13日

刈 取：6月29日（ナンプコムギ）、7月3日（ゆきちから、ナンプキラリ）