

## 刈取適期は平年並み～遅くなる見込みです！

- 刈取適期は平年並みまたは1週間～2週間程度遅くなる見込みです。
- 黄化粃割合が80～90%に達したらテスト粃摺りを行い、刈取りの可否を判断しましょう。
- コンバインや乾燥調製施設の点検・整備を早めに始めましょう。
- 倒伏した稲は、刈分けを行いましょう。

### 1 刈取適期について

- ・ 刈取適期は、出穂後の積算気温 950～1,050℃（いわてっこ・白銀のひかり）、950～1,100℃（あきたこまち）が目安で、9月中旬～10月上旬と平年並みまたは平年より遅くなる見込みです。

表1 刈取適期のめやす（白銀のひかり・いわてっこ・あきたこまち）

| 調査地点       | 品種名    | 出穂期（月/日） |      |      | 刈取適期（月/日）<br>（めやす） |        |
|------------|--------|----------|------|------|--------------------|--------|
|            |        | R 8      | R 7  | 平年値  | R 8（予想）            | 成熟期平年値 |
| 久慈市<br>大川目 | 白銀のひかり | 7/31     | －    | －    | 9/12～9/18          | －      |
|            | いわてっこ  | 8/1      | 7/27 | 8/1  | 9/13～9/19          | 9/12   |
| 洋野町<br>宿戸  | 白銀のひかり | 8/9      | 7/25 | 7/26 | 9/25～10/1          | 9/7    |
|            | いわてっこ  | 8/10     | 7/28 | 8/1  | 9/26～10/3          | 9/15   |
| 洋野町<br>阿子木 | 白銀のひかり | 8/6      | 7/23 | －    | 9/19～9/26          | －      |
|            | いわてっこ  | 8/9      | 7/24 | 7/29 | 9/24～10/1          | 9/9    |
|            | あきたこまち | 8/9      | 7/25 | 7/31 | 9/24～10/4          | 9/14   |
| 野田村新山      | 白銀のひかり | 8/4      | 7/24 | －    | 9/16～9/23          | －      |
| 野田村泉沢      | いわてっこ  | 8/11     | 8/1  | 8/6  | 9/27～10/3          | 9/18   |

※積算気温 950～1,050℃の期間。8/26 までは現況値、8/27 日以降は平年値により算出。

### 2 刈取りについて

- ・ 黄化粃割合が80～90%に達したら、テスト粃摺りを実施し、登熟状況を確認してから刈り取りましょう。
- ・ 異品種混入防止のために、コンバインや乾燥調製施設の点検・整備を行い、刈取りの準備をしましょう。

### 3 収穫作業の留意点

- ・ 倒伏した稲を一緒に刈り取ると未熟粒の混入につながり、落等してしまいますので、刈分けを行いましょう。
- ・ 刈遅れは胴割粒や白未熟粒が発生しやすくなるので、適期刈取りに努めましょう。

- ・ このような情報をタイムリーに入手することに役立つ、メール配信をしています。
- ・ 右の二次元コードからメール作成を開き、必要事項を記載の上、お申し込みください。



お問合せ先：JA新しいわて久慈営農経済センター（TEL：0194-52-1318）  
久慈農業改良普及センター（TEL：0194-66-9683）  
（E-mail：ce0026@pref.iwate.jp）