

農作物技術情報 第7号 花き

発行日 令和8年9月24日
発行 岩手県、岩手県農作物気象災害防止対策本部
編集 岩手県農林水産部農業普及技術課 農業革新支援担当（電話 0197-68-4435）

携帯電話用
二次元コード



「いわてアグリベンチャーネット」からご覧になれます
パソコン、携帯電話から「<https://www.pref.iwate.jp/agri/i-agri/>」

- ◆ 共 通 台風・大雨に備え、ネットと支柱を点検、補強しましょう。
- ◆ りんどう 花腐菌核病や黒斑病、オオタバコガ、アブラムシ類等の防除を徹底しましょう。
定植ほ場や収穫後ほ場も病害虫防除を継続しましょう。
- ◆ 小 ぎ く 収穫後管理を適切に行い、健全な伏せ込み苗・株を確保しましょう。

りんどう

1 生育概況

晩生品種の開花は、8月下旬から始まり、概ね彼岸需要期に出荷となりました。一部、高温による開花遅延や花弁の着色不良がみられましたが、昨年より少なくなっています。

病害虫は、黒斑病や葉枯病、オオタバコガ、リンドウホソハマキが継続して発生しています。また、花腐菌核病の子実体（きのこ）の発生が始まり防除時期となっています。

2 台風・大雨対策

例年 10 月は台風の発生が多い時期となりますので、今後とも気象情報を確認し状況に応じて排水対策、施設の保守点検など事前事後対策を徹底してください。技術対策の詳細については、9月17日発行の「号外 台風対策」を参照してください。

3 栽培管理

(1) 残花処理

収穫が終わったほ場の花蕾が着いている部分の茎を折り取ります。この作業は、花腐菌核病やオオタバコガ、アブラムシ類、アザミウマ類の防除に特に有効です。

(2) 茎の除去（茎の刈り払い）

刃物を使って茎の刈り払い作業を行う場合は、ウイルス病の感染を防ぐため、完全に枯れてから行います。極晩生品種では、冬まで株元の茎が枯れずに残る場合がありますので、その際は枯れた部分まで刈り払い、翌春に残った茎を除去します。

手作業で行う場合も、枯れていない茎を無理やり株元から折り取ると株を傷める可能性がありますので、折り取りやすい位置で除去し、残茎は翌春に除去します。

また、除去した茎は病害虫の越冬場所となることがあるため、ほ場内に放置せず、必ずほ場外で処分します。特に、ハダニ類やリンドウホソハマキの発生が多かったほ場では、枯れ茎の処分を徹底します。

(3) 除草

秋の除草が翌春の雑草の発生程度に大きく影響します。ほ場周囲も含めて除草を行います。

4 病害虫防除

今後も注意が必要な病害虫は、病害では花腐菌核病、黒斑病、葉枯病、害虫ではオオタバコガ、アブラムシ類となりますので継続して防除を行います。

花腐菌核病は、胞子を飛散させる子実体(きのこ)の発生が始まり、**防除開始時期**となっています。胞子飛散時期に降雨があると花蕾に感染します。開花している晩生品種やこれから開花する極晩生品種では薬剤防除を行います。また、発病した部位を放置すると、菌核が形成され地面に落ち、来年の発生源になります。**発病茎は開花期間中に折り取り、ほ場外に持出し処分**します。

アブラムシ類は、気温の低下に伴い花から越冬芽周辺に移動してきますので、薬剤散布は株元にもしっかりと薬液がかかるようにします。

併せて、収穫が終了したほ場や今年新植したほ場の防除も継続して行います。



写真1 株元に形成された子実体(きのこ)
(傘の直径は大きいもので5mm程度)



写真2 越冬芽周辺に寄生したアブラムシ類

小ぎく

1 生育概況

9月咲き品種は、昨年より開花が早まった地域が多く、概ね彼岸需要期に出荷となりました。

病害虫では、白さび病の発生が増えています。また、オオタバコガ、ハダニ類、半身萎凋病、黒斑病などの発生がみられています。

2 台風対策

りんどうと同様に事前・事後対策を行います。

3 栽培管理

(1) 収穫後管理

花遅伏せ込みに利用する株は、収穫後に地上部が伸びすぎないように地際5～10cmのところでは台刈りをします。その後、速効性の化成肥料を窒素成分量で3kg/10a程度施用します。**マルチ栽培では、台刈り後にマルチを除去して土寄せし**、生育を促すのが基本ですが、除草労力を考慮して決めます。

なお、かき芽で伏せ込む場合は、台刈り後に発生した**側枝に土寄せ**をして側枝の発根を促します。

(2) かき芽苗伏せ込み

株元から発生した側芽（かき芽）を利用して伏せ込む場合は、冬至芽や株伏せ込みよりも早く作業を行います。元株から発根したかき芽を採りますが、株に病虫害の発生がないことを必ず確認します。特に、本畑で白さび病またはべと病が発生した場合は、細心の注意を払います。準備するかき芽苗の本数は、定植予定株数の2～3割とします。



写真3 株からかき取ったかき芽苗

(3) 伏せ込み床の準備

かき芽苗を伏せ込む場合、作業が遅くなるほど活着が遅れますので、速やかに伏せ込み床を準備します。排水の悪いハウスでは、平畝ではなく10～15cm程度の高畝とします。

なお、長年の伏せ込み床使用によって肥料成分が土壤中に過剰蓄積（塩類集積）し、根が障害を起こして生育不良となる事例がみられます。このような状況が確認される場合は、積極的に土壌診断を受診して処方箋に基づいた適正施肥を行います。



写真4 塩類集積による伏せ込み株の生育不良

(4) 伏せ込み床の準備

この時期、収穫後の株元から伸長した茎が再び開花して、そこにアブラムシ類やアザミウマ類が多発する事例がみられます。伏せ込み作業までに期間がある場合は、過繁茂対策を兼ねて地際から20cm程度を残し着花部分を中心に台刈りします。刈り取った茎葉は、ほ場内に放置せず、必ずほ場外で処分します。

4 病虫害防除

伏せ込み株からハウス内に病虫害を持ち込まないように、収穫終了後も伏せ込みまでは継続して白さび病、アブラムシ類、アザミウマ類などの防除を実施します。

ツキノワグマの出没に関する警報

県は、ツキノワグマの出没に関する一層の注意を促し、更なる被害の防止を図るため、県内全域に「ツキノワグマの出没に関する警報」を発表します。県民の皆さんにはツキノワグマの被害を防止するため、一層の注意をお願いします。

<https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/shizen/yasei/1049881/1043255.html>

- 1 クマに遭遇しないために
 - ・ 事前に入山地域の出没情報や被害情報を確認する。
 - ・ 音の鳴るグッズを常に鳴らして存在をアピール
- 2 クマを寄せ付けない
 - ・ 食べ残し等、エサになるものを放置しない
 - ・ 農地周辺のやぶを刈り払い、見通しの良い環境を整備する。
- 3 出会ったときの行動
 - ・ 背を向けて走って逃げない
 - ・ 目を離さず静かにゆっくり後ずさる
- 4 襲われそうになったら...
 - ・ クマが攻撃してきたら両腕で顔や頭をカバーし地面に伏せて防御する

次号は10月29日（木）発行の予定です。気象や作物の生育状況により号外を発行することがあります。
発行時点での最新情報に基づいて作成しております。発行日を確認のうえ、必ず最新情報をご利用下さい。

**9月15日～11月15日は
秋の農作業安全月間です**

**「これくらい…」 少しの油断が事故
のもと 初心忘れず安全作業**

農業普及技術課農業革新支援担当は、農業改良普及センターを通じて農業者に対する支援活動を展開しています。