令和８年 11 月 10 日

令和８年度　小麦生育状況　（令和９年産　Ｎｏ．１）

岩手県農業研究センター生産基盤研究部 水田利用研究室
（TEL0197-68-4412、FAX0197-71-1081）

１　気象経過

10 月の気温は、播種直後は平年よりやや高く推移し、それ以降は概ね平年並みに推移した。降水量は、第５半旬に平年を上回った。日照時間は第５、第６半旬で平年を下回り、日照不足となった。

２　生育概況

「ゆきちから」及び「ナンブコムギ」の出芽は、播種直後の高温により平年より出芽率が高く、揃いが良好であった。草丈は、概ね平年並みであったが、日照不足の影響により、葉数及び㎡当たり茎数が平年並みからやや少なく、地上部乾物重は平年を下回った。

「ナンブキラリ」は、過去３年平均と比較し、出芽率及び草丈は、ほぼ同等、葉数はやや少なく、㎡当たり茎数と地上部乾物重は平年を下回った。




図１　令和８年播種小麦の生育期間中の半旬別気象経過図（北上アメダス）

表１　生育ステージ等

品種	播種年次	播種日 （月/日）	出芽期 （月/日）
ゆきちから	**８年**	**10/5**	**10/12**
	平年	10/5	10/12
	差・比	0	0
ナンブコムギ	**８年**	**10/5**	**10/12**
	平年	10/5	10/12
	差・比	0	0
ナンブキラリ	**８年**	**10/5**	**10/12**
	過去３年平均	10/6	10/12
	差・比	−1	0

注）平年値は、令和３年～７年播種の５か年平均を用いた

表２　生育状況（令和８年 11 月５日調査）

品種	播種年次	出芽率 （%）	草丈 （cm）	葉数 （葉）	株当たり 茎数 （本/株）	㎡当たり 茎数 （本/㎡）	地上部 乾物重 （g/株）
ゆきちから	**８年**	**94.1**	**16.8**	**3.6**	**2.6**	**410**	**0.09**
	平年	75.8	16.7	4.0	2.7	421	0.11
	差・比	18.3	0.1	−0.4	96%	97%	82%
ナンブコムギ	**８年**	**93.5**	**18.0**	**4.0**	**2.8**	**303**	**0.13**
	平年	81.4	18.1	4.2	2.7	343	0.15
	差・比	12.1	−0.1	−0.2	103%	88%	84%
ナンブキラリ	**８年**	**91.9**	**20.2**	**3.4**	**2.6**	**303**	**0.10**
	過去3年平均	89.1	18.8	4.0	3.2	458	0.13
	差・比	2.8	1.4	−0.6	81%	66%	77%

注）平年値は、令和３年～７年播種の５か年平均を用いた

表３　耕種概要

品種	ゆきちから	ナンブコムギ、ナンブキラリ
播種期	令和８年 10 月５日（標準播種期：10 月 5 日）	
栽培様式	密条播（条間 30ｃｍ）、転換１年目（前作水稲）	
播種量（kg/10a）	7.0（手播き）	6.0（手播き）
堆肥・緑肥（kg/10a）	牛ふん堆肥 1,000	
施肥量(kg/10a)　基肥	窒素：6.0　リン酸：12.7　カリ：12.7	

雑草・病害虫防除

雪腐病（種子消毒）	ベンレート T 水和剤 20：乾燥種子重量の 0.5%
縞萎縮病（播種前）	フロンサイド SC：600mL※(10 月２日)
除草剤（播種後）	リベレーターフロアブル：80ml（10 月９日）

※100L の水で希釈し 10a に散布



ゆきちから



ナンブコムギ



ナンブキラリ

写真１　各品種の生育状況（11 月５日撮影）